

БИБЛИОТЕКА
РАДОВАНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2227
ELEMENTORUM

UNIVERSÆ MATHES EOS
A U C T O R E
P. ROGERIO JOSEPHO
BOSCOVICH
SOCIETATIS JESU

PUBLICO MATHES EOS PROFESSORE
TOMUS I.

CONTI- { GEOMETRIAM PLANAM.
NENS ARITHMETICAM VULGAREM.
GEOMETRIAM SOLIDORUM.
TRIGONOMETRIAM PLANAM, & SPHÆRICAM.

EDITIO PRIMA VENETA,

*Summo labore ac diligentia ab erroribus
expurgata.*



1757

VENETIIS, MDCCCLVII.

APUD ANTONIUM PERLINE
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIIS.

AUCTORIS PRÆFATIO.



Rödiit jam superiore anno hic ipse libe-
sub titulo partis prima Tomi primi
Elementorum Matheseos sine meo no-
mine, & alter itidem sine meo nomi-
ne continens Algebrae Elementa sub ti-
tulo partis secunda Tomi primi. Iis
nunc accedunt Sectionum Conicarum
Elementa, cum Locorum Geometricorum
transformationibus. Primiis iis Tomi primi partibus,
quamquam hoc anno distractis jam magna ex parte, non
quidem iterum recusis, sed iisdem illis, mutatur titulus:
accedit meum nomen, & que fuerant binæ partes Tomi
primi, evadunt Tomus primus, & secundus; ut jam no-
vus, qui nunc additur, fiat tertius. Cur superiore anno
meum defuerit nomen, facile intelliget, qui fusiorem præ-
fationem legerit adiectam Tomo tertio; quam ut percur-
rat, Lectorem rogo. Id ut nunc accederet, impressa simul
præfatione illa, facile a me impetravit is, cuius sumpti-
bus tertius nunc prodit Tomus.


Idem autem priores illos non Tomi partes, sed Tomos
appellari maluit, cum nominis mei addendi gratia mutari
deberet titulus, crescente nimirum universo opere, in quo
jam integra postulor totius Matheseos Elementa:

Porro prima illa Geometria, & Arithmetica Elemen-
ta, quæ solent sub Praeceptoris disciplina addisci contra-
etiore methodo exposita sunt in hoc primo Tomo ita, ut
principia quedam tantummodo capita percurrentur, &
Praeceptoris ipsius ductum omnino requirant, qui appendi-
cem legat in fine adiectam: Ejus appendicis opere, confi-
do, fore, ut Tyro rite institutus brevi, & maximo cum
fructu Geometriam addiscat, & se abunde in inventio-
ne exerceat. A fine Arithmetica usque ad primi Tomi
finem omnia, quæ occurrunt, & uberior explicata sunt,
& fusi pertractata: Mendas nonnulla Typographi, vel
librarii exscribentis per se facile deteguntur. In Tri-

gonometria plana vel mihi scribenti prapropere, vel Editori, qui plura in hoc Tomo quandoque contraxit, effugit quintus casus triangulorum rectangularium, qui addendus fuisset post num. 10, quo nimurum dato altero angulo, quarantur reliqua. Facile autem solvitur, cum angulus alter inveniatur per canonem 1, basis per 2, latus alterum per 3.

In tertio Tomo omnia sunt abunde explicata, nec ductorem, ut arbitror requirent. In reliquis itidem curabo, non qui Tyro in Geometria, & primis calculi rudimentis versatus requirat. Eorum autem, quae consequentur, & quorum materia omnis in promptu est, hic erit ordo. Quarto Tomo persequar Elementa infinitorum, & infinitesimorum pure geometrica, ubi etiam de generalibus agam curvarum proprietatibus, & earum, quae omnium maxime, vel utiles vel note sunt Elementa tradam. Alius deinde aget de applicatione Algebrae ad Geometriam, & de seriebus infinitis, alius principia calculi differentialis, & integralis fundamenta aperiet, & usum demonstrabit. Hinc absolute, quae ad puram Mathesin pertinent, aggrediar mixtam. Primo quidem ea, quae ad motum pertinent, tum quae ad Lucem, exponam, deinde Sphaeram, & ex ea pendentem Gnomonicam, tum Astronomiam precedentibus omnibus indigentem evolvam, quibus adjiciam demum illa, quae ex Mathesi requiruntur ad Geographiam, Chronologiam, utramque Architecturam, & Musicam, si nimurum vita, & otium supererit.

In iis omnibus erunt pleraque, ut in his ipsis, quae jam edidi sunt sane multa, mihi quidem nova, & deductionis ordinem habebo in primis ob oculos, cuius deductionis specimen in primo potissimum, ac tertio tomo, & vero etiam in secundo me abunde deditis arbitror,




EDITORIS MONITUM

A D L E C T O R E M



ATHESEOS Elementa edenda curavimus Adolescentium rationibus accommodata, qui publicis in Scholis huic facultati dant operam: eorum scilicet, quibus plerumque ex hujusmodi disciplinis ea tantum delibare est animus, quæ & captu faciliora sint, & cum cæteris facultatibus arctius connexa. Si qui sunt igitur, quos paulo major & exquisitor harum rerum scientia delectet, ubi satis fuerint in his Elementis exercitati, privato studio a probatissimis Scriptoribus haurire poterunt, quæ communem discentium captum excedunt. Brevitati consulendum in primis esse duximus, ut liber evaderet qui & facile parari posset, & commodè circumferri. Licet autem perspicuitatis etiam ratio sit habita, tamen si cùi quædam videbuntur aliquanto pressius dicta, & obscurius, Magistri voce aliquid præstandum esse meminerit. Arithmeticæ locum inter planam, & solidorum geometriam medium deditus Eucli-

Euclidis exemplum magis sequuti, quam quod id rerum natura postularet. Cæterum satius censemus eodem tempore in utroque genere quantitatis, continuæ nempe, & discretæ, tyronem exerceri, ob eamque rem nihil veriti sumus in Geometriæ planæ decursu ad concrahendas, aut clarius exponendas demonstraciones arithmeticam adhibere. Reliquorum ratio satis legentibus constabit. Vale.



DOMINICUS FRANCHINI

SOCIETATIS JESU.

*In Provincia Romana Prepositus
Provincialis.*

CUM Librum, cui titulus: *Elementorum Matheos &c.* a nostræ Societatis Sacerdote conscriptum aliquot ejusdem Societatis Theologi recognoverint, & in lucem edi posse probaverint, potestate nobis a R. P. Nostro Ignatio Vicecomite Præposito Generali ad id tradita, facultatem concedimus, ut Typis mandetur, si ita iis; ad quos pertinet, videbitur. In quorum fidem has litteras manu nostra subscriptas, & sigillo nostro munitas dedimus. Romæ II. Decembris 1751.

Dominicus Franchini.

NOI

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

AVendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gio: Paolo Zapparella Inquisitor Generale del Santo Officio di Venezia nel Libro intitolato *Elementorum Universae Matheos* auctore P. Rogerio Josepho Boscovich Soc. Jesu. Non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi concediamo Licenza ad Antonio Perlini Stampator di Venezia che possa essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 18. Agosto 1756.

{ Barbon Morosini K. P. Ref.
{ Alvisè Mocenigo 4. K. P. Ref.

Registrato in Libro a Carte 46. al Num. 469:


Giacomo Zuccato Seg.

Adi 20. Agosto 1756.

Registrato nel Mag. Eccelleniss. degli Esecutori contro la Bestemmia.

Francesco Bianchi Seg.

ELE-



ELEMENTA GEOMETRIÆ.

Axiomata.

1. **Q**UÆ eidem sunt æqualia , inter se sunt æqualia: Et quod uno æqualium majus est vel minus , altero quoque majus vel minus erit.

2. Si æqualibus æqualia demas , residua in primo aggregata in secundo casu sunt æqualia . Et si æqualibus inæqualia demas , vel addas , ea quæ remanent sunt inæqualia .

3. Quantitates quæ certam aliquam quantitatem tantudem continent , vel ab ea tantundem continentur , sunt æquales ; unde quantitates æquales in eamdem quantitatē ductæ , vel per eamdem divisæ sunt æquales .

4. Si ex duabus quantitatib⁹ prima sit dupla , tripla , vel utcumque multiplex alterius , & a prima auferatur pars dupla , tripla , vel æquè multiplex ejus , quæ auferuntur a secunda ; erit residuum primæ duplum , triplum , vel æquè multiplex residui alterius .

5. Quæ sibi mutuò superimposita perfectè congruunt sunt æqualia .

6. Totum qualibet sui parte majus est : est autem omnibus sui partibus simul sumptis æquale .

Definitiones.

1. Punctum est , cuius nulla pars est .

2. Linea est longitudo latitudinis expers .

2

ELEMENTA

3. Superficies est longitudo, & latitudo profunditatis expers.
4. Solidum est extensio in longum, latum, & profundum.

Scholion

D tres priores definitiones probè intelligendas, finge tibi tabulam KL affabre. ~~litteram~~ (Fig. 1.), cuius pars A ~~alba~~ fit, B nigra, D rubra, C cœrulea, EI limes album colorem a nigro ditimens, nullam certè latitudinem habet; utcumque enim in alterutram partem inclines, vel in albo, vel in nigro consistes; limitem tamen hunc in longum partiri licet. Idem dic de limitibus IG, IH, IF. Et hæc est notio lineæ.

Concursus autem harum linearum I neque latitudinem, neque longitudinem habet, adeoque nec partes. Et hæc est notio puncti Mathematici, ex qua oritur axioma illud; lineam a linea secari in unico tantum punto.

Quod si tabula KL aliquam habeat, dicet minimam profunditatem, limes interius ditimens partem albam A, a nigra B habebit longitudinem EI, tantamque latitudinem, quanta est tabulæ profunditas, ipse vero profunditatis expers erit. Et hæc est notio superficiei.

Si jam omnes colores uno obducantur, qui sit omnibus partibus communis, limes EF videri definit; adhuc tamen erit in tabula, quandoquidem locus manet ubi & albus desierat color, & niger cœperat. Quare sublati coloribus manet adhuc puncti, lineæ, & superficie notio.

Duo hinc eruuntur. 1. hoc punctum, & hæc linea Physica non sunt; uti esset e.g. ferri filum tam tenue, quod neque latitudinem habeat, neque profunditatem, hoc enim fieri posse plerique negant.

2. Ejusmodi puncta, lineæ, superficies, posita corporum continuitate, non sunt res imaginariae, quas sibi intellectus a rebus abstractiens confignat, sed verè existunt independenter ab ingenii nostri commentis. Corpora quidem non sunt, sed corporum affectiones, quæ ab

G E O M E T R I A.

3

ab invicem distrahi non possunt. Hinc punctum est terminus lineaæ, linea superficiæ, superficies corporis.

Def. 5. Circulus est figura plana, unica curva linea comprehensa, quæ peripheria dicitur, sive circumferentia, ad quam omnes rectæ lineaæ a puncto medio, quod centrum dicitur, ductæ, æquales sunt inter se.

6. Linea recta per centrum ducta, & utrinque in peripheria terminata diameter dicitur, quod circulum bisariam dividat.

Scholion.

In fig. 2. circulus est ADEB; sive FGLK; diametret est AB, sive FL, unde æquales sunt rectæ CA, CD, CE, CB, quæ semidiametri dicuntur, sive radii. Circulus dividit solet in partes æquales 360. quæ gradus dicuntur; singulos gradus partimut in 60. minuta prima, quod libet minutum primum in 60 secunda, & sic in infinitum. Solent autem hæc designari quibusdam lineis numeris superimpositis, cum gradus per o. designentur. Ita si forte occurrant $35^{\circ} \cdot 25' \cdot 36'' \cdot 42'''$. lege 35 gradus, 25 minuta prima, 36 secunda, 42 tertia.

Si duo circuli idem habeant centrum, ac rectæ lineaæ CD, CE comprehendunt in interiori circulo 30 aut 40 gradus, manifestum est, quod totidem gradus in exteriori comprehendent; quod probe notandum est ad angularum notionem sive concipiendam.

Sed antequam de angulis dicere aggrediar, subjiciamus hæc postulata, quo nomine Geometræ operationes designant, quas Geometria ex Mechanicis mutuatur. Constat autem has perfici posse, & per circinum, & regulam facile perficiuntur.

Postulata.

1. A puncto ad punctum rectam lineam ducere.
2. Rectam terminatam producere, ita ut recta macteat.
3. Ex dato puncto tanquam centro, dato intervallo tanquam radio, circulum describere.
4. Ex recta majori partem auferre minori æqualem.

A 2

Schol.

E L E M E N T A

Scholion.

Quidquid geometricè fit, per hæc postulata perficitur; aliter non dicetur geometricè factum.

Def. 7. Angulus est unius rectæ lineæ ad alteram inclinatio.

Scholion.

Anguli notio est omnino necessaria, &c ope circuli facillime concipitur. Duæ rectæ lineæ HK, FL, quæ concurrunt in C, efficiunt angulos LCH, HCF, FCK, KCL, qui non ex eo majores fieri intelliguntur, quod producantur ipsorum latera; sed ex eo profectò quod latera ipsa, sive crura divaricentur: quandoquidem anguli naturam in majori, aut minori inclinatione unius lineæ ad aliam consistit. Hinc angulorum mensura sunt gradus, quos ipsorum latera comprehendunt in peripheria circuli ex anguli vertice tamquam centro descripti. Si arcus EB 60 gradus contineat, angulus LCH erit graduum 60. Et quia eundem numerum graduum continebit arcus HL, ad hunc angulum definiendum idoneus est quilibet circulus centro C descriptus.

Corollarium.

Hinc si ad punctum M. (Fig. 3.) rectæ datæ ON fieri debeat angulus æqualis angulo dato LCH, centro facto in C, & M, & quolibet intervallo, dummodo sit utrobique æquale, describatur arcus BE occurrēns lateribus CL, CH; in B, & E; itemque arcus QP indefinitè: tum facto centro in P intervallo BE ducatur arcus alterius circuli, qui ex priori abscedens arcum PQ æqualem arcui BE, & ducatur recta MQR: patet angulum NMR æqualem fore dato angulo LCH.

Def. 8. Linea dicitur alteri lineæ perpendicularis, quando in ipsam incidens facit angulos hinc & inde æquales, cujusmodi sunt anguli GCL, GCF. Anguli hujusmodi dicuntur recti.

9. Angulus obtusus dicitur, qui est recto major, ut FCH.

10. Acutus, qui recto minor, ut HCL.

Coroll. 1.

Paret illum esse angulum rectum, qui quartam circuli partem, sive 90 gradus comprehendit; illum esse acutum, qui pauciores, illum obtusum, qui plures continent gradus.

Coroll. 2.

Manifestum est quoque, quod recta HC incidens in rectam FL vel duos angulos rectos facit (si videlicet cum perpendiculari coincidat) vel duobus rectis æquales: etenim anguli FCH, HCL simul sumpti totam semicircumferentiam, sive 180 gradus comprehendunt, totidem scilicet, quot duo recti.

Coroll. 3.

Hinc quotcumque sint lineæ rectæ, quæ concurrant ad punctum C, omnes, quos faciunt, anguli KCL, LCK, KCF &c. totam peripheriam, sive 360 gradus comprehendunt, adeoque 4 rectis æquales sunt.

Coroll. 4.

Si recte HC, LC producantur, manifestum est, quod in unam lineam coalescere non possunt, sed efficiunt angulos FCK, LCH, qui dicuntur ad verticem oppositi, æquales inter se: cum sit enim dimidia peripheria FKL æqualis dimidiæ peripheriæ HLK, sublata communis parte KL, erunt arcus reliqui FK, HL æquales inter se.

Def. 11. Triangulum æquilaterum illud est, quod habet omnia latera æqualia, ut ABC. (Fig. 4.)

12. Isoscele dicitur, quod duo tantum habet æqualia latera, uti sunt AB, BC. (Fig. 5.)

13. Scalenum est, quod omnia habet latera inæqualia, ut ABC. (Fig. 6.)

14 Triangulum rectangulum est quod unum habet angulum rectum, ut BAC. (Fig. 6.)

15. Quadratum est figura quatuor lateribus constans, quæ &c æqualia sint inter se, & ad angulos rectos junctas. (Fig. 1.)

16. Si autem angulos quidem habeat rectos, sed duo latera opposita reliquis duobus majora, dicitur simpliciter rectangulum, (Fig. 7.)

6.

ELEMENTA

17. Parallelæ dicuntur rectæ lineæ, quæ in infinitum productæ nusquam sibi occurruunt, nec magis ad invicem accedunt.

Scholion.

Ex ipso parallelisini conceptu, affectiones quædam parallelarum descendunt, quibus in demonstrandis magnopere laborant Geometræ vel ex hoc ipso, quod sine ullo magisterio natura ipsa de illarum veritate nos docet. Sunt autem hæ. Lineæ rectæ in eodem plane existentes vel convergunt, uti (Fig. 8.) GI, FD divergentes ex parte opposita GH, FC: vel eodem inter se ubique distant intervallo nusquam invicem occurrentes, uti sunt AB, CD. Si æque ubique distent ab invicem, ducta qualibet recta EO, quæ parallelas secet in G, & F; ipso naturæ lumine notum est, eamdem fore parallelæ utriusque inclinationem ad rectam EO, adeoque erit 1.^o angulus OFD æqualis angulo OGB, quorum primus dicitur externus, secundus autem internus & oppositus. 2.^o cum angulus GFC æquetur angulo DFO ad verticem opposito (per Coroll. 4 Def. 10.) erunt etiam æquales anguli BGF, GFC, qui dicuntur alterni. 3.^o tandem anguli OFD, GFD cum æquentur duobus rectis (per Coroll. 2. def. 10.) æquales item erunt duobus rectis anguli interni, & ad eamdem partem positi DFG, FGB.

Pariter: quoties angulus OFD æqualis erit interno & opposito FGB, erit eadem inclinatio rectarum CD, AB ad rectam EO, ac proinde rectæ illæ neque convergunt, neque divergunt, sed parallelæ sunt inter se. Rursus quoties æquales erunt anguli alterni BGF, GFC, vel duobus rectis erunt simul æquales interni ad eamdem partem positi BGF, GFD; semper angulus externus DFO æqualis erit angulo interno & opposito BGF, & rectæ AB, CD erunt parallelæ.

Coroll. 1.

En igitur tres parallelæ necessarias affectiones, quarum ex una qualibet ~~habet~~ licet rectas illas esse parallelas. 1.^o Angulus ~~externus~~ æqualis est interno & opposito.

G E O M E T R I A E.

7

opposito. 2.^o Anguli alterni æquales sunt inter se.
3.^o Interni & ad eamdem partem duobus rectis æquantur,

Coroll. 2.

Si duæ rectæ AB, HK (Fig. 9.) parallelæ sint eidem rectæ CD, erunt etiam inter se parallelæ. Etenim duceta recta EO illis occurrente in G, F, I, inclinatio rectarum KH, BA ad rectam EO, eadem erit atque inclinatio rectæ CD ad eamdem.

Coroll. 3.

Si per datum punctum F ducere oporteat rectam CD parallelam datae rectæ AB; ex quolibet hujus puncto G ducatur recta GFO, & fiat (per Coroll. def. 7.) angulus QFD æqualis angulo OGB, eritque recta FD parallela ipsi AB.

Scholion.

His parallelarum affectionibus nittitur methodus, quia Eratosthenes telluris ambitum mensus est. Urbis Sienes puteos norat ille solstitii æstivi tempore solis radios in imo excipere, cum illis sol ad perpendicularum immineret. Porro Sienem, & Alexandriam in eodem meridiano sitas existimavit, ut eodem temporis momento meridies utroque esset; ac præterea Sienem Alexandria abesse stadiis 5000. His positis en methodum, qua usus est. Sit T (Fig. 10.) telluris centrum PAF meridiani circulus utriusque Civitati communis. Sienne, cui sol imminet ad perpendicularum, sita sit in P; & quidem si radius SP produci intelligatur, per centrum terræ transibit. Sit demum A Alexandria. In hac ita collocavit hemisphærium cavum CAD, ut acies stili AE in centro esset hemisphærii, stilus vero ipse perpendicularis esset horizonti, adeoque per terræ centrum transiret si produci intelligeretur. Exinde in ipsa solstitii meridie aciem umbræ a stilo projectæ AB diligenter notavit, reperitque eam comprehendere in hemisphærio quinquagesimam partem totius peripheriæ, seu 7°, 12'. Cum radii Solis SPT, sEB ob immanem solis distantiam sint ad sensum parallelī; æquales erunt anguli

A 4

alterni

alterni BET, ETP; quare erit etiam angulus ATP; adeoque arcus AP, quinquagesima totius circuli pars. Igitur cum hæc ex hypothesi contineat stadia 5000, totus telluris ambitus continebit stadia 250000, sive passuum millia 31250, siquidem 8 stadia singulis passuum millibus tribuantur. Et hæc quidem methodus de causis minus est idonea ad exactam telluris dimensionem, ac perperam ab Eratosthene assumi censent, quod Sienes & Alexandria sub eodem jaceant meridiano, quod locorum intervallum stadiorum fuerit 5000, & quod radii SP, sE pro parallelis haberi possint. Nihil tamen minus libuit hujus Astronomi artificium exponere, ut vel hinc agnoscant Tyrones quantam & utilitatem, & voluptatem ex hoc studio sibi debeant polliceri, quantoque laboris sui fructu Geometræ ex his levibus initiis, quæ nullius fere momenti videntur, gradum sibi fecerint ad ea cognoscenda, quæ longe ab oculis nostris natura seposuit.

Def. 18. Parallelogrammum est figura quadrilatera, cujus latera opposita parallela sunt. (Fig. 11.)

PROPOSITIO I.

IN omni triangulo si latus unum producatur, angulus externus æqualis est duobus internis & oppositis: Et uniuscujusque trianguli tres anguli duobus rectis æquantur.

In Triangulo ABC (Fig. 12.) producto latete AC in D, angulus BCD externus dicitur. Dico igitur primò hunc angulum æquari duobus A & B internis & oppositis.

Demonstr. Ducatur CE parallela lateri AB (per Coroll. 3. def. 17.) Erit angulus externus ECD æqualis interno & opposito BAC (Coroll. 1. def. 17.): & angulus ECB æquatur alterno ABC: ergo totus angulus BCD æquatur duobus A, B: Q.E.D.

2. Tres anguli simul sumpti trianguli ABC, hoc est A, B, BCA æquantur duobus rectis. Nam (Coroll. 2. def. 10.)

G E O M E T R I A E.

9

def. 10.) anguli BCD, BCA æquantur duobus rectis : sed BCD æquatur angulis B, & A: ergo anguli B, A, BCA æquantur duobus rectis. Q.E.D.

Coroll.

Hinc cujusvis trianguli tres anguli simul sumpti æquantur tribus angulis cujusvis alterius simul sumptis : quare si in duobus triangulis duo anguli inveniantur æquales, etiam tertius unius alterius tertio æqualis erit : & si unius trianguli duo anguli innotescant, etiam tertius notus erit.

Scholion.

Hujus propositionis usus incredibilis dictu est: Ex ea Keplerus ambitum telluris metiri docuit sine ullo ad sollem, & stellas recursu. Sint T & M (Fig. 13.) duorum montium vertices satis dissiti inter se : sitque AB arcus interceptus inter utriusque montis radices, quem diligenter metiri oportet. Præterea quam fieri poterit accuratissimè notentur anguli CTM, CMT quos pendulum efficiet per rectas TC, MC ad centrum telluris constanter vergens, & linea visualis TM. Horum angularum summam ex 180. gradibus aufer, differentia dabit Angulum ACB; ex quo cognosces quota portio totius circuli sit arcus AB, cumque hujus dimensio per notas mensuras deprehensa fuerit, ad easdem licebit totius ambitus dimensionem revocare.

Ricciolius hanc methodum adhibuit, ut ipse refert Geogr. Ref. lib. 5, cap. 33, in Turri campanaria Mutinensi in vertice montis Paterni, qui Bononia non longe abest. Invenit angulum CTM $90^{\circ}, 15', 7''$; angulum verò CMT $89^{\circ}, 26', 13'', 27''$, his ex 180° , subductis reliquus fuit angulus C $18', 39'', 33''$. Cumque locorum intrevallum AB repertum ab eo esset passuum Bononiensium $20016 \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ facile intulit gradum telluris passus continere $64363.$ ac totum proinde ambitum passus $23179680.$

Accuratius multo quæsitæ sunt a recentioribus Telluris dimensiones, ex quibus constat imminui gradus a Polis

Polis ad Aequatorem, & contra . Ad usus tamen præ-
lentes, ubi Tellurem pro sphæra habere possumus , re-
tinebimus cum Cassino Picardi mensuram , ut singuli
gradus exapedas habeant 57060; hoc est , Millaria Pa-
risiensia 68, ac præterea passus 472 . Unde totus tel-
luris ambitus continebit millaria 24649 , passus 920 .
Minor proinde quam qui a Ricciolio inventus fuerat,
ut patet si pes Parisiensis ad Bononiensem revocetur ,
qui ad illum est ut 1682 $\frac{2}{3}$ ad 1440.

5

PROPOSITIO II.

SI duo triangula duo latera habuerint æqualia , &
angulos ab his lateribus interceptos æquales ; & ba-
ses æqualem habebunt, & aream, & angulos æquali-
bus lateribus oppositos æquales.

In triangulis ABC, DEF (Fig. 14. 15.) sint AB , &
BC unius latera æqualia alterius lateribus DE, EF , &
angulus B æqualis angulo E; dico basi AC æqualem
esse basi DF, Angulos A & C angulis D & F , &
totum triangulum ABC toti triangulo DEF . Etenim si
laterus AB ejus æquali lateri DE superimporsi intelliga-
tur cum illo congruet, & ob angulum B æqualem an-
gulo E etiam laterus BC cadet super sibi æquale EF , &
punctum C in F . Ergo basis AC congruet cum basi
DF, angulus A cum D, C cum F , & totum triangu-
lum cum toto. Ergo æqualia erunt (Ax. 4.) Q. E. D.

Coroll. I.

Rectæ igitur , quæ rectas lineas parallelas, & æqua-
les jungunt, ipsæ quoque parallelæ sunt , & æquales .
Nam si BC (Fig. 16.) parallela est , & æqualis re-
ctæ AD, ductâ AC erunt (Coroll. I. def. 7.) anguli
alterni BCA , CAD æquales . Quare in duobus trian-
gulis BCA , DAC erunt latera BC , AC æqualia late-
ribus AD, AC , & anguli ab his lateribus intercepti æ-
quales . Ergo & bases æquales erunt , & anguli alter-
ni DCA, CAB; adeoque rectæ AB , CD parallelæ sunt,
& æquales .

Co-

Coroll. 2.

Si triangulum ABC (Fig. 17. 18.) sit isoscele, habens nempe duo latera AB, BC æqualia, eodem pacto ostenditur angulos A, C ab basim æquales habere. Intelligatur enim ejusmodi triangulum bis positum, & triangulum BAC superimponi triangulo b a c situ inverso. Ob æqualitatem laterum inter se, latus AB superimpósum lateri b c cum illo congruet, & ob æquales angulos B & b jacebit BC super sibi æquale latus a b, quare punctis A & C abeuntibus in r & a basi cum basi congruet, angulus A cum angulo c, & C cum a. Äquantur igitur hi anguli inter se, adeoque angulus A angulo C.

Coroll. 3.

Cum sit triangulum æquilaterum quaquaversus isoscele, omnes ejus anguli sunt æquales inter se, ac proinde erunt singuli 60 graduum. Si vero triangulum isoscele duobus æqualibus lateribus rectum angulum comprehendat, erunt duo reliqui semirecti, graduum singuli 45. (per Prop. 1.)

Coroll. 4.

Si ACB (Fig. 19.) sit diameter circuli ADF, cuius centrum in C, & centro B intervallo BG describatur alter circulus priorem secans in D, & F, ducanturque rectæ CD, DB erunt hæ (def. 5.) æquales semidiametro CB, ac proinde æquales inter se. Ergo triangulum BCD erit æquilaterum, & angulus DCB itemque arcus DB graduum 60, sive sexta pars peripheriæ ADF. Quare si iterum centro facto in A intervallo AC absindantur arcus AE, AG, constabit ratio, qua exagonum regulare (hoc est figura sex æqualibus Lateribus & angulis constans) in dato circulo inscribi possit. Illud quoque manifestum est, quomodo per gemini circuli descriptionem super data recta CB triangulum æquilaterum describi possit,

ELEMENTA
PROPOSITIO III.

Si duo triangula habuerint duos angulos æquales, & latus his angulis interjectum æquale, habebunt & reliqua latera, & areaem æqualem.

Sint anguli A, C (Fig. 14. 15.) æquales angulis D, F, & latus AC lateri DF, dico fore latera AB, BC æqualia lateribus DE, EF, & totum ABC, toti DEF. Nam si latus AC lateri æquali DF superimponi intelligatur, anguli A & C congruent cum æqualibus D & F, ac proinde latera AB, BC cum lateribus DE, EF positione congruent. Quod autem etiam terminatione congruant patet ex eo, quod si punctum B lateris AB non caderet in punctum E, sed supra, vel infra, tunc latus BC necessario caderet vel extra, vel intrà latus EF, adéoque angulus C major, vel minor foret angulo F contra hypothesim. Ergo punctum B cadit in E, & latera lateribus perfectè congruunt, & angulus B angulo E, & totum triangulum ABC cum toto DEF. Q. E. D.

Coroll. 1.

Si præter latera AC, DF æquentur anguli A, B angulis D, E; etiam C æquatur F (per Coroll. pr. 1.) ac proinde & reliqua latera, & tota triangula æqualia. Quoties igitur in duobus triangulis æquantur ita duo anguli, & unum latus: tota sunt æqualia.

Coroll. 2.

Si triangulum ABC (Fig. 17. 18.) habet angulos ad basim A, C æquales, æqualia etiam habet latera his opposita. Nam si triangulum ejusmodi bis positum intelligatur, & ABC situ inverso superimponi triangulo abc; ob æqualitatem angulorum inter se angulas A superimpositus angulo c cum illo congruet, & ob AC æqualem ac puncto C abeunte in a, angulus C congruet cum a, ac proinde AB cum bc, CB cum ab. Unde AB æquatur ipsi BC.

Coroll. 3.

Si in triangulo rectangulo acutorum unus fuerit semire-

mirectus, alter quoque semirectus erit (Coroll. 1. pr. 1.) & triangulum proinde erit ifoscele.

Scholion.

Hinc eruitur ratio omnium expeditissima ad turrium, aliorumve ædificiorum altitudines investigandas. Pareatur ex aliqua materia satis spissa triangulum MCN (Fig. 20,) rectangulum in C, & ifoscele. Ita oculo applicetur in M, ut alterum latus NC situm verticalem constanter obtineat (id quod ope penduli ex N suspensi facile perficitur) ac tamdiu ad turrim accedas, vel ab eadem recedas, donec radius visualis secundum latus MN directus in turris TR vertice T terminetur. Notetur punctum Q, in quem desinit radius MC, eritque altitudo QT æqualis intervallo MQ. Cum enim parallelæ sint lineæ NC, TQ, ac proinde angulus TQC æqualis externo NCM (Coroll. 1. def. 17.) erit TQM rectus. Quare cum sit angulus M semirectus (Coroll. 3 pr. 2.) etiam T semirectus erit, & triangulum MQT ifoscele; & latus TQ æquale lateri MQ, & tota turris altitudo TR æqualis rectis MQ, QR, quas metiri licet.

Coroll. 4.

Ex eadem propositione tertia eruitur, quod in omni parallelogrammo latera, & anguli oppositi sunt æquales, & totum parallelogrammum bifariam dividitur a diametro, sive diagonali AC. (Fig. 16.) Nam in triangulis ABC, ACD, præter basim AC communem, æquantur anguli alterni DCA, CAB, & DAC, ACB (Coroll. 1. def. 17.) ac proinde & reliquus angulus, & latera, & tota triangula æqualia sunt.

P R O P O S I T I O IV.

SI in duobus triangulis tria latera æqualia sint; & anguli æqualibus lateribus oppositi, & tota triangula erunt æqualia.

In triangulis ABC, DEF (Fig. 21. 22.) æqualia sint latera AB, BC, CA lateribus DE, EF, FD; dico etiam an-

angulos A, B, C æquales fore angulis D, E, F. Nam si latus DF concipiatur superimponi lateri æquali AC, vertex E cadet in B. Cadat enim, si fieri potest, extra verticem B in aliquod punctum G. Quoniam ex hypothesi AB æquatur lateri AG, & BC ipsi GC; ducata BG, erunt isoscelia triangula BAG, BCG, ac proinde angulus ABG æqualis erit angulo AGB, (Coroll. 2, prop. 2.) qui cum sit minor angulo CGB, pars toto, etiam ABG minor erit eodem angulo BGC. Jam verò cum sit etiam triangulum BCG isoscele, erit idem angulus CGB æqualis angulo CBG: ergo prior ille ABG minor esset etiam hoc ultimo GBC, totum parte, quod est absurdum. Igitur non possunt esse latera AB, BC æqualia lateribus AG, GC, quin punctum G cadat in B. Quare [si triangulum DEF triangulo ABC superimponatur, uti dictum est, perfectè congruent, angulique, & areæ æquales erunt. Q.E.D.

Coroll.

Duo igitur circuli nonnisi in duobus punctis se mutuò intersecant. Nam si recta AC (Fig. 23.) centra jungat duorum circulorum se mutuò secantium in B & H; ductis rectis lineis AB, BC, sequitur ex modo demonstratis inveniri non posse ex parte ipsius B punctum aliud G, ad quod ductæ lineæ AG, GC æquentur duabus AB, BC: quod tamen necesse esset, si punctum G in utriusque circuli peripheria situm esset, adeoque si in eo punto iterum se circuli intersecarent.

PROPOSITIO V.

Datum angulum rectilineum bifariam dividere.

Oporteat bifariam dividere angulum rectilineum HCl. (Fig. 24.) Centro facto in C, quolibet intervallo CA describatur circulus EAL secans alterum latus in B, ac deinde centrī A & B, eodemque intervallō noctentur arcus circulorum sibi inutuo occurrentium in K, & ducta KC, dico quod hęc datum angulum bifariam frabit. Etenim in triangulis ACK, BCK ex constructio-

G E O M E T R I A E.

15

ne latera AC , AK æquantur lateribus CB , BK , & basi CK utriusque communis est: ergo (prop. 4.) anguli æqualibus lateribus oppositi æquales sunt, adeoque angulus ACK æquatur angulo KCI : Q.E.F.

Scholion.

Anguli trisection, sive methodus, qua quivis angulus in tres partes æquales dividi possit, frustra a Geometris quæsita est per circinum & regulam. Franciscus Vieta solutionem hujus problematis mechanicam dedit, sed elegantem, & expeditam. Sit angulus HCI (Fig. 25.) quem oporteat in tres partes dividere. Centro facto in C quovis intervallo CA describatur circulus ABD secans latus Cl in B , & latus HC indefinite productum versus F in A & D . Regula BF circa punctum B moveatur, donec ita occurrat rectæ AD in F , ut segmentum EF inter hoc punctum, & peripheriam interceptum circino inveniatur æquale rectæ CA (id autem est, quod geometricè fieri nequit): tunc sumptis arcibus AG , GK æqualibus arcui DE , ducantur rectæ CG , CK ; eritque angulus HCI in tres æquales partes divisus. Etenim ducta CE , erit hæc æqualis radio CA , cui per constructionem æqualis est recta EF ; erit ergo isoscele triangulum CEF , at propterea æquales anguli ECF , EFC (Coroll. 2. prop. 2.). Quare cum angulus externus CEB horum quolibet duplus sit (Prop. 1.) cumque sit etiam triangulum BCE isoscele, erit etiam angulus CBE duplus angulo F . Ergo angulus externus BCH æqualis duobus internis oppositis B & F , triplus erit angulo F , sive ECD , qui est illi æqualis; ac propterea triplus erit tam angulo ACG , quam angulo GCK . Unde etiam KCB tertia pars est totius HCB , & HCB in tres æquales partes divisus est: Q.E.F.

Coroll. I.

Si puncta AB , (Fig. 24.) jungantur recta AB , que occurret rectæ CK in D , in triangulis ACD , BCD , præter latera AC , CB æqualia, & latus CD commune, anguli ACD , BCD ab æqualibus lateribus intercepti æquales

les

les sunt : ergo etiam basis AD basi DB æqualis erit (Prop. 2.). Quare si rectam terminatam AB bifariam dividere oporteat , vides quid factio opus sit . Nempe centro factio in A, & B quolibet intervallo , dummodo utrobique idem sit , satis erit notare arcus circulorum sibi mutuo occurrentium in punctis C & K, & hæc puncta jungere recta CK , quæ datam lineam bifariam secabit in D.

Coroll. 2.

Ex eadem prop. 2. constat æquari angulos CDA , CDB: ac propterea CD perpendicularis est rectæ AB . Ergo si ex punto C demittere oporteat perpendicularem lineam in rectam indefinitam FG , satis erit centro C, & quolibet intervallo CA notare arcum circuli AB , & invento, uti supra dictum est , punto K , rectam ducere CK, quæ ad perpendicularum insisteret recte datæ in punto D.

Coroll. 3.

Quod si in ipsa recta FG detur punctum D , ex quo perpendicularum oporteat excitare , sumptis ad arbitrium AD, BD hinc & inde æqualibus ; centro facto in A & B , eodem intervalllo notentur arcus circulorum , qui se mutuò intersecant in C , ducaturque CD , quæ erit perpendicularum quæsิตum . Nam in triangulis CDB , CDA latera omnia æqualia erunt , ac propterea anguli CDB, CDA æquales (per Pr. 4.)

Coroll. 4.

Ex iisdem demonstrationibus patet , quod in circulo EABL recta CD per centrum transiens , si bifariam secat chordam AB , secat etiam ad angulos rectos : & si secat ad angulos rectos bifariam secat.

Schol. 2.

Ex perpendiculariarum doctrina , ac præcipue ex prop. 3. ratio pendet iactus reflexi in ludo trudiculare , sive unica reflexione opus sit , sive duplice .

Præmittere tamen oportet tamquam experientia notum , globum perfecte elasticum A (Fig. 26.) cuiusmodi ferè sunt eburnei , obliquè occurrentem piano

immo-

immobili CD in B ita resilire versus E, ut fiat angulus reflexionis DBE æqualis angulo incidentiæ CBA: quam legem in luminis reflexione natura constanter servat.

Sit igitur MCDF (Fig. 27.) mensæ lusoriæ portio, in qua sphæram eburneam A tracicere oporteat per anulum ferreum E ex parte ipsius, quæ respicit punctum N. Producatur EN ad CD perpendicularis in I, donec fuerit IN æqualis ipsi NE. Sphæra impellatur versus punctum I, quæ occurrens repagulo immobili in B resiliet per BE, anulumque tracicet. Etènime in triangulis EBN, IBN æquantur latera EN, NI, & BN utriusque communè; quare cum æquentur anguli recti BNE, BNI ab his comprehensi, tota æqualia sunt (Prop. 2.), & anguli EBN, IBN æquales. Sed angulus IBN æquatur angulo CBA ad verticem opposito (Coroll. 4. def. 10.); ergo etiam angulus NBE æquatur angulo CBA, & sphæra impulsâ per rectam BA resiliet per rectam BE.

Si in linea AB alia sphæra jaceat quæ motum per AB impedit, id ipsum duplici reflexione poterit hoc pacto obtineri. Ex A ducatur in repagulum CM perpendicularm AM, quod producatur in L, donec fuerit LM æqualis ipsi AM. Ex L inspiciatur idem, de quo supra, punctum I, & notentur puncta K, H, quibus in utroque repagulo linea visualis occurret. Dico, quod si sphæra impingat in K, inde resiliet per KH, & iterum impingens in H resiliet per HE, anulumque tracicet. Nam demonstrabitur ut supra æquari angulos AKM, LKM, CKH, itemque KHC, IHN, NHE.

Si recta LI tota jaceret extra angulum C, casus esset impossibilis. Sæpe etiam continget, ut repagula MC, CD vel superficiem habeant inæqualem, vel non satis firma sint, in quo casu angulus reflexionis angulo incidentiæ æqualis non erit. Ad hæc ipsa sphæræ moles, cuius nullam habuimus rationem, si satis magna sit, aliquem producat errorem, præsertim in angulis valde acutis.

ELEMENTA
PROPOSITIO VI.

Parallelogramma super eadem basi, & intra easdem parallelas constituta aequalia sunt inter se.

Super eadem basi AD (Fig. 28.), & intra easdem parallelas AD, BF, sunt parallelogramma ABCD, AEFD. Dico hęc aequalia esse.

Dem. In triangulis ABE, DCF aequaliter latera AE, DF, & AB, DC (Coroll. prop. 3.), itemque EF, & BC aequales eidem AD, aequales erunt inter se: itaque addito communi segmento CE, erit quoque latus BE aequale lateri CF, & tota triangula aequalia (Prop. 4.) Dein pro igitur communi triangulo CLE, erit quadrilaterum BCLA aequale quadrilatero DLEF, & addito communi triangulo ALD erit parallelogrammum ABCD aequale parallelogrammo AEFD. Q.E.D.

Coroll. 1.

Ductis AC, AF erunt triangula ACD, AFD parallelogramorum dimidia (Coroll. 4. pr. 3.) Ergo etiam triangula super eadem basi, & intra easdem parallelas constituta aequalia sunt.

Coroll. 2.

Si non eidem basi; sed aequalibus tamen basibus intra easdem insistant parallelas, & triangula, & parallelogramma erunt aequalia. Etenim si parallelogramma DB, HE habent aequales bases AD, GH, ductis rectis lineis AE, DF ob AD & EF parallelas, & aequales eidem GH: adeoque & inter se, erunt AE, DF parallele, & aequales (Coroll. 1. pr. 2.), eritque AEFD parallelogrammum, quod cum sit aequale parallelogrammis ABCD & EGHF erunt hęc aequalia inter se.

Coroll. 3.

Igitur parallelogramnum duplum est trianguli super eamdem vel aequalem basim, & intra easdem parallelas constituti.

Scholion.

Multa ex hac propositione & mira, & utilia descendent. Ac primo quidem ostenditur, nullam esse quantitatem

titatēm ita tenuem ; qua minor dari non possit. Cum enim recta BF in infinitum produci possit , puncto F magis ac magis recedente à puncto B ; dummodo sumatur EF æqualis recte BC, sive AD ; semper parallelogrammum AEFD utcumque productum æquale erit parallelogrammo ABCD ; unde apparet nullum in eo producendo ; vel attenuando limitem inveniri : Quod si hec parallelogramma sint corporum superficies, quæ ex. gr. habeant unius digiti grossitudinem, poterit idem corpus in infinitum attenuari, & produci :

Secundò: licebit metiri planam quamlibet superficiem in plura divisam triangula, & agitorum dimensiones ad invicem comparare ; in qua re cum veterum Geometrarum potissimum se exerceret industria, inde facultas ipsa & nomen habuit, & ortum. Nam in primis quodlibet rectangulum BD (Fig. 29.) tot unius pedis quadrata; sive, ut ajunt, quadratos pedes continebit, quot prodeunt ; si unum latus per alterum multiplicetur ; quandoquidem si latus AD quatuor continet pedes , AB, verò quinque, ductis totidem lineis adjacenti lateri parallelis, quatuor erunt ordines quadratorum pedum, & in singulis ordinibus quinque pedes quadrati ; quare ut omnium summam habeas, duc 4 in 5, & habebis 20 pedes quadratos totius areæ dimensionem . Jam verò triangulum AED super eadem basi, & intra easdem parallelas ejus rectanguli dimidium est ; & demissa perpendiculari EF in basim AD productam , si opus fuerit, erit hæc æqualis lateri AB . Unde ad habendam aream trianguli , dimidia basis in ejus altitudinem ducenda erit ; vel dimidia altitudo in basim . Sic in eadem hypothesi dimidia basis duorum pedum , ducita in altitudinem EF quinque pedum ; dabit 10 pedes quadratos ; qui erunt ejus trianguli dimensio .

Igitur si metiri oporteat superficiem polygoni ABCDE (Fig. 30.) dividatur in triangula ; ductis rectis DB , DA ab uno angulorum in alios ; & habebitur singulorum dimensio ex basis, & altitudinis dimensione , quæ in singulis fuerit inventa . Contineat ex. gr. basis BD.

pedes 30, altitudo CF 20, duc 30 in 10, sive 15 in 20; habebis pedes quadratos 300, dimensionem trianguli BCD. Quod si idem in reliquis triangulis facias, habebis ex omnium summa totius polygoni dimensionem.

Eadem ratione areæ circularis dimensio obtinetur. Cum enim circulus ABE (Fig. 31.) divisus possit intelligi in infinitos sectores BCD, qui nullam ferè habeant curvitatem in arcu infinitè parvo, hi pro triangulis haberri possunt, quorum basis sit arcus BD, altitudo verò radius CB; itaque singulorum dimensio habetur ducendo radium BC in dimidium arcum BD; adeoque omnium summa, seu, quod perinde est, area circularis æquatur facto ex dimidia peripheria in radium. Itaque si circularis areæ mechanica dimensio queratur, peripheriam, & radium metiri oportet, & hunc in dimidiā ducere peripherianū.

PROPOSITIO VII.

IN omni triangulo rectangulo quadratum lateris angulo recto oppositi æquatur quadratis reliquorum laterum simul sumptis.

Sit triangulum BCD (Fig. 32.) rectangulum in C. Dico quadratum BAGD hypothenusę, seu subtensem DB (sic enim vocant latus angulo recto oppositum) æquari quadratis reliquorum laterum DHIC, CKLB simul sumptis. Ducatur enim CF parallela lateribus BA, DG (per Coroll. 3. def. 17.), & rectæ BH, CG. In duobus triangulis CDG, HDB latera DG, DC æquantur lateribus DB, DH (per def. 15.) anguli verò ab his lateribus comprehensi GDC, BDH æquales sunt, cum ambo coalescant ex angulo recto, & angulo CDB utrique communi. Ergo tota triangula æqualia sunt (per prop. 2.) Sed triangulum GCD habet eamdem basim cum rectangulo DGFE, & intra easdem parallelas GD, CF continentur; ergo hoc rectangulum hujus trianguli duplum est (per prop. 6.). Similiter quadratum DCIH duplum est trianguli DBH, sunt enim super eamdem basim HD, & intra easdem parallelas HD, IB constituta

tuta; ergo cum æqualia sint triangula, erit etiam quadratum HICD æquale rectangulo GDEF. Eadem demonstratione ostenditur quadratum CBLK æquari rectangulo FEBA: ergo quadratum subtensæ DB æquatur quadratis laterum rectum angulum comprehendentium:

Q. E. D.

Coroll.

Quod si quadrata duorum laterum in triangulo simul sumpta æqualia sint tertii lateris quadrato, facile ostenditur angulum huius latéri oppositum rectum esse. Nam si in triangulo ACB (Fig. 33.) quadrata laterum AC, CB simul sumpta æquentur quadrato lateris AB, ex puncto C erigatur super CB perpendicularis CD (per Coroll. 3. pr. 5.) quæ fiat æqualis latéri CA, & ducta BD, erit hujus quadratum æquale quadratis laterum BC, CD, sive BC, CA per construct. adeoque etiam quadrato AB ex hypothesi. Igitur recta AB æquatur rectæ BD, &c (per prop. 4.) triangula ACB, BCD æqualia sunt, & Angulus ACB æqualis angulo BCD, qui rectus est per constructionem.

Scholion.

Per hanc propositionem, cuius auctor fertur Pitagoras, datis in triangulo rectangulo duobus lateribus, tertius inveniatur. Nam si unum latus ex. gr. 3. palmorum sit, alterum 4; quadratum primi 9 quadratos palinos continebit, quadratum alterius 16; igitur horum summa dabit quadratum lateris angulo recto oppositi palmorum 25, cuius radix erit ipsa lateris extensio, quinque scilicet palmorum. Contra si derur latus angulo recto oppositum 5 palmorum, & alterum latus 3 palmorum, ex primi quadrato 25 aufer quadratum secundi 9, & differentia 16 erit quadratum lateris quesiti, eius radix 4 est ipsum latus.

Porrò sicuti factum ex numero in seipsum ducto numeri quadratum dicitur, ita numerus qui in seipsum ductus datum efficit numerum hujus radix quadrata dicitur. Ita quadratum 3 est 9, & radix 9 sive $\sqrt{9}$ (sic enim radices designantur) est 3. Igitur datis in triangulo rectangulo lateribus duobus, ytriusque qua-

dratum, ac propterea quadratum tertii lateris numquam non licebit obtinere. At non semper ipsius quæsiti lateris exacta habebitur dimensio, quandoquidem non omnis numeri quadrata radix inveniri potest nisi per approximationem. Sic Radix 1 est 1, & $\sqrt{4}$ est 2, at ipsius 2 non potest accurate radix inveniri, cum nullus sit numerus vel integer vel fractus, qui in seipsum ductus efficiat 2. Definiunt Arithmeticci $\sqrt{2}$ quamproxime: æqualem nempe 1. 4 1 4 2 &c. hoc est, unitati, quatuor decimis partibus unitatis, uni centesimæ, quatuor millesimis, duabus denismillesimis: verum super sunt adhuc ad exactam radicem obtinendam plus quam duæ, & minus quam tres denæ millesimæ partes unitatis, & numquam ea radix determinabitur, quin aliqua quantitate vel a vera deficiat, vel veram excedat. Si itaque latera rectum angulum comprehendentia æqualia sint, subtensa latus unum continebit, ac præterea quatuor decimas ipsius partes, 1 centesimam 4 millesimas, 2 denas millesimas, & sic in infinitum; ita ut aliquid semper supersit, nec ullo possit vel integrum, vel fracto numero exactè definiri: ex quo quantitatum divisibilitas in infinitum colligitur.

Hinc etiam quantitatum incommensurabilium notitia pendet. Mensura quantitatis dicitur quantitas, quæ aliquoties sumpta illam adæquat. Ita pes est passus mensura, qui quinque pedibus constat; digitus est mensura pedis Parisiensis, qui duodecim digitis constat; at ejusmodi digitus pedem Romanorum non metitur, nam decies sumptus ipsum non adæquat, & undecies sumptus ipsum excedit, siquidem pes Romanus decem continet digitos Parisenses ac præterea 11 partes ipsius duodecimas, posita ratione pedis Parisiensis ad Romanum, ut 144 ad 131.

Quantitates commensurabiles dicuntur illæ, quæ aliquam habent communem mensuram: Ita pes Romanus, & Parisinus commensurabiles sunt, communemque mensuram habent Lineam sive duodecimam digiti partem, siquidem Parisinus ejusmodi Lineas continet 144, Romanus 131.

Con-

Contra incommensurabiles sunt, quæ nullam habent mensuram communem.

Quod dentur ejusmodi. quantitates incommensurabiles etiam Geometria demonstrat, cum geometricè demonstretur in triangulo rectangulo & Isoscele ABC (Fig. 34) nullam esse communem mensuram lateris AB, vel BC, & subtensiæ AC. Duo tamen præmittere oportet axiomata, quæ ex data Mensuræ definitione per se patent.

I. Quod metitur totum, & ejus partem, etiam residuum metitur,

II. Quantitas major minorem metiri non potest.

Sit igitur, si fieri potest, BM communis mensura basis AC, & laterum. Bifariam dividatur angulus BAC (per prop. 5.) per rectam AE, quæ occurrat in E lateri BC, & ex E ducatur in basim perpendicularum EF (per Coroll. 2. prop. 5.), ducaturque EG basi parallela (per Coroll. 3. def. 17.) In duobus triangulis AEB, AEF præter basim AE communem, & angulos ad B & F rectos, æquales erunt anguli ad A: ergo etiam latera AF, FE æquantur lateribus AB, BE (per Coroll. 1. prop. 3.) Præterea ob parallelas GE, AC facilè ostenditur esse etiam isoscelē triangulum GBE (Coroll. 1. def. 17. & Coroll. 2. prop. 3.) cumque duobus triangulis rectangulis EFC, ABC communis sit angulus C: erit (Coroll. pr. 1., & Coroll. 2. pr. 3.) isoscelē etiam triangulum EFC: Quare ob æqualia latera EB, EF, erunt etiam æqualia BG, FC, eruntque æqualia (per prop. 2.) triangula rectangula EBG, EFC, & æquales bases EG, EC. Quod si iterum bifariam fecetur angulus BGE per rectam GH, & demittatur HL perpendicularis in GE. & HI eidem parallela, eadem demonstratione invenientur æquales rectæ lineæ GB, GL; BH, HL: BI, LE, ac demum HI, HE: eademque omnino contingent, si hæc operatio continuari intelligatur donec recta respondens ipsi GH cadat alicubi in D supra M.

Jam vero si BM metiebatur & latera AB, BC, & basim AC, metietur quoque AF æqualem ipsi AB, er-

go per primum axioma ex paulo ante traditis metietur quoque ipsius residuum FC, & GB, BE ipsi æquales: sed metiebatur totam BC, ergo etiam residuum EC, & ipsi æqualem GE. Eodem argumento ostenditur eamdem BM metiti rectas GL, LE, IB, BH, HE, HI &c. unde patet eo demum deveniri ut eadem BM metiatur quoque BD se minorem, quod implicat per axioma secundum. Ergo nequit inveniri communis mensura laterum AB, BC, & basis AC, licet minor & minor infinitum inquiratur.

PROPOSITIO VIII.

IN omni triangulo majori lateri major angulus opponitur.

In triangulo ABC (Fig. 35.) sit latus AB majus latere AC; dico etiam angulum ACB majorem fore angulo ABC.

Demonst. abscindatur ex majori latere segmentum AD æquale lateri AC, & ducta CD erit triangulum ACD isoscele, adeoque (Coroll. 2. prop. 2.) angulus ADC æqualis erit angulo ACD: sed CBA minor est externo CDA (prop. 1.) ergo minor est angulo ACD, & adhuc minor angulo ACB, Q.E.D.

Coroll. I.

Hinc sequitur in omni triangulo majori angulo majus latus opponi. Sit enim angulus ACB major angulo ABC; latus AB non erit lateri AC æquale, nam triangulum esset isoscele, & anguli praedicti essent æquales (Coroll. 2. prop. 2.): sed neque latus AB minor est latere AC, nam angulus ABC major esset angulo ACB ex demonstratis, reliquum ergo est, ut AB majus sit latere AC.

Coroll. 2.

Quod si igitur in duobus triangulis ABC, ABD (Fig. 36.) fuerint duo latera AB, BC, æqualia duobus AB, BD, anguli vero ab his lateribus comprehensi fuerint inæquales, erit basis AD qua majorem angulum subgredit,

tendit; major quam AG minori angulo opposita. Nam si intelligatur unius trianguli latus AB lateri alterius sibi æquali superimponi, ut hic factum supponitur, congruent quidem ista latera, sed latus BD cadet extra latus BC ob angulum ABD majorem angulo ABC. Jam verò centro facto in B intervallo BD describatur circulus, qui transibit per C ob æquales BD, BC, ducaturque CD. Erit CBD isoscelē, in triangulo verò AC D angulus ACD major est angulo BCD, ac proinde angulo quoque CDB (per Cor. 2. pr. 2.) ergo multo major erit angulo CDA; adeoque latus AD oppositum angulo majori majus est latere AC, quod minori opponitur.

Coroll. 3.

Contra verò si duo triangula, duo latera habuerint æqualia, unius vero basis alterius basi major sit, erit angulus basi oppositus in illo major quam in hoc. Nam si hos angulos æquales esse dicas, bases quoque æquales esse opportebit (per prop. 2.) quod est contra hypothesim; si vero dicas angulum minori basi oppositum majorem esse, ex modo facta demonstratione constabit hunc angulum a majori basi subtendi, quod hypothesi item repugnat.

Coroll. 4.

Omnium rectarum, quæ ab aliquo puncto G (Fig. 37.) duci possunt ad rectam indefinite productam KL, brevissima est perpendicularis CB; nam si ducatur alia quævis CA in triangulo rectangulo CBA erunt anguli G & A simul sumpti recto æquales (Coroll. 3. prop. 2.): ergo angulus A minor est recto ABC, adeoque latus AC majus est latere CB; id quod etiam ex præcedenti constat, siquidem quadratum lateris AC æquatur quadratis laterum AB, BC simul sumptis.

Coroll. 5.

Quod si igitur centro facto in C intervallo CB circulus describatur, hic rectam CA alicubi secabit in G ita ut absindat CG æqualem CB. Ergo quodlibet punctum A rectæ AL extra circulum cadet, qui propterea tan-

tangitur ab hac recta in unico puncto B, in quo perpendicularis est diametro BC. Recta igitur, quae ab extrema circuli diametro eidem perpendicularis ducitur, circuli tangens est,

Coroll. 6.

Si ducatur BF sub angulo quantumvis tenui ABE, eique fiat æqualis angulus BCA, in triangulo EBC, erunt duo anguli EBC, & BCE simul sumptui æquales recto ABC: ergo tertius angulus CEB rectus erit (prop. 1.), & recta CE erit per hanc minor recta CB, sive CG. Quare punctum E erit intra circulum. Ex quo sequitur inter tangentem AB & arcum circuli nullam duci posse rectam lineam BEF; & angulum, quem arcus circuli efficit cum tangente minorem esse quolibet rectilineo, licet hic in infinitum minuatur.

Coroll. 7.

Si duo circuli FGB, IQB (Fig. 38.) eamdem habent tangentem, recta PB eidem in eodem puncto perpendicularis per utriusque centrum C, D transibit, id quod ex Corollario quarto facile deducitur. Quod si ducatur CG, & DG, quæ producta secabit in O circulum IOB, & in N tangentem AB, erit semper in triangulo GDC latus DG minus duobus reliquis GC, CD simul sumptis (quod etiam facile ostenditur per hanc, & Coroll. 2. prop. 2; & per se patet): Quare cum radii CG, CB æquales sint, erit recta DG minor quam DB, sive DO, quæ item ut DB radius est circuli IOB. Ergo quodlibet punctum G circuli FGB erit intra circulum IOB, ac propterea illi circuli in unico puncto B se mutuo contingat ubi rectam tangunt AH.

Schallion.

Hinc quoque divisibilitas in infinitum, & admirabilis infiniti natura deducitur. Nam si adhuc supra punctum D centro facto in L describatur circulus QMB, ille quoque dictos circulos, & communem tangentem AH in unico puncto B contingat, ac proinde rectam DN alicubi secabit in M inter O & N, & si alii & alii in infinitum majori semper radio describantur circuli,

culi, minus semper abscedent segmentum MN, illudque in totidem partes secabunt; cumque incrementa radii circulorum nullum habeant limitem, nullum pariter habebunt decrementa rectæ MN. Quod ydò majorem habet admirationem, & magnas omni tempore concertationes excitavit, angulus contactus, quem scilicet facit arcus FGB cum tangentे AB in infinitas partes dividitur ab arcibus illorum circulorum, licet ipse quovis angulo rectilineo minor sit ex Coroll. 4. Hujus rei non alia videtur esse causa, quam anguli rectilinei natura diversa ab ea quam habet angulus curvilineus in puncto contactus: ita ut, quemadmodum infinitæ lineæ numquam superficiem efficiunt, nec ulla inter has quantitates ratio potest assignari licet in infinitas partes dividi possint; ita etiam infiniti anguli contactus quovis rectilineo minores sint, licet sint divisibiles in infinitum. Et licet id majorem habeat admirationem; tamen Geometras demonstrationes percipienti erit evidens angulum contactus & minorem esse quovis rectilineo, & in infinitos curvilineos dividi posse.

P R O P O S I T I O IX.

IN circulo angulus ad centrum duplus est angulo ad peripheriam, si eidem arcui insistant.

Eidem arcui AB (Fig. 39. 40. 41.) insistant anguli ACB ad centrum, & ADB ad peripheriam: dico primum illum hoc altero duplum esse.

Nam si alterutrum latus DA per centrum transeat (ut in Fig. 39.) cum æquales sint anguli CDB, CBD in triangulo isoscele BCD, erit externus BCA æqualis duobus internis oppositis CDB, CBD (prop. 1.) ac duplus ipsorum utrovis D.

Quod si centrum C cadat vel intra angulum, ut in Fig. 40., vel extra, ut in Fig. 41., ducta DCE, erit ut supra angulus externus ACE duplus interno opposito ADE, itemque ECB duplus angulo EDB: quare angulus

ACB

\widehat{ACB} , qui est angulorum ACE , ECB summa in primo, differentia in secundo casu, duplus est angulo ADB , qui angulorum ADE , BDE est item summa in primo, differentia in secundo casu: Q.E.D.

Coroll. 1.

Quare sicut anguli ad centrum mensura est totus arcus, cui insitit, erit anguli ad peripheriam mensura dimidium illius arcus. Angulus igitur ADB (Fig. 42.) diametro AB , hoc est semiperipheriae AFB insitens, quique angulus in semicirculo dicitur, mensuram habet quartam circumferentiae partem, ac rectus proinde est; angulus EDB in minori segmento existens, ac propterea arcui majori EFB insitens obtusus, ac demum angulus FDB in majori segmento acutus est.

Coroll. 2.

Si ex dato puncto A (Fig. 43.) ducete oporteat rectam lineam, quae datum circulum tangat, ducta A C ad centrum dati circuli C , eaque bifariam divisa in B (Coroll. 1. pr. 5.) centro facto in B , intervallo BA describatur circulus priorem secans in D & E , ducanturque rectae AD , AE , quae circulum tangent (Coroll. 5. prop. 8.). Junctis enim punctis E , C , D rectus erit tam angulus AEC , quam ADC , cum uterque in semicirculo existat.

Coroll. 3.

Hinc quoque manifestum fit in omni quadrilineo $ABCD$ (Fig. 44.) circulo inscripto angulos oppositos simul sumptos duobus rectis aequari. Etenim mensura anguli ABC est dimidius arcus ADC , & mensura anguli ADC est dimidius arcus ABC . Quare utriusque simul mensura est semicirculus, sive 180° . Unde etiam facile deducitur, quod quadrilineum, in quo anguli oppositi duobus rectis aequaliter quantur, in eodem circulo existit.

Coroll. 4.

Mensura anguli ABC (Fig. 45.), quem efficiunt chordae CD , AE intra circulum concurrentes, erit semisumma arcuum interceptorum AC , DE : mensura vero anguli

guli AFC, quem efficiunt chordæ AE, CG extra circulum concurrentes erit semidifferentia arcuum intersectorum AC, EG. Ducta enim EC erit angulus externus AEC (Prop. 1.) æqualis duobus internis oppositis BCE, BCE, quorum alterum metitur dimidius arcus AC, alterum dimidius arcus DE; horum igitur summam, sive angulum ABC metitur semisumma eorumdem arcuum. Pariter cum angulus externus AEC æquetur internis oppositis ECF, EFC, erit angulus AEC dempto angulo ECG æqualis angulo F, sed anguli AEC mensura est dimidius arcus AC, & anguli ECG dimidius arcus EG. Ergo mensura anguli F est dimidius arcus AC dempto dimidio arcu EG, sive semidifferentia eorumdem arcuum.

Coroll. 5.

Si chordæ circuli AB, CD (Fig. 46.) parallelæ sint, ducta CB, erunt anguli alterni DCB, CBA æquales (Coroll. 1. def. 7.) ac proinde arcus quoque AC, DB æquales sunt, cum ipsorum dimidia æquales angulos metiantur. Ergo lineæ in circulo parallelæ æquales utrinque arcus intercipiunt.

Coroll. 6.

Angulos ABE, ABF (Fig. 47.) quos efficit chorda BA cum tangente EF metiuntur arcus dimidii BA, BDA. Etenim cum sit diameter DB tangentis perpendicularis (Coroll. 3. prop. 8.) & ducta AD angulus in semicirculo DAB rectus sit, erunt anguli reliqui ejusdem trianguli ADB, ABD simul sumpti æquales recto EBD (Coroll. 3. prop. 2.). Quare sublato communi ABD erit reliquus ADB æqualis reliquo EBA, ac proinde hujus mensura eadem erit quæ anguli ADB, dimidius neinpe arcus AB. Præterea anguli ABE, ABF duobus rectis æquantur, (Coroll. 2. def. 10.) & mensuram habent semicirculum, quare cum angulum ABE metiatur dimidius arcus AB, anguli ABF mensura erit dimidiuni residui ADB.

Scholion.

Plerique propositionum, quas Euclides in secundo libro demonstravit, vel etiam in tertio, facilius demon-

monstrantur, præmissis aliquibus ex sexto, quæ Proportionum doctrinam supponunt: Hanc ab Euclide fuisse traditam & obscurè in quinto breviter hic & dilucide exponemus.

Nosse oportet in primis notarum quarundam significationem, quarum usus in Algebra frequens est. Literæ a , b ; c &c. denotant quælibet quantitatem, & ut à cognitis incognitæ discriminentur has denotare, solent postremis alphabeti litteris x ; y , z &c.

Signum additionis est $+$; effertur autem plus ita $2 + 3$ legitur; duo plus tria; ac denotat utriusque illius numeri summam.

Signum subtractionis est $-$, effertur autem minus: Sic $5 - 2$, legitur, quinque minus duo, ac denotat id quod relinquitur, si e priori numero posterior auferatur.

Signum æqualitatis est $=$, sic $2 = 3$ denotat summam duorum numerorum tertio æqualem esse. $>$ est signum excessus unius quantitatis super aliam: $<$ verò est signum defectus unius quantitatis ab alia. Sic $10 > 8$ denotat denarium numerum majorem esse quam 8; & $7 < 9$ denotat esse minorem quam 9.

Si quantitati quantitas interposita lineola subjiciatur, quotum denotat ex superiori per inferiorem divisa: sic $\frac{a}{b}$ denotat quotum ex a divisa per b , seu quoties inferior terminus b qui denominator dicitur, in superiori, seu numeratore contineatur. Sic $\frac{8}{2} = 4$. Designari etiam solet divisio unius quantitatis per alias duabus punctis litteris interjectis, sic $a : b = \frac{a}{b}$.

Demum signum multiplicationis est \times , & efferti solet in: sic $a \times b$ legitur a in b , & denotat factum ex multiplicatione ipsius a per b : Sic $2 \times 3 = 6$, hoc est 2 ter sumpta efficiunt 6: Cæterum multiplicatio quantitatum per litteras communiter designari solet per immediatam ipsarum litterarum conjunctionem. Sic $a b$ deno.

Denotat factum ex a in b , sive a toties sumi, quod unitates continentur in b , si b numerus est integer. Quod si quantitas se ipsam multiplicet, denotatur factum apponendo litteræ ad partem ejus dextimam numerum, qui aliquantulum supra ipsam litteram assurgat. Sic aa , sive quadratum a scribitur a^2 ; & aaa , sive cubus ipsius a scribitur a^3 ; & sic deinceps.

Propo^ttio alia est Arithmetica; alia Geometrica. Arithmetica est quæ inter quatuor terminos invenitur, quorum duo p^timi æque differunt inter se, ut duo reliqui, ita ut si primus secundo major est, etiam tertius major sit quarto; & contra. Indicatur autem hæc proportio punctis quibusdam hoc pacto $3:5::7.9$. Sunt nempe hæc quantitates arithmetice proportionales, quia eadem quantitate differunt 3 & 5 , 7 & 9 , duabus scilicet unitatibus. Ex quo fit, ut in Arithmetica proportione summa extre^morum semper æqualis sit summa mediorum, cum quartus terminus tertium contineat, atque id præterea, quo secundus differt a primo sic $3 + \frac{1}{9} = 5 + \frac{1}{7} = 12$.

Proportio Geometrica est quæ inter quatuor terminos intercedit, quorum primus toties secundum continet, vel aliquam ejus partem; quoties tertius continet quartum, aut similem ejusdem partem: vel etiam generalius, quorum primus ita continet secundum, quemadmodum tertius continet quartum. Hæc autem ipsa continentia dicitur ratio unius termini ad aliud, quorum primus dicitur antecedens, secundus consequens, & illo aucto; hoc imminuto ratio crescit. Hæc proportio punctis ita indicatur $a.b::c.d$; nempe, ita est a ad b , ut c ad d . Sic $4.2::6.3$; quia sicut antecedens prima rationis 4 bis continet suum consequentem 2 , ita antecedens secundæ rationis 6 bis continet suum consequentem 3 : & $3.7.::6.14$, quia sicut numerus 7 bis continet 3 , ac præterea tertiam ipsius partem 1 , ita 14 bis continet 6 , ac præterea tertiam ipsius partem 2 . Et in genere ut sit $a.b::c.d$, si $a = mb$, oportet ut etiam sit $c = md$.

Ex data rationis explicacione duo inferuntur.

I. Ratio est ille ipse numerus m , qui exprimit relationem termini primi ad secundum: unde si primus bis continet secundum, dicitur *duplam* ad hunc rationem habere, si ter, *triplam* &c. Si vero continet ejus dimidium, dicitur habere ad illum rationem *subduplam*, si tertiam partem *subtriplam* &c. Quare ratio a ad b scribi potest tamquam si fractio esset $\frac{a}{b}$, aut $a:b$.

II. Termini æquales eamdem habent ad alium rationem, & si eamdem habeant ad alium rationem æquales sunt.

PROPOSITIO X.

IN terminis geometrico proportionalibus factum extremitatum æquatur facto mediorum: & contra, si factum sub extremis terminis æquatur facto sub mediis, ipsi termini sunt geometricè proportionales.

Sit $a:b::c:d$ & si m exprimat quomodo, aut quoties b contineatur in a , ita ut sit $a = mb$, erit etiam ex proportionum notione $c = md$: est ergo $ad = mbd$, & $cb = mbd$, sunt autem mbd , & mdb idem factum ex b in d iterum ductum in m , ergo $ad = cb$: sive factum ex primo in quartum æquale facto ex secundo in tertium, quod erat primum.

Sit jam $ad = cb$, dico esse $a:b::c:d$. exprimat m rationem a ad b , sive sit $a = mb$. Erit $ad = mbd$, sed $ad = bc$, ergo $cb = mbd$, sive dividendo per $b:c = m:d$, hoc est, idem numerus m exprimet etiam rationem c ad d : Q. E. D.

Coroll. I.

Primæ hujus propositionis parti nititur régula, quam auream vocant Arithmetici, sive trium. Emit aliquis 15 frumenti modios auréis 95, querit quanti stabunt modii 45. Exprimat x hunc numerum ignotum aureum, eritque $15:95::45:x$. Unde $15x = 95 \times 45 = 4275$, & dividendo per 15, erit $x = 285$. Obtiuetur igitur quæsitus numerus, si tertius terminus in secun-

secundum ducatur, & factum dividatur ad primum.

Coroll. 2. Seu istud

Ex altera propositionis parte quilibet, quod quoties sit $a \cdot b :: c \cdot d$, erit quoque alternando, ut ajunt, $a \cdot c :: b \cdot d$, & invertendo $b \cdot a :: d \cdot c$, & componendo $a + b \cdot b :: c + d \cdot d$, & dividendo $a - b \cdot b :: c - d \cdot d$, nam semper productum extreñorum æquale invenitur produc̄to mediiorum. In primis enim duabus permutationibus habentur $a \cdot d$ & $b \cdot c$ æquales quantitates ex supposita proportione. In tercia habentur $a \cdot d - b \cdot d$, & $b \cdot c - b \cdot d$, in quarta $a \cdot d - b \cdot d$, & $b \cdot c - b \cdot d$, quæ item quantitates æquales utique inter se sunt, quandoquidem æqu alibus $a \cdot d$, & $b \cdot c$, in primo casu adjicitur, in secundo adimitur eadem quantitas $b \cdot d$. Quinimò regula quoque universalior ex eadem ratione deducitur. Nempe in terminis geometricè proportionalibus est, ut summa, sive differentia primi & secundi ad primum vel secundum, aut contra, uti primus vel secundus ad summam vel differentiam primi & secundi: ita summa, vel differentia tertii & quarti ad tertium vel quartum; sive tertius vel quartus ad summam vel differentiam tertii & quarti. Qui Canon mil fere differt ab àxiomate quarto. Porro omnes has permutationes quivis poterit in numeris experiri,

P R O P O S I T I O X I.

Rationem compositam explicare.

Difficilius intelligitur ratio ex pluribus rationibus composita, quam alii aliter definiunt. Nos illam dicemus rationem ex pluribus compositam rationibus, quæ intercedit inter productum ex omnibus illarum rationum antecedentibus, & productum ex omnibus eorumdem consequentibus. Sic ratio composita ex rationibus 2 ad 3, & 4 ad 5, est ratio 2 X 4 ad 3 X 5, sive 8 ad 15. Et in genere ratio composita ex rationibus a ad b, c add, & ad f est ratio ace ad bdf.

Coroll. 1.

Hinc ratio duplicata dicitur quæ intercedit inter quadrata, & triplicata quæ inter cubos, & sic deinceps. Cum enim quadratum sit quantitas quævis in se ipsam ducta; & cubus sit idem quadratum in eandem du&ctum quantitatem, manifestum est rationem compositam ex a ad b , iterumque ex a ad b esse rationem aa ad bb , hoc est unius quadrati ad aliud, & sic de reliquis;

Coroll. 2.

Sequitur etiam rationem a ad b componi ex rationibus ejusdem a ad quemlibet aliud terminum c , & hujus ipsius c ad ipsum b ; nam ratio ex his composita est ac ad cb , quæ non alia est quam ratio a ad b . Etenim si quantitas a est tripla, centupla &c. quantitatis b , erit eadem quantitas a in aliam quamlibet c ducta dupla pariter centupla &c. quantitatis ipsius b in eamdem c ductæ. Immò in genere ratio a ad b componitur ex rationibus a ad quamlibet c , & c ad quamlibet d , & d ad quamlibet e &c. & postremi termini ad b : etenim ratio ex his omnibus composita est ratio $acd e$ &c. ad cde &c. b , sive (ob cde &c. commune terminorum coefficientis) eadem ratio ipsius a ad b . Id vero probe tenendum est cum quantitatis incognitæ ratio ad notam quantitatem inquiritur, cuius ratio ad aliam pariter notam quantitatem habetur, & hujus ad aliam &c. & tandem postremi termini ad quantitatem quæsitam. Non ratio quantitatis datæ ad quæsitam erit factum ex omnium illarum rationum antecedentibus, ad factum ex omnibus consequentibus.

Coroll. 3.

Facile etiam deducitur fractiones esse inter se in ratione composita ex directa numerorum, & inversa denominatorum; ex. gr. ratio $\frac{a}{b}$ ad $\frac{c}{d}$ componitur ex ratione directa numeratoris a ad numeratorem c , & inversa denominatoris b ad denominatorem d ; sive (quod perinde est) ex ratione a ad b . Est eam $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} :: ad. bc$ quando-

quandoquidem factum sub extremis terminis invenitur
æquale facto sub mediis. Nam $\frac{c}{d} = \frac{a+b}{b}$ cum utrumque sit $c:d$. Item patet in numeris.

P R O P O S I T I O XII.

IN triangulis æquales habentibus angulos latera æqua-
libus angulis opposita sunt proportionalia.

Sint triangula ABC, FGH (Fig. 48. 49.) æquiangu-
la: dico latera FG, GH lateribus AB, BC æqualibus
angulis oppositis esse proportionalia.

Demonstr. Fiat BE \equiv FG, BD \equiv GH, & ducta ED
ob æquales angulos B, G erint æqualia (Prop. 2.) trian-
gula FGH, EBD, & trianguli ad basim E, D æquales an-
gulis F, H, hoc est (ex hypothesi) angulis A & C. Ergo
ED, AC parallelæ sunt (Coroll. 1. def. 17.), ac propte-
re ductis rectis AD, EC erunt triangula EDA, EDC
super eadem basi, & intra easdem parallelas æqualia.
(Coroll. 1. prop. 6.) Addito ergo communi triangulo EBD,
erunt tota triangula ABD, CBE æqualia. Sed triangula,
quæ eamdem haberit altitudinem, & æqualibus basibus
insistunt æqualia sunt (Coroll. 2. prop. 6.), ergo triangu-
lum CEB ita continetur triangulum DEB, quemadmo-
dum basis CB basim BD; pariterque triangulum ADB ita
continetur idem triangulum EDB, quemadmodum basis
AB continet basim EB. Jam vero idem triangulum EBD
æquè conunetur ab æqualibus triangulis CEB, ADB:
ergo etiam CB ita continet BD sive HG, quemadmo-
dum AB continet EB sive FG, eritque AB:BC:: FG:
GH, sive alternando AB:FG:: BC:GH: Q.E.D.

Coroll. 1.

Eadem methodo facile ostenditur ipsa triangula æ-
quiangula esse inter se in ratione duplicata laterum ho-
mologorum, hoc est, ut quadrata laterum quæ angulis
æqualibus opponuntur. Etenim triangulum DEB est ad
triangulum CEB, ut basis DB ad basim CB, & trian-
gulum CEB est ad triangulum CAB ut EB ad BA, si-

ve iterum ut BD ad BC , Ergo ratio trianguli DEB ad CAB (Coroll. 2. prop. 11.) componitur ex rationibus DB ad CB , atque iterum ejusdem DB ad eamdem CB erunt que triangula ut quadrata ipsarum DB , CB . Itaque si fuerit DB dimidia ipsius CB , adeoque etiam BE dimidia AB , erit triangulum DEB dimidium trianguli CEB , & CEB dimidium trianguli CAB , ac proinde triangulum DEB erit dimidium dimidii, sive quarta pars trianguli CAB .

Coroll. 2.

Si in triangulis FGH , ABC anguli B & G fuerint aequales, & latera FG , GH proportionalia lateribus AB , BC , erunt triangula aequiangula. Fiat enim $BE \asymp GF$, ducaturque ED parallela AC . Aequiangula erunt triangula BED , BAC (Coroll. 1. def. 17.) ac proinde $AB : B : C :: EB : BD$. Est autem ex hypothesi $AB : BC :: FG : GH$, ergo $EB : BD :: FG : GH$, & alternando $EB : FG :: BD : GH$. Cum sit igitur $EB \asymp FG$, erit etiam $BD \asymp GH$: & ob angulos B & G aequales erunt aequalia tota triangula EBD , FGH (Prop. 2.). Sunt vero EBD , ABC aequiangula, ergo etiam FGH & ABC aequiangula sunt.

Coroll. 3.

Quod si triangulorum FGH , ABC tria latera tribus sint lateribus proportionalia, etiam hæc eadem demonstratione erunt aequiangula. Sumpta enim $EB \asymp FG$, & ducta ED parallela AC , erit $EB : BD :: AB : BC :: FG : GH$; & alternando $EB : FG :: BD : GH$, hoc est in ratione aequalitatis. Eodem pacto ostendetur $FH \asymp ED$: quare triangula FGH , EBD habent tria latera aequalia singula singulis, adeoque aequalia sunt (Prop. 4.) Cumque EBD , ABC aequiangula sint, erunt etiam FGH , ABC .

Coroll. 4.

Cum sit, ex demonstratis in propositione, $AB : BE :: BC : BD$, erit dividendo (Coroll. 2. prop. 10.) $AE : BE :: DC : BD$, ex quo sequitur rectam BD , (Fig. 50.) quæ bifariam dividit angulum B in triangulo ABC basim dividere in ratione laterum. Et enim producta latere AB donec

G E O M E T R I A E.

37

donec fiat $BE \asymp BC$, ductaque EC , erunt æquales anguli ad basim in triangulo isosceli EBC (Coroll. 2. prop. 2.), quare angulus externus ABC duobus internis & oppositis æqualis (Prop. 1.) duplus erit angulo E , & ejus dimidium $ABD \asymp BEC$. Cum igitur in rectis BD , EC exterius angulus ABD sit interno opposito BEC æqualis, erunt ipsæ parallela inter se, ac proinde AD . $DC :: AB : BE$, sive BC ; quæ per constructionem ipsi BB æquatut.

Coroll. 5.

Páriter si duæ rectæ AB HR (Fig: § 1.) occurrant utcumque parallelis EC , FD ; GK , ab his secantur in partes proportionales, ut sit EF . $CD :: FG$. DK . Dúcta enim CLM ; quæ sit parallela ipsi AB , erunt CL , LM æquales ipsi EF ; FG (Coroll. 4. prop. 3.): sunt verò in triangulis MCK , LCD ; LG . $LM :: CD : DK$, ergo etiam $EF : FG :: CD : DK$.

Coroll. 6.

Si datis tribus rectis quæratur quarta proportionalis; fiat quilibet angulus CAB (Fig: § 0.), & in alterutro latere sumantur AE , AB duabus primis datis æquales, tertiae vero æquale fiat latus AC , & ducta EC dicatur ex punto B recta BD ipsi EC parallela; eritque AD quarta proportionalis quæsita: erit enim AE . $AB :: AC$. AD . Si verò rectam AC in data ratione dividere oporteat; sumantur AB , BE æquales terminis datae rationis, & eadem construētio dabit $AB : BE :: AD : DC$. Ex quo etiam divisibilitas in infinitum deducitur. Cum enim esse possit AE utcumque multiplex ipsius AB in infinitum, poterit etiam esse AD quantum libuerit submultiplex AC pariter in infinitum.

Scholion.

Figuræ similes dicuntur, quarum omnes anguli æquales sunt singuli singulis; & latera circa æquales angulos proportionalia: Hinc patet similia esse triangula æquiangula; quorum proprietates, quas exposuimus, incredibile dictu est quanti sint usus in Mathematicis. Eatrum ope facilissime solvantur problemata omnia, que

ad Trigonometriam, hoc est ad triangulorum dimensionem, pertinent. Hinc & altitudines, & distantias metimur, & alias hujusmodi quantitates per quadrantem in gradus divisum, & eam quam scalam vocant.

Quadrantis constructio non est admodum difficilis. Fiat in aliqua solidiori materia rectus angulus ABC (Fig. 58.) & centro facto in B mediocri intervallo BA describatur quadrans ADEC, ac duo alii interius paulo minori intervallo. Centris A & C intervallis AB, CB inveniantur puncta D, E, eritque tam AE, quam CD gradum 60. (Coroll. 4. prop. 2.): quare cum gradum 90 \circ sit totus quadrans, erit tam AD quam CE, & DE gradum 30. Si igitur in tres partes aequales secentur arcus AD, DE, EC (Schol. prop. 5.), dividetur quadrans in novem arcus aequales, quorum singuli de nos gradus contineant. Quod si hi rursus bifariam dividantur (Prop. 5.), quinos quoisque gradus obtinebis. Demum singuli gradus haberi poterunt, eorum mensuram per attentionem inquirendo, vel per Coroll. 6. hujus, cum arcus ejusmodi parum differant a rectis lineis. Hæc figura rectis lineis CB, BA, & arcu CA comprehensa quadrans dicitur.

Scala quoque facile costruitur hoc pacto. Sub angulo quocumque B (Fig. 59.) ducantur rectæ AB, BD, A puncto B ad E sumantur decem partes aequales, & fiat ED quintupla ipsius BE in decem partes aequales divisa, quarum prima sit a B ad 100, sumptisque a B ad A 20 partibus aequalibus, compleatur Parallelogrammum ABDC, & ab omnibus divisionum punctis rectæ AB, itemque rectæ BD (excepto primo quod jacet inter B & E) ducantur rectæ parallelæ lateribus parallelogrammi: tum divisa quoque AF in decem partes aequales, quarum prima sit AI, agantur oblique a singulis divisionum punctis BI, & reliquæ, quarum postrema definit in F, quæque parallelæ erunt inter se (Coroll. 1. pr. 2.) cum aequales, & parallelas lineas includant. Numeris, ut in figura factum est, distributis, manifestum est rectam BD quinquaginta particulas EO

con-

continere, quarum $\frac{1}{4}$ in EB continentur; partemque EO in viginti æquales partes gradatim divisam esse ob latus EF trianguli OFE in totidem æquales partes divisum. Harum particularum unam prima post verticem F parallela continet, duas secunda, tres tertia, & sic deinceps, inter rectas FO, FE interceptas. Itaque recta BD continebit ejusmodi particulæ $20 \times 50 = 1000$, ac proinde inveniri poterunt ipsius rectæ BD in eadem scala partes millesimæ quotcumque.

Metiri jam oporteat locorum A & B (F. 52. 53.) distantiam BA eorum accessu vel a flumine, vel ab alia quavis causa intercluso. Assumpto quolibet loco C, cuius distantiam a B metiri liceat, ope quadrantis & linearum visualium, AC, BC notentur anguli B & C. Tum in charta probe complanata assumatur ex scala $b:c$ totidem partium, quot pedes in intervallo BC continentur, sicutque anguli b , c ope quadrantis ejusdem æquales angulis B, C. Lateribus ba , ca in aliquo puncto a coeuntibus exploretur quotnam in scala particulæ contingat latus ba , totidemque pedes intervallum AB continebit. Nam cum in triangulis BAC, bac, anguli B, C æquentur angulis b , c per constructionem, ac propterea A quoque & a æquales sint (Coroll. prop. I.), erunt triangula similia, & latera proportionalia.

Si BAC campus sit, cuius mensura in quadratis pedibus inquiritur, demittatur in basim bc perpendicularum ad , & inveniantur particulæ, quæ ab illo in scala continentur. Tot enim pedes continebit perpendicularum AD ob similitudinem triangulorum ADB, adb , ejusque dimidium in basim ductum dabit arcam ABC in pedibus quadratis (Schol. prop. 6.)

Eadem ratione altitudinem Montis A (Fig. 54.) metiri licebit, si in subjecta planicie duæ dentur stationes B, C, quarum distantiam metiri possumus.

Et ita quidem inveniuntur latera, & area in triangulo, cuius unum detur latus cum duobus angulis. Si vero tria dentur latera, & querantur anguli, sumptis ex scala tribus rectis bm , bc , en (Fig. 52. 53.) toti-

tem partium, quot in datis lateribus pedes continetur, centris b , c , intervallis bm , cn describantur arcus circulorum se mutuo intersecantium in as , & ductis ab , ac , erit triangulum bac dato triangulo æquiangulum (Coroll. 3. hujus) ob latera proportionalia, unde & altitudine, & area innotescet. Sed de his planius in Trigonometria constabit.

PROPOSITIO XIII.

Si duæ chordæ sive intra circulum, sive extra circulum se mutuo intersecant, factum sub unius segmentis erit æquale facto sub segmentis alterius.

Secent se mutuo chordæ AC , DE (Fig. 55. 56.) sive intra, sive extra circulum; dico esse $AB \times CB \asymp DB \times BE$.

Dem. Ductis AD , CE , erit in primo casu in duobus triangulis ADB , BCE angulus ABD equalis angulo EBC ad verticem (Coroll. 4. def. 10.), ac præterea æquantur anguli ADB , ECB , ut qui eidem insistunt arcui AE (Coroll. 1. prop. 9.); ergo æquiangula sunt triangula & similia; ac proinde (Prop. 12.) $BA \cdot BD :: BE \cdot BC$.

In secundo autem casu quadrilinei circulo inscripti anguli oppositi ACE , ADE æquantur duobus rectis (Coroll. 3. prop. 9.), & duobus item rectis æquantur ACE \perp BCE (Coroll. 2. defin. 10.), quare ADE æquatur ipsi BCE ; & cum angulus B sit utriusque communis, æquiangula & similia erunt triangula BAD , BEC . Ergo in utroque casu erit $BA \cdot BD :: BE \cdot EC$, ac proinde $BAXCB \asymp BDXBE$ (Prop. 10.): Q.E.D.

Coroll. 1.

Si fuerit AC (Fig. 57.) circuli diameter, & chorda DE ad illam perpendicularis, ac propterea bifariam divisa in B (Coroll. 4. pr. 5.); erit $AB \times BC$ æqualis DB^2 , nam in hoc casu $EB \times BD \asymp BD^2$. Est igitur $AB \cdot DB :: DB \cdot BC$ (Prop. 10.). Quare si inter AB & BC quadratur media proportionalis, bifariam divisa AC in F ,

ac descripto semicirculo erigatur in B perpendicularum BD donec circulo occurrat; eritque BD media proportionalis quæsita.

Coroll. 2.

Ducto radio FD erit, ob angulum rectum B; $FB^2 \perp BD^2 \perp FD^2 \perp FC^2$ (Prop. 7.) Quare cum sit $DB^2 \perp AB \times BC$, erit $AB \times BC \perp FB^2 \perp FC^2$: Hoc est, si recta AC secta fuerit bifariam in F, & non bifariam in B, erit quadratum dimidiæ æquale rectangulo sub inæqualibus segmentis una cum quadrato intermedii.

Coroll. 3.

Si ducantur præterea AD, DC, etit angulus ADC in semicirculo rectus (Coroll. i. prop. 9.), quare $AC^2 \perp AD^2 \perp DC^2$: sed ob angulos rectos in B, $AD^2 \perp AB^2 \perp BD^2 \perp AB^2 \perp AB \times BC$, & $DC^2 \perp BD^2 \perp BC^2 \perp BC^2 \perp AB \times BC$: ergo $AC^2 \perp AB^2 \perp BC^2 \perp AB \times BC$: Hoc est, utcumque secetur recta AC in B, quadratum totius AC æquatur quadratis segmentorum AB, BC una cum rectangulo bis comprehenso sub ipsis segmentis:

Coroll. 4.

Cum sit autem $AD^2 \perp AB^2 \perp AB \times BC$, erit (Prop. 10.) $AB : AD :: AD : AB \times BC$: hoc est, chorda est media proportionalis inter segmentum AB, & totamque diaethetrum AC, & illius quadratum æquatur rectangulo $AB \times AC$.

Coroll. 5.

Si figura 56 mutetur in 60, ita ut BD transeat per centrum F, & BCA accedat ad circumferentiam, donec evanescente AC evadat BC tangens, erit $BC^2 \perp BE \times BD$, & ducta FC, quæ tangenti occurret ad angulos rectos (Coroll. 5. prop. 8.) erit in triangulo rectangulo FCB, $FB^2 \perp FC^2 \perp CB^2 \perp FE^2 \perp EB \times BD$. Hoc est, si recta DE bifariam dividatur, eique in directum adjiciatur recta quævis EB, erit quadratum compositæ ex dimidia & adjæcta æquale quadrato dimidiæ una cum rectangulo ex tota & adjæcta simul sumptis in adjecitam.

Ex hoc postremo corollario definiri potest quam longè pateat prospectus in maris superficiem ex data altitudine: sed telluris diametrum prius definire oportet ex ipsius circumferentia, quam in annotationibus ad primam propositionem invenimus. Id autem fiet si proxima ratio circumferentia ad diametrum inveniatur, in quo etiam circuli quadratura veræ proxima sita est, qua contenti esse possumus cum exactam habere non liceat. Archimedes ad rem conficiendam polygonis usus est inscriptis & circumscriptis.

Concipiatur radius AC (Fig. 61.) in partes 1000000 aut plures etiam, ut libuerit, divisus & tangentē AD occurrat in D recta CD angulum rectum ECA, & quadrantem AE bifariam dividens. Erit ob angulum ACD semirectum, & angulum CAD rectum (Coroll. 3. prop. 8.) angulus quoque ADC semirectus, & triangulum isoscele (Coroll. 3. prop. 3.) Quare $DA \asymp CA \asymp 1000000$, & $DC^2 \asymp DA^2 - AC^2 \asymp 2000000000000$ cujus radix DC major est quam 1414212, & minor quam 1414213. Bifariam diviso angulo DCA recta CH, quæ occurrat tangentē in H, erit DC. CA; DH. HA (Coroll. 4. prop. 12.), & componendo $DC - CA$ ($241421 \frac{2}{3}$). CA (1000000) :: DA (1000000). HA.

Unde invenitur HA major quam 1414213, minor quam 1414214. Hinc eruitur HC, & secto iterum bifariam angulo HCA invenietur nova portio tangentis AD, atque aliae deinceps, ut libuerit. Quod si chorda IL parallela fuerit tangentē HAM, ac proinde radio CA perpendicularis, & bifariam secta in K (Coroll. 4. prop. 5.), erit CH. HA :: CI. IK (Prop. 12.). Cumque tres priores quantitates note sint, quarta quoque IK innotescet & major & minor vera, ac propterea etiam ipsius dupla IL, & ducta CLM, que tangentē occurrat in M, erit tota HM dupla ipsius AH.

Sit jam circulus APT (Fig. 62.) primo in quatuor partes eæquales divisus, deinde in 8, in 16, in 32, in 64,

G E O M E T R I A.

43

64, in 128. &c. prout cuique libuerit, & concipiamus per ea divisionum puncta tangentes, & chordas alternatim ductas, habebuntur, ut patet, duo polygoni, quorum alter inscriptus circulo est, alter circumscriptus; ambo autem triangulis constant equalibus triangulis HCM, ICL; cumque haberi possint HM & IL quantumlibet veris proxime, & numerus laterum habeatur, oram quoque summa innoteſcat, hoc est, perimeter inscripti proxime minor vera, & perimeter circumscripti proxime major vera, ita ut hic defectus vel excessus quantum cuique libuerit tenuis sit, cum radius in quemlibet partium numerum dividi possit. Jam vero manifestum est perimetrum polygoni circumscripti circuli peripherię majorem esse, perimetrum vero inscripti minorem, ac propterea intra hos limites ipsam peripheriam contineri. Iſti limites quantum quisque velit contrahentur aucto laterum numero. Etenim ob triangulorum HCA, ICK similitudinem cum sit CA. CK :: AH, KI, erit quoque dividendo AC. AK::AH. AH-KI, & in eadem ratione erit tota perimeter polygoni circumscripti ad ejus differentiam ab inscripto (Axiom. 4.) Quod si laterum numerus augeatur minuitur quantumlibet IK, & multo magis AK, adeoque minuitur quantumlibet polygonorum differentia, & contrahuntur limites, intra quos situs est valor peripherię circuli.

Hinc quoque accuratius demonstratur aream circuli factum esse ex radio in dimidiam peripheriam. Nam triangulum HCM est factum ex radio AC in dimidiam basim HM (Schol. prop. 6.), ac proinde totum Polygonum habetur ducendo radium AC in dimidiam perimetrum. Est autem area polygoni circumscripti major quam area circuli, ita tamen ut ejus excessus supra aream circuli minor sit quam excessus supra polygonum inscriptum. Verum ita potest laterum numerus in infinitum augeri, ut differentia perimetri polygoni circumscripti a circuli peripheria, & illius area ab area polygoni inscripti minor sit data qualibet quantitate. Quamobrem factum quoque ex radio in dimidiam peripheriam

Nam ab area circuli differet differentia que minor sit data qualibet quantitate, ac proinde nulla.

Hac methodo Archimedes invenit diametrum ad peripheriam esse in ratione 7 ad 22, ita ut tenuissimus sit excessus peripherie sic inventa supra veram.

Hec eadem ratio subtilius ab aliis quæsita est, in quibus Ludolphi Coloniensis eminet industria, qui eam ad cifras usque 60 promovit. Ex Leibnitio in Actis Lipsiensibus tom. I: habetur ratio diametri ad quartam peripherie partem, ut 1 ad $\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9}$ &c. producendo hanc seriem quoisque libuerit per signa contraria, & numeros impares; eamdemque rationem habet quadratum circulo circumscriptum ad aream circuli. Sed omnium est elegantissima ratio diametri ad peripheriam, quam exprimunt tria paria trium primorum numerorum imparium, videlicet 113 ad 355.

In re nostra contenti esse possumus Archimedis ratione, cumque peripheria maximi telluris circuli (Schol. prop. I:) passus Parisinos contineat 24649920; fiat ut 113 ad 7 ita predictus ille passuum numerus ad telluris diametrum, que obveniet passuum 7843156, ac proinde millaria continebit 7843, ac passus 156.

Sit jam HI montis altitudo ad mille passuum assurgens, & queratur intervallo HA quoque patet in maris superficiem oculi prospectus; erit HS passuum 7844156, ergo AH \simeq IH X HS \simeq 1000 X 7844156 \simeq 7844156000, cuius radix 88567 millaria dabit 88, ac passus præterea 567, intra quod spatium continentur objecta ex hoc monte conspicua, cum cetera omnia ob ipsam telluris rotunditatem ex oculis sese subducant. Refractio tamen, vi cuius radius AH inflectitur, nonnulla adhuc objecta detegit, que aliquanto longius distent. At si HI sit unius passus, quantum ferè e solo assurgit hominis oculus stantis in littore, erit HS passuum 7844157, & IH X HS erit pariter 7844157, cuius radix passus dabit 2800 7. Quare si duo homines sex passuum millibus distent in eodem mari littore

ob telluris rotunditatem se invicem videre non poterunt.

P R O P O S I T I O X I V.

OMNES figuræ similes rectilineæ in eundem similiūm triangulorum numerum partiri licet.

Sint duæ figuræ similes rectilineæ ABCDE, abcde (Fig. 63. 64.), & ductis BE, CE; *be*, *ce*, dico similia esse triangula ABE, *abe*; BEC, *bce* &c. : nam in triangulis EAB, *eab* anguli A & *a* æquales sunt, ut ipsa notio figuratum similitudinis indicat, eruntque latera proportionalia; hoc est AE. *ae*:: AB. *ab*. Ergo (Coroll. 2. prop. 12.) similia erunt triangula ABE, *abe*, ac proinde (Prop. 12.) anguli ABE, *abe* æquales sunt; cumque essent æquales anguli ABC, *abc*, erunt etiam æquales EBC, *ebc*. Erant autem latera circa æquales angulos ABE, *abe* proportionalia, hoc est BE. *be*:: AB. *ab*:: BC. *bc* (ob figurarum similitudinem) ergo iterum in triangulis BCE, *bce* latera circa æquales angulos EBC, *ebc* proportionalia sunt, ac propterea ipsa triangula similia. Eadem methodo si progrediatis, reliqua quoque triangula similia esse comperies, easque figuræ in eundem similiūm triangulorum numerum divisas esse; Q. E. D.

Coroll. 1.

Eodem pacto ostenditur similes esse figuræ illas rectilineas, quas similia triangula eodem numero, eodemque ordine partiuntur.

Coroll. 2.

Cum duo quælibet similia triangula sint inter se ut quadrata laterum homologorum (Coroll. 1. prop. 12.), latera autem sint in eadem ratione constanti, erunt (Ax. 4.) perimetri similiūm figurarum ut duo quælibet ipsarum latera homologa; & areæ totæ erunt ut quadrata eorumdem laterum. Id etiam circulis convenit, ut patet ex his quæ adnotavimus ad Prop. 13.: quare si unius circuli radius alterius radio duplus sit, ilius

Ius quoque peripheria dupla erit, alia vero quadriplana.

Scholion:

Possunt etiam alia quadam ratione similia triangula in similibus figuris considerari: Nempe si fuerint similes figure ABCDE, abcde (Fig. 65: 66.) dicanturque ex duobus angulis aequalibus A & a , B & b , ad reliquos angulos rectæ lineæ AD, BD, AC, &c. ad, bd, ac &c. simili methodo demonstrabitur similia esse triangula AEB, aeb, ADB, adb &c. id quod in agrimensura maximum habet usum. Etenim si alicujus fundi aut agri ichnographiam describere oporteat, ac dimensiones accipere ex duobus locis A, B: metire prius locorum distantiam AB, & oculorum aciem in objecta conspicua dirigens, quibus ager terminatur in E, D, C, probè observare angulos BAE, BAD, BAC, itemque ABC, ABD, ABE: num in charta aut tabula duc rectam ab tot particulis e scala desumptis constantem, quot inventi sunt pedes in intervallo AB, & ope quadranti fiant in a & b anguli aequales inventis in A & B. Lineatum ita ductarum concursus in e, d, c determinabunt perimetrum figuræ $aedcbe$, quæ similis est agro describendo ut ex demonstratis constat. Itaque quot fuerint particularum inventæ rectæ lineæ $a\acute{e}$, $a\acute{d}$, $d\acute{e}$, $b\acute{e}$ & totidem pedibus constant intervalla AE, ED, DC, CB &c. area vero invenietur ex dictis ad propos. i3. & 6.

Eadem ratione, ut patet, distantiam DC utrinque inaccessam metiri licet. Etenim sumptis duabus stationibus A & B, quarum intervallum metiri liceat, & angulis in A & B triangulorum ADB, ACB, fiat ut antea simile quadrilineum dab \acute{e} , & quot particulas in scala continebit recta $d\acute{e}$, totidem pedes, vel decempandas continebit distantia quæsita DC.

Scholion.

Cum Euclidis Elementa passim ab auctotibus citentur, non erit inutile indein subjicere, unde constare possit ubinam in his nostris elementis corum demonstratio.

G E O M E T R I A E.

47

Itatio quærenda sit, quæ Euclides in sex prioribus libris complexus est, quibus planam geometriam absolvit. Usu autem constabit nullam fere ejus propositionem paulò frequentius adhiberi in geometricis quæ non fuerit a nobis demonstrata, aut non facile ex his demonstretur. Cæterum libri 5 & 6 propositiones præcipuas complectitur Scholion ad prop. 9, & propositiones 10, 11, 12 cum suis Corollariis; quod cum semel notasse fatis fuerit, supervacancum duximus has cum nostris comparare. Sed & rationum theoriam uberiorēm dabimus in Arithmetica.

Euclidis		Euclidis	
Lib. I.	Nobis est	Lib. I.	Nobis est
Pr. 1	Cor. 4. pr. 2.	Pt. 26	Pr. 3. & Cor. 1. eiusd.
4	Pr. 2.	27)	Scol. def. 17., & Coroll. 1. eiusd.
5	Cor. 2. pr. 2.	28)	dem.
6	Cor. 2. pr. 6.	29)	Cor. 2. eiusd.
7	Coincidit cum pro- pos. 4.	30	Cor. 3. eiusd.
8	Pr. 4.	31	Pr. 1.
9	Pr. 5.	32	Cor. 1. pr. 2.
10	Cor. 1. pr. 5.	33	Cor. 4. pr. 3.
11	Cor. 3. pr. 5.	35	Pr. 6.
12	Cor. 2. pr. 5.	36	Cor. 2. pr. 6.
13	Cor. 2. def. 10.	37	Cor. 2. eiusd.
15	Cor. 4. eiusd.	38	Ibidem.
18	Pt. 8.	39)	Ex iisd. facillimè dém.
19	Cor. 1. pr. 8.	40)	Cor. 3. pr. 6.
22	In sch. pr. 12.	41	Pr. 7.
23	Cor. def. 7.	47	Cor. eiusd.
24	Cor. 2. pr. 8.	48	
25	Cor. 3. eiusd.		

Eucli-

Euclidis Lib. II.		Euclidis Lib. III. Nobis est	
Pr. 4	Cor. 3. pr. 13.	Pr. 17	Cor. 2. pr. 9.
5	Cor. 2. pr. 13.	20	Pr. 9.
6	Cor. 5. ejusd.	21	Pater ex ead.
Lib. III.		22	Cor. 3. ejusd.
Pr. 3	Cor. 4. pr. 5.	31	Cor. 1. ejusd.
10	Cor. pr. 4.	32	Cor. 6. ejusd.
13	Cor. 7. pr. 8.	34	Pr. 13.
16	Cor. 5. 6. 7. ejusd.	35	Cor. 5. ejusd,



E L E M E N T A A R I T H M E T I C Æ.

C A P U T P R I M U M.

De fundamentalibus Arithmeticæ operationibus:

1. **E**Æ sunt notatio, additio, subtractio, multiplicatio, divisio, & extractio radicum, quas omnes hoc capite breviter expediemus.

§. I.

Notatio.

2. **N**umeros omnes in vulgari arithmeticæ decem notis designamus, quarum Arabes feruntur autores; sunt autem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harum notarum varia est significatio non solum ex diversa ipsarum forma, sed etiam ex diverso loco, quem occupant. Nam quæ ante punctum postremæ legenti occurruunt unitates designant; quæ proxime præcedunt unitatum decades; exinde centenarii sequuntur, millennarii, & sic deinceps in déclupa proportione. Atque huic potissimum usui cyphra, seu 0 destinatur, cum enim ipsa nullum designet numerum, auger tamen reliquum notarum significationem longius illas a punto removens; sic unitatis nota, quæ punctum proxime præcedens unicam designaret unitatem, beneficio unius vel duplicis cyphræ in secundum aut tertium locum rejecta denas unitates, ant centenas designabit.

3. Breviores numeri facile leguntur, nemo enim non videt numerum A (Tab. I.) ducentas quadraginta septem unitates exprimere; at in numeris longioribus aliquo opus est artificio. Numerum B, quem legere oporteat,

D.

teat,

teat, ita divides a postremis notis exorsus, ut ternos singulis partibus numeros attribuas. Tres postremos a praeuntibus divides puncto superius apposito: tribus sequentibus appones 1; & sic deinceps reliquis ternariis punctum alternatiū appones, vel numerum, ita tamen ut numeri unitate semper augeantur, quemadmodum in apposito schemate factum vides. His peractis quamlibet notarum classem perinde leges, ut si sola esset, & ubi punctum invenies dic mille, ubi 1 dic decies centena millia, seu, ut vulgo loquimur, millionem; ubi 2, dic milliones millionum, sive Billiones; ubi 3, dic Trilliones, & sic deinceps. Sic itaque numerus B legendus erit. Ter mille ac ducenti quadragintaduo Trilliones, quingenta septuaginta octo millia ac quingenti sexaginta duo Billiones, nongenta quatuordecim millia, ac viginti Millions, quadrinventa sexaginta septem millia, bis centum, ac duodecim.

4. Quod si notæ eadem punctum subsequantur, fractos exprimunt decimales; ita quidem, ut quæ primum occurrit decimas unitatis partes designet, secunda centesimas, tertia millesimas, & sic deinceps. Has autem notas vel singulas seorsim efferre licet, vel omnes simul denominatio a postrema desumpta, quæ denominatio ex numero desumitur, quem exprimit unitas tot cyphris aucta quot sunt post punctum notæ. Sic numerus C designat viginti tres unitates, & duas decimas partes unitatis, quatuor centesimas, nullam millesimam, sex denas millesimas, vel bis mille quadrigentas sex denas millesimas. Numerus D denotat ducentas triginta duas unitates, nullam decimam, duas centesimas, tres millesimas, seu 23 millesimas partes unitatis. Demum numerus E nullam exhibit unitatem, nullam decimam, nullam centesimam, sed tantum duas millesimas, & sex denas millesimas, sive 26 denas millesimas partes unitatis.

5. Fractiones alię duobus numeris exprimuntur, quos lineola interjecta dirimit, ita ut alter supra lineam scribatur, alter infra lineam. Qui inferior est denominator

tor dicitur, qui superior est numerator. Ille denotat in quot partes unitas divisa sit, hic autem ejusmodi partium numerum designat. Sic numerus F duas tertias unitatis partes exprimit, numerus C quinque octavas, numerus H septem duodecimas. Fractiones quoque sunt particule, quibus horas, & gradus circuli partiri consuevimus; nam & horas & gradus singulos in 60 minuta prima dividimus, singula minuta prima in 60 secunda, singula secunda in 60 tertia, & sic deinceps. Has autem fractiones peculiaribus quibusdam notis designamus, nam horas integras exprimit numerus cui apponitur littera h, gradus integros numerus cui superius apponitur o: & in utroque casu unica lineola numeris superimposita minuta prima designat, due lineolæ minuta secunda, tres tertia, & sic deinceps: unde numerum I sic leges: 23 horas, 46 minuta prima, 52 secunda, 37 tertia. 41 quarta.

§. II.

Additio in numeris integris.

6. **N**umeri his notis expressi, si integri sunt, in unam summam facile colliguntur. In exemplo primo, quatuor numeros, quos addere oportet, ita alios aliis adscribe serie descendente, ut unitates unitatibus subjiciantur, decades decadibus, & sic de reliquis; tum infra omnes numeros ducta linea, & a postrema columna exorsus dic: 1 & 8 efficiunt 9, 9 & 2 efficiunt 11, 11 & 1 efficiunt 12. Colligis ergo ex hac columna unam decadem unitatum, ac præterea duas unitates: quare scribe 2 in loco unitatum, & decadem illam rejice in sequentem decadum summam dicens: 2 & 1 efficiunt 3, 3 & 6 efficiunt 9, 9 & 9 efficiunt 18, 18 & 6 efficiunt 24, hoc est duas decades decadum, sive duo centenaria, & 4 decades: scribe ergo 4 in loco decadum, & duo centenaria in sequentem columnam rejice, eodemque pacto in hac & reliquis ope

D 2 rare,

rate, & tandem invenies numerum K, qui quatuor numerorum erit quæsita summa. Eodem pacto, in Ex. 2, trium numerorum summa colligitur numerus L, qui una nota supra numeros datos est auctus, quod in prima columnâ quæ postrema est operanti, 12 colliguntur, & unitas illa in sequentem locum rejicienda fuit.

7. Notandum est autem quod uniuscujusque columnæ numeri ita colliguntur tamquam si essent unitates, ex eaque summa tot unitates in proximè sequentem rejiciuntur, quorū in præcedente decades supra unitates collectæ sunt.

8. Totius autem operationis ratio constat, quia dum progredimur ab unitatum columnâ ad reliquas, nota quælibet in ordine subsecuente decuplo majorem habet valorem quam in proxime præcedente.

§. III.

Subtractio in numeris integris.

9. Ut numerum datum a dato numero subducas, subducendum numerum illi subjicies, a quo subtrahi debet, ita ut unitates unitatibus respondeant, decades decadibus, & sic de reliquis. Tum ab unitatibus exorsus quamlibet inferiorem notam a superiori subtrahē, & residuum scribe infra lineam & habebis numerum qui sit datarum quantitatū differentia. Quod si alicubi occurrat inferiorem notam superiori majorem esse, hanc augere oportebit decem unitatibus, easque mutuas accipies a proxime sequenti nota, quam propterea deinceps habebis tamquam unitate multatam.

10. In Ex. 3. numerus M est inter datos numeros differentia quæsita, quia auferendo 5 ex 7 relinquitur 2, auferendo 4 ex 9 relinquitur 5 &c. At in Ex. 4. cum numerus 8 ex 7 subduci nequeat, adjice hunc denas unitates, & auferendo 8 ex 17 residuum habebis 9; tum vero notam superiorē proximè sequentem unitate multabis, hanc enim ab ea mutuam accepisti, ut dēnis

dehis uitatibus præcedentem augeres. Aufer ergo 4 ex 5 & habebis residuum 1. Eodem pacto in reliquis duabus notis operare, & habebis numerum N differentiam quæsitam. Haud absimili ratione invenitur differentia O in Ex. 5°, ubi cum ex o nequeat auferri 6, auferetur ex 10, & residuum 4 infra lineam ponitur: tum quia iterum sequitur o ex quo nequit auferri 4, auferetur non quidem ex 10 sed ex 9, quandoquidem denarius numerus, qui eo loco substituitur ex proxime sequenti 9, jam in antecessum unitate multatus est; atque ita fieret si plures essent o, cum tamen numerus qui primo occurrit unica tantum unitate minor fiat.

11. Si nota inferiori ex superiori sublata nihil reliqui sit, eo loci notari debet o, quod tamen non sit, si nullus præterea sequatur numerus, qui in differentia quæsita ante cyphram sit adscribendus, ut factum vides in Ex. 6°, in quo præter duas postremas notas reliquæ omnes se mutuo elidunt.

12. Operationis ratio satis per se constat, cum unitates ab unitatibus auferantur, denarii a denariis &c. Nam quod in Ex. 4: numerus 7 deceim augeatur unitatibus, & numerus insequens 6 una multetur, ratio in promptu est. Hæc nempe unitas in numero 6 deceim valet earum quibus constat numerus 7, eique respondens 8, quare etsi unam ille amittat huic tamen deceim acquiruntur. Similiter in Ex. 5°, unitas e 9 sublata deceim valet unitates si in locum rejiciatur, cui subest auferendus numerus 4, & rursus una ex his deceim unitatibus in locum translata cui subest numerus 6, deceim valet unitates ejusmodi, quibus nota auferenda constat. Quare his sublatis ex 10, relinquitur numerus 9, ex quo auferas 4, & deinceps 8, ex quo 2 auferre oportebit.

13. Si explorare velis utrum subductio ritè peracta sit, differentiam inventam adde numero sublato, & quantitas redibit, ex qua subductio facta est.

14. Si tota quantitas auferenda illam excedat, ex qua debet auferri, adhuc minor numerus è majori sub-

ducitur; sed differentia quæsita erit quantitas negativa, & minor nihilo. Sic si quis expensas faceret, quæ suas opes excederent, has subduceret ab expensis, & differentia ostenderet quanto deterioris conditionis sit factus, quam si nihil haberet, vel quid sibi desit, ut ære alieno expeditus nihil habere incipiat. Unde vides æ alienum congrue dici quantitatem negativam & nihilo minorem. Innumera sunt ejusmodi, ex quibus Tyrone s oportet negativæ quantitatis notionem probè concipere.

§. IV.

Multiplicatio in numeris integris.

15. **Q**uantitas data per numerum integrum multiplicatur cum toties sumitur, quoties unitas in numero continetur, per quem debet multiplicari. Tum verò per numerum fractum multiplicari dicitur, cùm tot illius partes sumuntur, quot fractio indicat, in quam ducitur. Augetur itaque numerus cum in integrum ducitur: minuitur si in fractum ducatur.

16. Singulæ notæ in singulas facile ducuntur, si numeri breviores sint. Sic nemo non videt 3 in 4, sive 4 tèr sumptum 12 efficere. Si numerorum alter denarius sit, factum ex multiplicatione emergens tot erunt decades, quot alter numerus habet unitates; at si quinarius fuerit, tot erunt decades sumendæ, quot in alterius dimidio sunt unitates: demum si uterque numerus quinario major sit, in altera manu, reliquis compressis, tot digiti erigantur, quot alter numerus habet unitates supra quinarium, itemque in altera manu tot erigantur, quot unitatibus alter numerus quinarium excedit. Tùm verò tot decades sumantur quot sunt erecti digiti, iisque adjiciatur quod prodit invicem ducendo digitos in utraque manu compressos, atque ita habebis factum ex utriusque dati numeri multiplicatione. Sic si ducere oporteat 7 in 9, erunt erecti digiti in altera quidem manu 2, in altera 4, unde sex decades sumen-

dæ sunt; compressi verò erunt in illa 3, in ista 1, ex quorum multiplicatione emergunt tres unitates; factum ergo ex 7 in 9 sunt 6 decades, & 3 unitates, sive 63.

17. Idem facile absolvitur per tabulam, ut vocant, Pythagoricam. Rectanguli ACDB latus AC in novem partes æquales dividè, latus verò CD in decem. Per utrisque divisionis puncta duc rectas lineas his lateribus parallelas, ac divisum erit rectangulum in decem columnas, quarum singulæ novem continent rectangula. Scribe in prima column a novem primos numeros, in secunda eorum duplos, in tertia triplos, & sic deinceps. In decima vero column a nonnisi cyphras conscribes ad usus postea indicandos. Interim habebis, ut vides, productum cuiuslibet numeri in alium quemlibet ab 1 ad 9, quod facile invenies si alterum numerum in prima column a inquiras, alterum in primo ordine rectangulorum; nam si ab hoc descendas ad ordinem usque, in quo primus inventur, ibi erit productum quæsumum. Sic si factum quaeratur ex 9 in 6, sume in prima column a 6, in primo autem ordine sume 9, & descende usque ad ordinem sextum, in quo 6 invenitur, & numerus 54 erit factum ex 6 in 9.

18. Idem productum invenitur si in prima column a assumas 9, & in primo ordine 6: ex quo patet nihil omnino interesse sive primum numerum per secundum multiplices, sive secundum per primum. Id ipsum in genere de numeris omnibus ostenditur, unde si tres aut mille numeri invicem debeant multiplicari, undecumque incipias, aut quocumque ordine progrederaris unum dicens in alterum, & factum ex his duobus in tertium, & sic deinceps, semper idem postremo loco factum emerget.

19. Si numeros pluribus notis constantes multiplicare oporteat, horum alterutrum infra alterum scribe ita, ut unitates unitatibus subjiciantur; deinde notas omnes superioris numeri per singulas inferioris multiplica initio utrobique a postremis facto. Decades quæ inter multi-

plicandum colliguntur sepone adjiciendas facto ex ea-
dem numeri inferioris nota in proxime sequentem su-
perioris, si qua supersit. Facta quæ emergunt ex singu-
lis notis inferioris in omnes superioris infra lineam seori-
sim notentur, ita ut uniuscujusque unitate subjiciantur
numero per quem multiplicatio peragitur. Quod si ho-
rum omnium summa colligatur, ea erit productum que-
sumum.

20. In Ex. 7º quæritur factum ex 235 in 43. Scribe
43 sub 235, uti dictum est, tum ducta linea dic: 3 in
5 efficiunt 15. Scribe quinque sub numero multiplicante
3, & unam decadem sepone adjiciendam facto sequenti
ex 3 in 3, quod est 9, cui si 1 addas, habebis unam
decadem, & nullas præterea unitates: scribe igitur 0,
& facto ex 3 in 2 adjiciens 1 scribe 7. Rursus dic: 4
in 5 efficiunt 20; scribe 0 ita ut multiplicatori 4 subja-
ceat, & facto sequenti 4 in 3, quod est 12, adjiciens
2 habebis 14: scribe igitur 4, & 1 servans dic: 2 in 4
efficiunt 8, & adjecto 1, scribe 9. Denum ducta linea
collige in unam summam hos numeros ita dispositos,
eritque numerus Q factum ex datis numeris.

21. Demonstratio facile eruitur ex ipsa numeralium
notarum natura, quæ in anterioribus locis decuplo plus
valent, quam in posterioribus, & ex eo principio quod
partes simul sumptæ totum adæquant.

22. Ipse verò usus docebit, quod si vel alteruter vel
uterque numerus in cyphras desinit, poterunt hæ in
multiplicatione omnino neglegi, dummodo producto tot
in fine cyphræ apponantur, quot erant in coefficienti-
bus. Sic in Ex. 8º idem prodit numerus R ex 52300
in 8420. Sive per ipsas cyphras multiplicationem insti-
tuas, sive his neglectis ducas 523 in 842, & producto
tres cyphras apponas. Similiter si intra notas ipsas mul-
tiplicatoris aliqua cyphra occurrit, poterit ea neglegi,
dummodo factum ex numero subsequenti sub ipso mul-
tiplicante numero notari incipiat, ut in Ex. 9º.

23. Si explorare velis utrum multiplicatio rite peracta
sit, jubent eosdem numeros iterum multiplicare, sed ordine
inver-

inverso; ita hampé ut qui prius multiplicator fuerat, fiat multiplicandus, & contra. Sed hoc valde molestum accidit ubi numeri longiores sunt. In his casibus ad calculi molestiam levandam, & ad erroris periculum longius amovendum satius erit artificium adhibere, quod Neperus excogitavit. Tabulam Pythagoricam ita scribe ut numeri, qui duabus notis constant transversa linea dirimantur, ut factum est in rectangulo ACDB, deinde tabulæ columnas divide ut ordine quolibet disponi possint, ac plures ejusdem numeri tabellas coipiara, ut tot præsto esse possint, quot ejusdem numeri notas in numero multiplicando esse contingat. Quin etiam cum fieri possit ut inter numeri multiplicandi notas cyphræ occurant, lamellas quoque habere necesse est in quibus solæ cyphræ notentur. His positis si detut in Ex. 10º numerus T, quem per V multiplicare oporteat tabellas felige, quarum singulæ singulas notas numeri T habeant in fronte, easque eodem ordine dispone, quo in dato numero disponuntur. Quoniam T per 8 multiplicare oportet, numeros omnes in ordine octavo occurrentes initio a postremis factō scribe infra lineam ita ut postremus jaceat sub numero 8, hoc tamen animadverte quod qui in eodem rhombo includuntur colligi debent in unam summam, & decades, si quæ occurunt, proxime subsequenti adjiciendæ. Habebis ea ratione factum ex numero T in 8. Rursus nota eodem pacto sub numero 9 numeros, quos lamellæ exhibent in ordine nono, & habebis factum ex T. in 9. Idem in reliquis præsta, & omnium summa dabit numerum X, quod est productum ex numero T in V. Totius operationis ratio facile intelligitur ex dictis.

§. V.

Divisio in numeris integris:

24. CUM quantitas data per aliam dataam quantitatem dividenda proponitur, eo deinceps quæstio reducitur ut inveniatur quoties in dividenda quantitate dividens quantitas contineatur; unde numerus ex divisione resultans, per quem scilicet huic quæstioni satis fit, quotus dicitur.

25. In Ex. 11° proponatur numerus 10105 per 43 dividendus. Dividendo numero divisorem præfige lineola interjecta: tum operationem instituens in notis initialibus dividendi, quæ quantitatem exhibeant divisori æqualem, vel proxime maiorem, dic: quoties 43 continentur in 101? Resp. 2. Scribe ergo 2 ex altera parte dividendi, lineola pariter interjecta, & factum ex 2 in 43, sive 86, aufer ex 101, & residuo 15 notam apponē, quæ in dividendo proximè sequitur quantitatem jam divisam 101. Dic iterum: quoties 43 continentur in 150? Resp. 3. Scribe 3 in quoto & factum ex 3 in 43, seu 129 aufer ex 150. Residuo 21 adnecte sequentem notam dividendi 5, & dic iterum: quoties 43 continentur in 215? Resp. 5. scribe 5 in quoto, & aufer ex 215 factum ex 5 in 43, sive 215. Cum nihil ex ea divisione supersit, constat numerum 235 illum præcisè esse qui oritur ex divisione 10105 per 43.

26. Demonstracionem habebis, si animadvertis in ejusmodi quæstione ita prorsus se rem habere ut si quæretur quora pars totius quantitatis singulis hominibus obveniret, si eam ex æquo tot hominibus distribui porteret, quot habet divisor unitates. Nam in singulis operationibus illud scilicet inquirimus, quot unitates, decades &c. singulis dari possint; iisque datis, quæ dari possunt, quot adhuc distribuendæ supersint. Rem transfer in quæstoriū régium, qui 10105 nummos aureos a

Rege

Rége acceperit militibus 43 ex æquo largiendos, & adhuc res magis in aperto erit.

27. Facile vides post quamlibet subtractionem perfectam id quod relinquitur, antequam notam ulteriorem ex dividendo adjicias, divisore minorem esse oportere: nam si residuum æquale foret vel maius, jam divisor pluriæ contineretur in quantitate jam divisa, quam numerus indicet in quotum relatus.

28. Postquam residuo ulteriorem divisoris notam adjeceris, si adhuc quantitas manet divisore minor, qui proinde nusquam in ea contineatur, cyphram scribes in quoto, & adhuc ulteriorem divisoris notam residuo adjicies ut divisionem promoveas. Sic in Ex. 12° quia sublatis 1641 ex 1684, residuum 43 actum nota 7 adhuc minus est divisore 547, ponitur 0 in quoto, & nota 6 apposita numero 437, queritur quoties divisor in 4376 continuatur.

29. Si divisione perfecta, cum nulla reliqua est in dividendo nota, adhuc aliquid residui ex postrema subtractione supersit, quo adjicienda est fractio, cuius denominator est divisor, numerator vero residuum illud postremum. Sic in Ex. 13° cum 182 superfuerint, quo-

to adjecta est fractio $\frac{1}{8} \frac{8}{3} \frac{2}{5}$ Nempe si nummos 43602

partiri deberes ex æquo hominibus 853, singuli acciperent nummos 52, & præterea 182 partes ejusmodi, qualium in singulis nummis 835 continentur. Poteris etiam divisionem promovere si postremo residuo cyphram adjicias puncto interposito, ut unitates ad decimas partes unitatis redigantur, nam si puncto item interposito quoto notas adscribas, quæ deinceps obveniunt, ex divisione (quam per novas subinde cyphras residuis adjectas continuare poteris ut libuerit) habebis partes unitatis decimas, centesimas, millesimas &c. integræ notis addendas, eadem prorsus methodo, qua notæ integræ inventæ sunt, ut videre est in Ex. 14°. Continget interdum ut ad ultimum divisionis limitem hoc pacto pertinas, plerumque tamen fieri ut in seriem incidas abe-

intem in infinitum; cuius termini serius ocius iidem redeant, numquam tamen serius, quam post totidem terminos, quot habet divisor unitates. In hoc casu producitur divisio, donec valor obtineatur tam vero proximus, quantum quæstio, de qua agitur, requiret.

30. Cum numeri longiores sunt, omnis difficultas in eo sita est; quod non satis pateat, quoties divisor in assumptis dividendi notis contineatur. Qui satis fuerit in ejusmodi calculis exercitatus facile videbit ex primis ipsis utriusque numeri notis, quoties unus sumendus sit, ut altero fiat proxime minor; at qui usu careat facile in eo decipietur. Tutius incedet, si divisionem aggressurus eam prius, quam scalam vocant, sibi confecerit. Divisor nempe per numeros omnes ab 1 ad 9 multiplicandus est, omnesque producti ex ea multiplicatione numeri divisor ex ordine subjiciendi, ut in Ex. 14º faciat; hoc enim pacto si hos numeros compares cum dividendi notis, in quibus divisionem instituis, statim videbis quinam ex illis sit proxime minor: ponas in quoto numerum, in quem ductus divisor eam efficit quantitatem, quantitatem vero ipsam ex dividendi notis subduces.

31. Verum ea res admodum molesta accidit, & animus defatigatione victus facilius quam credi possit impinget ubi cæteroquin nulla est difficultas. Quare in his præsertim casibus Neperianis lamellis uti præstat. In Ex. 15º (Tab. 2.) tabellas felige, & dispone ut earum in fronte numeri exhibeant divisorum 37895. Deinde reselectis ad dexteram dividendi notis, quibus numerus fiat divisori par, vel eodem proxime major, quæte in lamellarum ordinibus, numerum 94076, vel proxime minorem, probe animadvertis quod diximus, hos numeros in lamellis ita legendos ut qui eodem rhombo includuntur in unam summam colligantur, denariis, si quæ occurrunt, in anteriores notas de more translatis. Invenies hoc pacto in ordine secundo numerum proxime minorem predicto, 75790: scribe ergo 2 in quoto, & dendo subtrahe, residuo adjice numerum inventum a di-
proxi-

proxime sequentem dividendi notam, & sic porro perge donec vel divisionem absolvias, vel quotum habeas quantum libuerit vero proximum.

32. Divisionis rite peractæ argumentum habebis si divisorem in quotum ducas, redeatque divisus numerus; nam si non redeat, manifestum est alicubi errorem esse admissum. Nota tamen quod si divisorem exactum habere non licuit, facto ex divisore in quotum addere oportet residuum ex ultima divisionis subtractione, ut redeat divisa quantitas. Sic in Ex. 15 si ducas 37895 in 2482, & facto addas postremum residuum 21138, habebis divisum 94076528.

§. VI.

Additio & subtraction in numeris fractis.

33. ET hæc quidem in numeris integris ita peraguntur, at in fractis aliam fere rationem inire oportet. Fractiones ejusdem speciei dicuntur, si eundem habent denominatorem, diversæ si diversum. Quæ ejusdem speciei sunt facile in unam summam adduntur, vel ab invicem subtrahuntur addendo vel subtrahendo numeratores: qua in re illud est animadvertisendum, quod quoties ex numeratoribus colligitur numerus denominatori æqualis, toties unitas ad integras est rei cienda: itemque in subtractione si subtrahenda fractio illa major est unde subtrahitur, unitas ex integris, si qui sunt in quantitate multiplicanda, mutua est accipienda, ex qua fractio fiat eundem habens cum subtrahenda denominatorem, ac numeratorem ut minori fractioni adjiciatur.

34. In exemplo 16^o si fractionum numeratores colligas bis pervenies ad 5 partes unitatis quintas, quare duæ unitates integras sunt adjiciendæ, & summam colliges $64\frac{1}{5}$. At in Ex. 17^o quoniam fractio $\frac{4}{5}$ ex $\frac{2}{5}$ auferri

ferri nequit, ex 23 unitas sumitur quæ valet $\frac{5}{5}$ & $\frac{4}{5}$ au-
fertur ex $\frac{7}{5}$, tum 8 auferuntur ex 22, & reliqua est
differentia 14. $\frac{3}{5}$.

35. Licet etiam in unam summam seorsum colligere numeratores, & numerum exinde provenientem per denominatorem dividere: quotus enim integros dabit numeros, & residuum erit numerator fractionis adjiciendæ. Sic in Ex. 18° summa numerorum est 94, quem numerum si dividas per 24, quotus est 3. $\frac{2}{2} \frac{2}{4}$ quem integrorum summæ addere oportet. Et hac quidem methodo uti præstat ubi numeris majoribus fractiones constant.

36. Cum pondera & mensuræ, aut alia ejusmodi in unam summam colliguntur, vel ab invicem subtrahuntur, quorum majores partes certum minorum partium numerum continent, eadem methodo in his pertractandis uti debemus, qua in reliquis ejusdem speciei fractionibus usi sumus: nam & hæ re ipsa fractiones sunt, quibus denominator idcirco non apponitur, quia jam constat quo ex illis requirantur ut unam ex partibus proximè majoribus effiant. Sic in Ex. 19° cum 18 octavæ colligantur duæ tantum hærent loco suo, reliquæ vero 16 cum duas uncias effiant, earum numerum duabus augent unitatibus: & similiter cum unciae colligantur 32, duas ex his libras conficimus, & in unciarum loco 8 tantum, quæ supersunt, notari debent. At in Ex. 20° cum 4 octavæ a 3 auferri nequeant, mutuam accipe unam unciam, quæ 8 continet octavas, & ex 11 sublatis 4, supersunt septem. Similiter cum ex 5 reliquis unciiis 9 auferri nequeant, mutuam accipimus unam ex libris, quæ duodecim unciiis constat, & 9 unciiis sublatis ex 17, supersunt 8: ac denique ex libris 40 subducimus 17 & reliquas habemus 23.

§. VII.

Fractiones ad eundem denominatorem redigere.

Fractiones diversæ speciei addi nequeunt vel subtrahi, nisi prius ad eundem denominatorem redigantur. Potest autem quælibet fractio salva quantitate diversum habere denominatorem, si numeratorem per eamdem quantitatem multiplicet, vel dividat, per quam denominator multiplicatur, aut dividitur; Sic $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{4}{8}$ &c. eadem quantitas sunt, licet diversi sint numeri, quia unius numeratoris alterius æque multiplex vel submultiplex est, ut denominator denominatoris. Itaque si duæ dentur fractiones diversæ speciei, ut alia ratio non suppetat qua redigi possint ad eandem speciem, numeratorem unius duces in denominatorem alterius, & viceversa; denominatores vero ipsos invicem duces, ut in Ex. 21 factum est. Nam factum ex denominatibus erit novarum fractionum communis denominator, & duo priora producta novos dabunt numeratores. Et eadem ratione progrederi licebit si plures sint ejusmodi fractiones ad eandem speciem revocandas. Nam ubi priorē duas addideris, vel invicem subduxeris, prout res postulat, summa, vel differentia, ad eundem denominatorem redigetur, quo tertia afficitur, & sic deinceps.

38. Dixi, *ut alia ratio non suppetat*, nam multoties idem obtineri potest una tantum immutata fractione, si nempe hujus denominator ad eundem numerum revocari possit cum denominatore alterius, sive per integrum multiplicetur (in quem numerator etiam ducendus erit) sive per integrum dividatur, quo etiam numerator dividi possit. Sic si dentur duæ fractiones $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{6}$, nemo non videt primam revocari posse ad denominatorem secundè duplicando ipsius denominatorem, ac numeratorem:

rem: & si dentur $\frac{2}{3}$, $\frac{6}{8}$, secunda ejusdem evadit speciei cum prima, si per 6 uterque illius numerus dividatur. Vérum non id semper licebit, nam $\frac{1}{5}$ & $\frac{8}{7}$ Ex: gr. non possunt ad eundem denominatorem adduci, nisi utroque denominatore immutato per traditam methodum; cum nullus sit integer, in quem ductus 5 evadat 7, & nullus sit integer per quem 7 divisus evadat 5.

§. VII.

Inventio divisorum.

39. **G**eneris loquendo, nusquam licebit unam fractionem ad eamdem speciem cum altera revocare, nisi utraque immutata, quoties denominatores numeri erunt vel in se primi, vel inter se. Numeri in se primi dicuntur, quos sola unitas metitur, cujusmodi sunt 1, 5, 7, 11, 19. Inter se primi dicuntur, qui præter unitatem nullum habent inter se communem divisorum.

40. His opponuntur numeri compositi, quos nempe præter unitatem alii quoque numeri metiuntur: sic 12 componitur ex 2 & 6, itemque ex 3 & 4, unde 2, 3, 4, 6 metiuntur 12, seu (quod perinde est) aliquoties sumptis 12 adæquant. Quod si igitur alicujus fractionis denominator sit numerus compositus, & resolvi possit in alterius fractionis denominatorem divisione instituta per numerum, ex quo numerator etiam componatur, licebit per divisionem fractionem hanc ad alterius denominatorem deprimere.

41. Et in minoribus quidem numeris facile dignoscitur utrum, & quos communes habeant divisorum, at in majoribus aliquo artificio opus est, quo etiam utimur cum fractionem ad minimos terminos deprimere volimus. Etsi autem methodus tradi solet, qua communes ejus:

ejusmodi divisores inveniantur, libet tamen docere quomodo omnes dati numeri divisores inveniendi sint, quod & ad rem facit, de qua loquimur, & alias etiam in arithmeticā praestat utilitates.

42. Quærantur omnes divisores numeri 148. Ducta linea horizontali (Ex. 22º) super illam aliam erige transversam lineam, cui ex alterutra parte numerum datum, & quotos ex divisione emergentes adscribas, ex altera vero divisores inveniendos. Quæratur primò minimus dati numeri divisor, qui in casu nostro est 2, ut vel ex eo potest intelligi, quod numerus datus est par. Scribe ergo 2 in divisoribus, & ex altera parte quotum ex hac divisione 74. Rursus cum hic quotus sit numerus par, dividi poterit per 2: quare scribe iterum 2 in divisoribus, & quotum 37 ex alia parte. Tum duc 2 in 2, & factum 4 adjice divisoribus inventis. Nam si 148 dividi potest per 2, & quotus hujus divisionis iterum dividitur per 2, manifestum est, quod totus numerus etiam per 4 dividi potest. Quoniam vero postremus quotus 37 numerus est primus, qui per se ipsum tantummodo dividi potest, aut per unitatem, nam alii ipsius divisores frustra inquiruntur: scribe 37 in divisoribus, & unitatem in quotis, deinde ob rationem jam dictam duc 37 in divisores antea inventos 2 & 4, & qui inde fiunt numeri 74, 148 divisoribus adjiciantur, habebisque omnes dati numeri divisores 2, 4, 37, 74, 148. Quod si igitur revocanda esset ad minimos terminos fractio $\frac{37}{1 \cdot 48}$ ex his intelligeres dividendam esse per maximum divisorum communem 37, ut evaderet $\frac{1}{4}$; & si ad eamdem denominationem revocare oporteret fractiones $\frac{1}{37}$, $\frac{8}{148}$, hanc ad illam redigendam esse intelligeres divisione instituta per 4, qui numeratorem etiam dividit, & evadent $\frac{2}{37}$.

43. Notandum hic est, quod numeri etiam integri

ad quamlibet fractionis speciem revocari possunt, si per numerum multiplicentur, qui denominator est fractionis datæ, & facto idem subjiciatur denominator, Sic $\frac{7}{5}$ & $\frac{2}{5}$ ad eamdem speciem rediguntur si $\frac{7}{5}$ ducatur in $\frac{5}{5}$, exinde conficiatur fractio $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{5}$. Ratio in productus est ex dictis, si numeri integri pro fractis habentur, quorum denominator est unitas.

§. VIII.

Fractiones multiplicare, & dividere.

44. **N**ulla reductione opus est, ubi fractiones multiplicare oportet; satis est enim numeratores, & denominatores invicem ducere, ut novus existat numerator & denominator fractionis, quæ erit factum ex datis fractionibus emergens. Sic factum ex $\frac{2}{6}$ in $\frac{4}{8}$ est $\frac{8}{48}$. Contra vero si fractio per aliam fractionem dividenda sit, dividendæ numerator per alterius denominatorem est multiplicandus, & illius denominator in hujus numeratorem ducendus est. Sic quotus ex $\frac{3}{6}$ per $\frac{2}{16}$ est $\frac{4}{12}$, sive 4. Nec mirum esse debet, si fractio per fractionem divisa dat numerum integrum, cum revera una fractio bis, ter, quater &c. in alia contineri possit. Itaque fractionis valor per multiplicationem minuitur, augetur per divisionem, & ratio constat, si ipsa divisionis, & multiplicationis natura attendatur. Quod si numerus compositus ex integro & fracto per numerum ex fracto & integro pariter compositum multiplicandus sit aut dividendus, uterque integer ad eamdem cum fracto suo speciem revocandus est, & in unam suminam cum eodem colligendus, ubi enim hoc feceris eadem prorsus methodo res absolvitur, ut in puris fractionibus.

ctionibus factum est. Atque ita etiam si diversæ speciei quantitates jut puta, libræ, unciae, octavæ per similes quantitates multiplicandæ essent, aut dividendæ, utrasque prius oportet ad infimam speciem redigere.

Sic ut habeatur factum ex $2 \cdot \frac{4}{5}$ in $3 \cdot \frac{5}{6}$, prior quantitas ad eamdem speciem redacta dat $\frac{1 \cdot 4}{5}$, secunda vero $\frac{2 \cdot 3}{6}$, & factum ex utraque $\frac{3 \cdot 2 \cdot 2}{3 \cdot 0}$, sive $10 \cdot \frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 0}$, aut $10 \cdot \frac{1 \cdot 1}{1 \cdot 5}$, fractione ad minimos terminos depreßa.

§. IX.

De iisdem in fractionibus decimalibus.

45. Fractiones decimales eadem omnino ratione qua integri, pertractantur. Solum habenda est maxime ratio puncti, quo ab integris diriuntur. Hoc enim punctum in eadem verticali linea jacere debet cum plures quantitates vel in unam suminam colligendæ sunt, vel ab invicem subducendæ. Ubi vero multiplicatio instituitur, eum locum in facto occupare debet, ut totidem post se notas relinquit quot erant in utroque coefficiente. Demum si divisio peragitur, divisi numeri decimales notæ probe notandæ sunt computando in his etiam cyphras, quæ ad divisionem continuandam adjectæ essent; nam in quoto, & divisorе simul totidem esse debent post punctum notæ, quot erant in dividendo. Additionem, subtractionem, multiplicationem, & divisionem ejusmodi exhibent exempla 23, 24, 25, 26.

46. Notandum est tamen quod interdum vacantia loca cyphis supplenda sunt. In subtractione, si numerus subtrahendus plures habet notas quam is unde subtrahitur, huic adjicere oportet tot cyphras, quot in illo notæ superfluyunt. Sic in Ex. 27° subtractione peragitur

non aliter quam si vacantia superioris numeri loca cyphras continerent.

47. At si quantitates se mutuo destruant antequam ad punctum pervenias, quæ vacant in differentia loca ad punctum usque cyphris supplenda sunt, sive etiam integri numeri omnino se destruant, ut in Ex. 28°, sive aliquam relinquant differentiam, ut in Ex. 29°.

48. In multiplicatione, si non tot fuerint in facto notæ, quot in utroque coefficiente decimales, tot illi sunt cyphræ anterius apponendæ, donec hunc notarum numerum adæquent. Ita factum est in Ex: 30.

49. Demum in divisione instituenda, si dividendus non tot habet notas quot requiruntur ut divisorem superet vel adæquet(tot in fine cyphræ adjiciantur, quot opus fuerit ad hunc defectum supplendum. Quod si divisione peracta, plures sint in diviso numero decimales notæ quam in divisore simul, & quoto, huic erunt apponendæ anterius tot cyphræ quot in diviso notæ superfluunt. Utrumque contingit in Ex. 3 1°. Nam si divisor est 356. 27, & dividendus sit 3. 314, huic erunt duæ cyphræ apponendæ, ut divisio possit institui, quæ cum deinde per duplarem cyphræ adjectionem continuetur, numerabit dividendus septem decimales notas, cum duæ tantum sint in divisore. Quinque igitur ejusmodi notæ esse debebunt in quoto, & ut totidem sint duæ illi cyphræ erunt anterius apponendæ.

§. X.

Extractione Radicum.

50. **V**eniendum est jam ad extractionem radicum, qua in re illud in primis est animadverendum quod si numerus in se ipsum ducitur, productum dicitur quadratum, sive potentia aut dignitas secunda ejusdem numeri, cum numerus ipse potentia prima dicatur. Si quadratum iterum ducitur in suum numerum, factum dicitur cubus, sive potentia tertia. Si cu-

bis

bis in eundem ducatur numerum factum dicitur potentia quarta. Si hæc iterum ducatur in eundem numerum, factum erit potentia quinta, eodemque modo sexta, septima &c. ejusdem numeri potentiae gignuntur. Sic 3 est sui ipsius potentia prima, 9 secunda, 27 tercia, 81 quarta, 243 quinta, & sic deinceps.

51. Contraria prorsus ratione 3 dicitur radix quadrata, aut secunda, sive sine ullo addito radix numeri 9, radix cubica aut tertia numeri 27, Radix quarta 81, quinta 243 &c.

52. Dati numeri potentiam quamlibet invenire facilissimum est ope multiplicationis; at radicem investigare longe difficultius: immo infiniti numeri nullas habent radices veras, quas numeris liceat exprimere, sed tantummodo veris proximas, quæ scilicet fractionum ope ad veras quantum libuerit accedant, quin usquam ad exactum earumdem valorem pertingant. Sic potentia secunda binarii est 4, ternarii est 9, adeoque Radix 4 est 2, radix 9 est 3: sed nullus numerus inter 4 & 9 radicem habet exactam in numeris vel integris vel fractis. Non in numeris integris quia major esse debet quam 2, minor quam 3: non in fractis vel in integris simul cum fractis, quia numerus fractus, vel compositus ex integro & fracto, in suo quadrato fractionem aliquam semper habet.

53. Radices extrahere dicimus eum ejusmodi radices veras, vel veris proximas investigamus. Methodum hic dabimus expeditam ad radices quadratas extrahendas, de altioribus dicemus in arithmeticâ speciosa, ubi formulæ algebraicæ ipsam hujus operationis rationem facile demonstrabunt. Ante tamen in promptu habere necesse est quadrata novem primorum numerorum, quæ sunt, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ut statim assignari possit radix vera, vel proxime minor vera ejuslibet numeri minoris quam 100.

54. Detur in Ex. 32º numerus 18190125 cuius radicem quadratam extrahere oporteat. Numerum datum in classes divide, quarum singulæ duas notas con-

neant, initio a postremis facto, nihil enim refert sive unica tantum nota prima classis constet, sive duabus, ut in hoc casu contingit, & quot erunt ejusmodi classes, totidem radix quæ sita habebit notas. Hinc dicta linea transversa ad calcem numeri, ut divisione fit,

55. Quære radicem veram, aut proxime minorem vera notarum primæ classis, quæ in nostro casu est 4, scribe 4 ubi in divisione quoti numeri notari solent, & ejus quadratum 16 aufer ex 18. Residuo 2 adnecte notas classis proxime sequentis & hujus novi numeri postrema nota contempta, quære quoties duplum radicis hactenus inventæ, sive 8, continetur in 21? Resp. 2. scribe ergo 2 in radice & ex 219 aufer productum ex 2 in 82, hoc est, in numerum compositum ex duplo radicis prius inventæ in decadum ordinem translato, & ex radice postremo inventa. Quod si contingenter factum ex 2 in 82 majorem esse, quam ut ex 219 subduci posset, pro 2 scribendus esset in radice numerus proxime minor & in eo tota operatio esset reformanda. Sed in casu nostro id minime contingit, quare ex 219 aufer 2 in 82, sive 164, & residuo adnecte notas classis proxime sequentis. Rursus contempta novi numeri postrema nota dic: quoties duplum radicis hactenus inventæ, sive 84 continetur in 550? Resp. 6, & quoniam factum ex 6 in 846 est ejusmodi ut auferri possit ex 5502, scribe 6 in radice, & ea subtractione peracta residuo adnecte postremas duas dati numeri notas. Dic ergo iterum quoties duplum radicis hactenus inventæ, sive 852 continetur in 4262? Resp. 5: & quoniam factum ex 5 in 8525 auferri potest ex 42625, scribe quinque in radice, & subtractione peracta quoniam nihil reliqui sit, id erit indicio radicem exactam dati numeri esse 4265.

56. Quod si post ultimam subtractionem aliquid superfit, punctum residuo apponitur, & duæ cyphræ adjiciuntur, ut operatio continuetur in partibus decimis unitatis. Exinde eadem ratione progredimur ad centesimas, & sic deinceps quantum libuerit, ut videre est in Ex. 33°.

57. Idem hic quoque notare oportet quod est in divisione animadversum. Nempe si post adjectas alicui residuo notas duas classis proxime sequentis duplum radicis inventæ nusquam contineatur in numero, qui per illud dividendus est postrema hujus nota contempta, cyphra ponenda est in radice, & classis sequentis duabus notis demissis operatio continuanda.

58. Denique hæc operatio divisioni est perquam simillima, in qua radix sit quotus, divisor verò sit duplum radicis postremò inventæ auctum nota, quæ deinceps inquiritur. Hoc unum interest, quod in divisione divisor semper est idem, hic autem semper augetur; ibi totus divisor cognoscitur, hic autem ignota est novi divisoris nota, quæ inquiritur; quod in causa est, cur in hac divisione instituenda postrema quantitatis dividendæ nota prætereatur.

59. Si numerus, unde radix extrahenda est, fractiones habeat decimales, classium divisio hinc & inde a puncto exordium sumit, ut videre est in Ex. 34^o: ubi nota quod cum decimalium classes desinant in unam notam, ubi hæc postremo residuo est adjicienda, apposita cyphra ad binas adducitur.

60. Hujus operationis ritè peractæ argumentum habebis, si radicis inventæ quadratum quæras, & huic residuum addas, si aliquid peracta operatione superfuit, redibit enim numerus, unde radix extracta est. Quod, si radix extracta est ex quantitate composita ex integris & decimalibus, ubi operationis periculum facies numerus emerget, qui præter dati numeri notas aliquot in fine cyphras contineat; ne tamen putes alicujus erroris indicium hoc esse, nam cyphræ decimalibus in fine numeri adjectæ nihil mutant quantitatem, quemadmodum nihil eandem mutant in integris cyphræ anterius appositæ.

§. XI.

De numeris surdis.

61. **M**Ultoties ab extrahenda radice supersedemus; ubi veram invenire non licet, & numero, ex quo esset extrahenda signum radicale prefigimus $\sqrt{\cdot}$: sic $\sqrt{3}$ significat radicem quadratam numeri 3, & $\sqrt[3]{10}$ denotat radicem cubicam denarii & $\sqrt[4]{28}$ denotat radicem quartam 28. Et hi sunt quos Arithmetici vocant numeros surdos, sive irrationales.

62. Ubi plures dantur ejusmodi numeri surdi, adduntur, vel subtrahuntur facillime, si & ejusdem sint ordinis & idem sit ubique sub signo radicali numerus, praefigendo scilicet numerum, qui denotet quoties ea surda quantitas sumenda sit; sic $7\sqrt{2}$ est summa $2\sqrt{2}$ & $5\sqrt{2}$, & $5\sqrt{2}$ est differentia inter $7\sqrt{2}$, & $2\sqrt{2}$. At ubi numeri sub signo radicali positi diversi sunt non aliter fere addi possunt, aut subtrahi quam connectendo quantitates per additionis, aut subtractionis signa, de quibus dictum est in Scholio post prop. 9. Geom. & iterum dicetur in §. I. Elem. Algebræ.

63. Contingit tamen interdum ut quantitates surdae ad eundem numerum revocari possint; in quo casu licet post reductionem easdem addere, aut subtrahere, uti dictum est. Reducuntur autem eadem ratione, qua ad minimos terminos revocantur. Numeri sub signo radicali positi quare omnes divisores, & inspice an inter illos sit aliquis, ex quo liceat radicem extrahere ejus ordinis, cuius est surda quantitas. Si aliquem ejusmodi divisorem invenias, ejus radicem praefige signo radicali, sub quo hærebit tantummodo alter dati numeri coefficiens. Sic $\sqrt{8}$ resolvitur in radicem facti ex 2 in

$\sqrt{4}$ unde æqualis invenitur $2\sqrt{2}$, & $\sqrt{3^2} = \sqrt{9}$ $\sqrt{16\sqrt{2}}$ æquatur $4\sqrt{2}$. Eadem ratione $\sqrt{16}$ æquatur $2\sqrt{2}$, quia

Arithm. Cap. I Tab. I pag. 72

A 247. B $\frac{3^3}{4} 3243578562914028467212$. C 23.1406. D 232.023. E 0.0026. F $\frac{2}{3}$. G $\frac{5}{8}$. H $\frac{7}{12}$

(Ex.7)	(Ex.8)	(Ex.9)	(Ex.10)	(Ex.11)	(Ex.12)
$\begin{array}{r} 235 \\ \times 43 \\ \hline 10105 \end{array}$	$\begin{array}{r} 52300 \\ 8420 \\ \hline 440366000 \end{array}$	$\begin{array}{r} 523 \\ 842 \\ \hline 440366000 \end{array}$	$\begin{array}{r} 547 \\ 308 \\ \hline 1641 \end{array}$	$\begin{array}{r} 547 \\ 308 \\ \hline 1641 \end{array}$	$\begin{array}{r} 547 \\ 168476 \\ \hline 1641 \end{array}$

(Ex.7)	(Ex.8)	(Ex.9)	(Ex.10)	(Ex.11)	(Ex.12)
$\begin{array}{r} 235 \\ \times 43 \\ \hline 10105 \end{array}$	$\begin{array}{r} 52300 \\ 8420 \\ \hline 440366000 \end{array}$	$\begin{array}{r} 547 \\ 308 \\ \hline 1641 \end{array}$	$\begin{array}{r} 547 \\ 308 \\ \hline 1641 \end{array}$	$\begin{array}{r} 547 \\ 168476 \\ \hline 1641 \end{array}$	$\begin{array}{r} 835 \\ \times 43602 \\ \hline 35182 \end{array}$

(Ex.10)	(Ex.11)	(Ex.12)
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c } \hline & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 0 \\ \hline 1 & & & & & & & & & & \\ 2 & & & & & & & & & & \\ 3 & & & & & & & & & & \\ 4 & & & & & & & & & & \\ 5 & & & & & & & & & & \\ 6 & & & & & & & & & & \\ 7 & & & & & & & & & & \\ 8 & & & & & & & & & & \\ 9 & & & & & & & & & & \\ 0 & & & & & & & & & & \\ \hline \end{array}$ $\begin{array}{r} T \ 58906 \\ V \ 3798 \\ \hline 471248 \end{array}$ $\begin{array}{r} 530354 \\ 412342 \\ 176718 \\ \hline 223724988 \end{array}$	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c } \hline & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 0 \\ \hline A & & & & & & & & & & \\ 1 & & & & & & & & & & \\ 2 & & & & & & & & & & \\ 3 & & & & & & & & & & \\ 4 & & & & & & & & & & \\ 5 & & & & & & & & & & \\ 6 & & & & & & & & & & \\ 7 & & & & & & & & & & \\ 8 & & & & & & & & & & \\ 9 & & & & & & & & & & \\ 0 & & & & & & & & & & \\ \hline \end{array}$ $\begin{array}{r} A \\ B \\ C \\ D \end{array}$	$\begin{array}{r} 835 \\ \times 43602 \\ \hline 35182 \end{array}$ $\begin{array}{r} 4175 \\ 2505 \\ 3340 \\ 4175 \\ 5010 \\ 5845 \\ 6680 \\ 7515 \\ \hline 1500 \\ 835 \\ 6650 \\ 5845 \\ 805 \end{array}$

Arithm. Cap. I. Tab. II. pag. 72.

	37895	94076528.	(Ex.15)	(Ex.16)	Ex.17)	(Ex.18)	(Ex.19)
		75799				$13 \frac{1}{2} \frac{8}{4} 18$	
		182865	(2482)	$13 \frac{2}{5}$		$7 \frac{3}{2} 4$	21
		131580				$22 \frac{3}{2} 0$	20
		312852		$7 \frac{3}{5}$		$19 \frac{1}{2} 8$	18
		303269		$19 \frac{4}{5}$	$23 \frac{2}{1}$	$19 \frac{1}{2} 7$	17
		96928		$23 \frac{2}{5}$		$7 \frac{3}{2} 4$	94
		75790		$8 \frac{4}{5}$		$7 \frac{3}{2} 4$	34 9 6
		27138		$64 \frac{1}{5}$	$14 \frac{3}{5}$	$71 \frac{2}{5} 2$	7. 11. 5
							35. 10. 7
							78. 8. 2
(Ex.20)	(Ex.21.)	(Ex.22)	(Ex.23)	(Ex.24)	(Ex.25)	(Ex.26)	(Ex.27)
41. 6. 3					6. 21	138. 26 22. 2	47. 23
17. 9. 4						1242	47. 23000
23. 8. 7	3 1						25. 65789
	$\overline{\overline{X}}$						15. 65789
(Ex.28.)	7 5		148		12. 35	31. 57211	31. 57211
231. 457			2	74	$4 \frac{2}{2}$	$\overline{\overline{1406}}$	(Ex.29)
231. 465	15 7	42	37	23. 304		1242	
		$\overline{\overline{148. 7+37}}$	1	3. 9567	49. 638	1640	46. 378
			1	149. 86	17. 16	1242	21. 368
0. 002	35 35				4940		
					51. 870	398	25. 009
(Ex.30)	(Ex.31)		(Ex.32)	(Ex.33)	6121145. (249.28	(Ex.34)	31346211 (18. 292
		$18(1902125(4265$	16	4	$\overline{\overline{1}}$		
		336.27			221		
					176		
. 134	231400	. 00649.	219			234	
. 231	213762		164			224	
					4545		
					4401		
134	176380		5502				10. 62
					14400		
402	142508		5076		9964		
					443600		
268	338720		42635		398784		
					44816 &c.		
		. 030954	320643				96900
							73164
			18077	00000			23736 &c.

16 resolvitur in coefficientes 8 & 2, quorum ille habet radicem cubicam 2, & $\sqrt[4]{96}$ æquatur $2\sqrt[4]{6}$, quia 96 resolvitur in 16 & 6, quorum prior habet radicem quartam 2.

64. Demum multiplicantur, & dividuntur numeri irrationales, quemadmodum reliqui numeri, & factō vel quoto idem quod prius erat signum radicale præfigitur, quod quidem in utroque numero sit ejusdem ordinis; nam si sint ordinis diversi, prius ad eundem ordinem quantitates erunt ejusmodi revocandæ, de qua re commodius dicetur ubi de potentiarum exponentibus & logarithmis agemus. Interim factum ex $\sqrt{2}$ in $\sqrt{8}$ est $\sqrt{16}$, sive 4, & quotus ex $\sqrt{8}$ divisa per $\sqrt{2}$ æquatur $\sqrt{4}$, seu 2. Factum vero ex $\sqrt{2}$ in $\sqrt{3}$ est $\sqrt{6}$, & quotus ex $\sqrt{5}$ per $\sqrt{3}$ æquatur $\sqrt{\frac{5}{3}}$. Quod si quantitates irrationales per rationales multiplicare oporteat aut dividere, non alia re opus est quam has illis præfigere, aut subjicere sic factum ex 10 in $\sqrt{3}$ est $10\sqrt{3}$, & quotus ex divisione $\sqrt{3}$ per 5 est $\sqrt{\frac{3}{5}}$, seu $\frac{1}{5}\sqrt{3}$; sic enim scribere præstat ne divisorem radicali signo affectum esse quis putet.

C A P U T II.

De Rationibus, & Proportionibus.

§. L

De ratione simplici.

I. **E**T si de his in Geometriæ Elementis aliqua diximus quantum eo loci res postulabat, non tamē erit inutile aliqua hic repetere, ubi ea doctrina plenius tradenda est; tum ne sæpius lectorem ad superiora remittamus, tum quia tanti refert animo hæc altius imprime-re,

te, ut opere præsum sit ea sepius Tyronibus inculcare. Utemur interdum arithmeticæ speciosæ notis ad proportionum affectiones vel generalius exprimendas, vel brevius demonstrandas. Itaque antequam hoc caput legere aggrediantur, recolant quæ de his ibidem annotavimus, aut §. I. & II. Algebræ, quos a reliquis nouiinus divellere, attente perlegant.

2. *Ratio* dicitur ea duarum quantitatum habitudo, qua ad invicem referuntur in ordine ad ipsam quantitatem. *Geometrica* est si in ea relatione spectemus quomodo una quantitas alteram contineat: *Arithmeticæ*, si excessum tantummodo unius supra aliam consideremus. Si referas 10 ad 5 quatenus prior quantitas secundam bis continet, ratio erit geometrica: at si referas 10 ad 5 quatenus prior quinque unitatibus secundam excedit, ratio erit arithmeticæ. Rationis autem nomine, nisi quid additur, semper Geometrica designatur.

3. In omni ratione quantitas, quæ ad aliam referuntur, antecedens dicitur, ea vero ad quam refertur, consequens.

4. Ratio Geometrica dicitur dupla, tripla, decuplicata &c. Si antecedens bis, ter, decies &c. consequentem continet: contra vero subdupla, subtripla subdecuplicata &c. Si bis, ter, decies &c. antecedens in consequenti continentur.

5. Exponens rationis Geometricæ dicitur quotus ex antecedenti per consequentem diviso: Exponens vero arithmeticæ est differentia consequentis ab antecedenti. Sic exponens rationis Geometricæ 10 ad 5 est 2, exponens arithmeticæ 10 ad 7 est 3: Exponens Geometricæ 6 ad 9 est $\frac{2}{3}$, exponens arithmeticæ 5 ad 8 est 8 - 5: & in generis dentur quantitates a & b , eorum rationem geometricam exponet $\frac{a}{b}$ sive $a : b$ (nam ita quoque ea divisio designatur) arithmeticam $a - b$. Hinc ratio geometrica ad instar fractionis scribitur, arithmeticæ ad instar subtractionis.

6. Tota rationum doctrina ab hoc generali theorema te pendet: si antecedens & consequens rationis geometricæ per eamdem quantitatem multiplicentur aut dividantur eadem manet ratio: & eadem pariter manet ratio arithmeticæ si illius antecedentem, & consequentem eadem augeas quantitate, vel imminuas. Res demonstratione non indiget, patet enim ex ipsis terminis esse $6:2 \asymp 6 \times 4:2 \times 4 \asymp 24:8$, & $a:b \asymp ac:bc$: itemque $6:3 \asymp \frac{6}{2}:\frac{3}{2}$, & $a:b \asymp \frac{a}{d}:\frac{b}{d}$. Similiter $\frac{8-4}{5-4} = \frac{4}{1}$, $(8-\frac{1}{4}) - (5-\frac{1}{4}) = 12-9$, & $8-5 \asymp (8-2) - (5-2) = 6-3$.

7. Quantitates æquales æqualem habent ad eamdem quantitatem rationem, & contra: duarum vero inæqualium quantitarum quæ major est majorem habet ad tertiam quantitatem rationem, quam minor. Hæc & his similia satis per se manifesta sunt, & inter axioma-
ta reponenda.

8. Duarum rationum æqualitas proportio dicitur Geometrica vel Arithmeticæ pro rationum ipsarum qualitate: quare ad habendam proportionem quatuor quantitates requiruntur, & prima ad secundam esse dicitur, ut tercia ad quartam. Quod si eadem quantitas bis assumatur, ut proportio in tribus tantum quantitatibus constat, quod videlicet sit cum primæ rationis consequens idem est cum antecedente secundæ, proportio dicitur continua, quæ aliasdiscreta diceretur. Designatur Geometrica Proportio sic: $a.b::c.d$, vel $a:b \asymp c:d$, vel $\frac{a}{b} \asymp \frac{c}{d}$: Arithmeticæ vero $a-b \asymp c-d$.

9. In proportione Geometrica factum sub extremis terminis, æquatur facto sub mediis: & si quatuor quantitates sint ejusmodi, ut factum sub extremis æquetur facto sub mediis, eæ sunt geometricè proportionales. Id ipsum contingit in extremarum, & medianarum summa, si de Arithmeticæ proportione sermo sit. Si rem in numeris experiaris, ita se habere liquido deprehendes, at si demonstrationem directam inquisis, primam, & secun-

secundam partem demonstravimus in Elem. Geom. prop. 10. Tertia verò & quarta ex dictis num. 6., & 7. facile demonstratur. Nam si fuerit $a - b \asymp c - d$, erit (per n. 6.) $(a + c) - (b + c) \asymp (a + d) - (a + d)$; ergo (per num. 7.) $b + c \asymp a + d$. Rursus si fuerit $b + c \asymp a + d$, erit (per num. 3.) $(a + c) - (b + c) \asymp (a + c) - (a + d)$. Ergo (per num. 6.) $a - b \asymp e - d$.

10. In omni proportionē geometricā datis tribus terminis quartus facile invenitur. Nam si unus est ex extremis, æqualis erit factō sub mediis per alterum extreum diviso; & si est unus ex mediis æquabitur factō sub extremis per alterum medium diviso. In Arithmetica vero proportionē idem invenitur eadem ratione si multiplicationi additionem substituas, & divisioni subtractione. Descendit ex præcedentibus, nam si est $a. b :: x. c$, erit $a \times c \asymp b \times x$, atque adeo $x \asymp \frac{ac}{b}$ similiter si fuerit $c. d :: e. x$ erit $c \times x \asymp d \times e$, adeoque $x \asymp \frac{de}{c}$. At in Arithmetica si fuerit $a - x \asymp b - c$, erit $a + c \asymp x + b$, unde $x \asymp a + c - b$. Hinc regula aurea, sive trium, descendit, in qua datis prioribus tribus terminis geometricæ proportionis, tertius duci jubetur in secundum, & factum dividi per primum, ut quartus habeatur.

11. Ex nono numero deducitur quod utecumque ordinentur quatuor termini proportionales, manet proportio dummodo qui semel fuerant extreimi, vel ambo maneant extreimi, vel mediī, aut vice versa. Cum enim sint proportionales, factum sub extremis æquabitur factō sub mediis, & ordine, uti dictum est, immutato eadem manebit æqualitas. Et idem valet de summa in proportionē Arithmetica. Quoniam vero quilibet ex quatuor terminis primum locum occupare potest ejus coefficiente in postremum locum rejecto, & ex aliis duobus uterque mediorum primus esse potest altero secundo existente; terminorum ordo octies mutari posset.

test, ut patet in A, & B (Tab. pag. ~~110~~) ubi ejus
rei exemplum tam in Geometrica proportione positum
est, quam in Arithmeticā.

12. Ex prima terminorum ordinatione reliquæ omnes inferuntur, quarum illationum duæ tantum propriis nominibus designantur a Geometris, secunda scilicet, & quinta easum quæ sunt in A; nam argumentari dicimur *alternando* cum primus infertur esse ad tertium, ut secundus ad quartum: *invertendo*, si inferatur esse secundus ad primum, ut quartus ad tertium. Cæterum omnes ejusmodi mutationes non incongrue uno vocabulo *permutando* fieri duci possent.

13. In proportione geometrica est summa vel differentia terminorum primæ rationis ad primum vel secundum, ut summa vel differentia terminorum secundæ rationis ad primum vel secundum; & contra primus vel secundus terminus primæ rationis est ad summam vel differentiam terminorum ejusdem, ut primus vel secundus terminus rationis secundæ ad ejusdem terminorum summam vel differentiam. Rursus summa terminorum primæ rationis est ad eorumdem differentiam, ut summa terminorum secundæ ad ipsorum differentiam: & contra differentia terminorum primæ rationis ad eorumdem summam est ut differentia terminorum secundæ ad ipsorum summam. Hinc decem inferuntur proportiones, quæ dispositæ sunt in C, quarum posteriores quinque ex quinque prioribus fiunt *invertendo*. Harum omnium legitimam illationem in numeris explorabunt Tyrones, quos litteris in prima proportione semel substitutos iisdem in omnibus reliquis substituent, permagni enim interest per hanc numerorum substitutionem algebraico, ut ita dicam, sermoni assuescere eumque sibi familiarem efficere; in nostro autem casu quantitates semper proportionales obtinebunt. Cæterum generalis horum demonstratio patet in D ubi harum omnium illationum extremi & medii termini invicem ducti dant æquales quantitates, cum sit ex hypotesi

ad

$a \cdot d \asymp b \cdot c$, & his æqualibus quantitatibus ubique addantur vel admantur æquales.

14. Ex his decem proportionibus cum iectandam inferimus, in qua summa terminorum ad secundum referuntur, argumentari dicimur *componendo*; si vero eorumdem differentia ad secundum referuntur, argumentari dicimur *dividendo*: Quod si demum utriusque rationis prior terminus ad primi & secundi differentiam referatur, ut in octava fit, hoc argumentandi genus dicitur *conversio rationis*. Reliquæ illationes propriis nominibus carent. Cæterum in Arithmeticâ proportione harum illationum nulla locum habet.

15. In qualibet proportione eadem manebit rationum æqualitas, si per eandem quantitatem multiplicetur aut dividatur, vel primus & secundus terminus; vel primus & tertius; vel tertius & quartus; vel secundus & quartus, vel aliquod ex his binariis; vel omnia simul, sive per eandem omnia, sive per singulas singula binaria quantitates. Etenim in his omnibus casibus invenietur factum sub extremis terminis æquale factò sub mediis, ut patet in exemplo apposito in E ubi hos casus expressimus, in iisdem quantitatibus $a \cdot b :: c \cdot d$ per eamdem *m* successive multiplicatis, aut divisis. Et in quatuor quidem prioribus casibus factum sub extremis est ubique $m \cdot a \cdot d$; factum sub mediis $m \cdot b \cdot c$; in quatuor vero posterioribus, illud est $\frac{ad}{m}$, hoc $\frac{bc}{m}$; quæ omnia æqualia sunt inter se ob $a \cdot d \asymp b \cdot c$. Porro cum maneat proportio sive dividatur per eandem quantitatem sive multiplicetur unumquodlibet ex prædictis binariis; manifestum est eamdem manere sive in pluribus successive, sive in omnibus simul idem fiat. Rem in numeris experiri Tyronibus erit in primis utile, ut monuimus, tum ad exercitationem, tum ad res altius animo defigendas.

§. II.

De ratione composita.

16. **R**atio composita ex pluribus geometricis rationibus illa dicitur, quam habet factum ex eorum antecedentibus ad factum ex consequentibus; ratio autem ex Arithmeticis composita est illa, quam habet summa antecedentium ad summam consequentium. In F & H duæ sunt ex una parte rationes geometricæ, tres ex alia, & rationes ex his compositæ in G & K inveniuntur. Similiter duæ sunt rationes Arithmeticæ in L, & ex his compositæ in M.

17. Ratio composita est factum ex componentibus in geometricis, summa in arithmeticis. Nam quod ad primum attinet ratio $a : b$ est fractio $\frac{a}{b}$, & ratio $c : d$ est $\frac{c}{d}$ cum sit per num. 5. valor rationis quotus ex antecedenti per consequentem diviso. Sed $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ exprimit rationem $ac : bd$ ex simplicibus compositam: ergo ratio composita est factum ex componentibus. Sic ratio 4: 2 erat dupla, ratio 9: 3 tripla, ratio composita 36: 6 est sextupla. Similiter ex ratione 4: 2 dupla, 9: 3 tripla, 20: 5 quadrupla, oritur ratio 720: 30, cuius exponentis est 24, factum scilicet ex 2 X 3 X 4. Secunda pars evidens est, nam summa antecedentium est $a + c$, summa consequentium $b + d$, unde ratio ex his composita $(a + c) : (b + d)$. Patet etiam in rationibus 6: 2 = 4, 7: 5 = 2, ex quibus componitur ratio 13: 7 = 6: 4 + 2.

18. Si plures sint geometricæ proportiones & primi seorsim termini invicem multiplicentur; tum secundi, tum tertii, tum quarti; facta erunt proportionalia: & idipsum contingit in proportionibus arithmeticis si multiplicationi summa terminorum substituatur. Patet, quia

qua-

quatuor termini, qui inde efficiuntur, duas constituentes rationes ortas ibi ex multiplicatione, hic ex summa rationum æqualium adeoque & ipsæ æquales erunt inter se. Exempla habes in Q, R, S, T.

19. Si in pluribus rationibus geometricis vel arithmeticis eundem terminum alicubi esse contingat tum in antecedentibus, tum in consequentibus; eadem erit ratio composita etiamsi terminus ille supprimatur. Exempla habes in V & X, ubi $am: nc$, & $a: n$ sunt rationes compositæ ex tribus superioribus suppresso termino b in prima, & bc in secunda, quod hi antecedentibus, & consequentibus communes sunt. Eadem exempla exhibent numeri in Y, Z. Quod si quis in arithmeticis quoque rationibus exempla desideret, facillime per se ponet. Demonstratio pender ex eo quod in his casibus terminus supprimitur, qui multiplicaret in geometrica, & augeret in arithmeticâ utrumque terminum rationis, quare eadem manet ratio (*per num. 6.*) sive abjiciatur ille terminus, sive inducatur in rationem compositam. Inde etiam facile eruitur quod toties in consequentibus idem terminus prætermitti potest quoties in antecedentibus suppressus est, ut in AA: ubi cum b semel in antecedentibus occurrat, bis in consequentibus, in his non nisi semel supprimi potest.

20. Ratio sive geometrica, sive arithmeticâ uniuscujusvis termini ad alium quemvis componitur ex rationibus intermediis, quæ oriuntur ex quovis numero terminorum interjacentium. Sic ratio $a: b$ æquatur rationi compositæ ex $a: m$, $m: p$, $p: r$, $r: c$, $c: b$, initio facto in a , & desinendo in b , sumptis terminis intermediis quot libuerit. Sic in numeris ratio 36: 2 est ratio composita ex 36: 18, 18: 6, 6: 12, 12: 4, 4: 2. Demonstratio in promptu est, quia quantitates illæ intermediae in antecedentibus & consequentibus occurrunt, unde ratio composita ex $a: m$, $m: p$, $p: r$, $r: c$, $c: b$ eadem est ac ratio $amprc: mpircb$, in qua suppressis communibus terminis remanet ratio $a: b$.

21. Hinc duplex oritur argumentandi ratio, quarum altera

altera dicitur *ex aequalitate ordinata*, altera *ex aequalitate perturbata*: Sint, ut in AB & AC, tres quantitates ex una parte, & tres ex alia, ita ut eadem sit utrobique ratio primæ ad secundam, & secundæ ad tertiam; erit etiam utrobique eadem ratio primæ ad tertiam, & hoc est argumentari ex aequalitate ordinata. Si vero fuerit ex una parte prima quantitas ad secundam ut secunda ad tertiam ex alia, & contra; argumentabimur ex aequalitate perturbata si inferamus eandem esse utrobique rationem primæ ad tertiam. Exempla pro ratione arithmeticæ sunt in AD & AE, demonstratio autem pendet ex eo quod ultimæ rationes ex precedentibus aequalibus componantur.

22. Hinc etiam intelligitur cur Euclides rationem compositam definiens ex duabus $a:b$, $c:d$, fieri jubeat ut antecedens secundæ c ad suum consequentem d , ita consequentem primæ b ad novam quantitatem e , ut sit $a:e$ ratio ex duabus prædictis composita. Id inquam, intelligitur ex nostra etiam definitione, nam ratio $a:e$ componitur ex rationibus $a:b$; $b:e$; quare cum sit $b:e \equiv c:d$, erit ratio $a:e$ composita ex rationibus $a:b$, $c:d$.

23. Ratio inversa, seu reciproca dicitur, quam habet consequens ad suum antecedentem. Sic ratio inversa 3 ad 6 est ratio dupla, eadem scilicet, quam habent 6 ad 3.

24. Fractiones sunt in ratione composita ex directa numeratorum, & reciproca denominatorum. Exemplum numericum habes in AF, & ibidem ostenditar universim in litteris, revocando fractiones ad eundem denominatorem.

25. Ratio ex duabus aequalibus composita dicitur duplicata, ex tribus triplicata, ex quatuor quadruplicata, & sic deinceps.

26. Hinc ratio Geometrica, quam habet quadratum unius quantitatis ad quadratum alterius est ejus duplicata, quam habent ipsæ quantitates ad invicem, ratio cuborum triplicata, & sic aliarum potentiarum rationes

æque multiplices sunt, & dicuntur rationis, quam habent inter se radices, quot habent potentiarum exponentes unitates. Et contra ratiō quā habent inter se radices quadratæ, cubicæ, quartæ &c. dicitur subduplicata, subtriplicata, subquadruplicata &c. rationis potentiarum correspondentia: at ratiō quæ intercedit inter radices quadratas cuborum, hoc est ratiō $a^{\frac{3}{2}}$ & $b^{\frac{3}{2}}$, dicitur sesquiplicata, cum sint $\frac{3}{2} \equiv 1 + \frac{1}{2}$.

27. Facile intelligitur in omni progressionē sive geometrica, sive arithmeticā primum terminū ad tertium habere rationem duplicatam primi ad secundū, primum ad quartū habere rationem triplicatam; & sic deinceps: nam eae rationes compontuntur ex omnibus intermediis, quæ æquales sunt inter se. Euclides definit rationem ejus duplicatam, quām duæ quantitates habent inter se, illam quæ intercedit inter primum terminū & tertium proportionalem post primum & secundū: triplicatam quæ intercedit inter primum & quartū, & sic de reliquis, quod cum nostra definitione coincidere nemo non videt.

28. Si duæ sint variabiles quantitates ita connexæ inter se, ut si una dupla, tripla, vel utcumque multiplex evadat, altera etiam æque multiplex fiat; dicitur esse prima in ratione directa simplici alterius: Sic in motu uniformi spatiū est in ratione simplici directa temporis. At si prima in eadem ratione decrescit, in qua altera augetur, tunc illa esse dicitur in ratione inversa, sive reciproca istius. Sic ubi res aliqua in partes æquales dividitur divisionibus diversis, magnitudo partium est in ratione inversa numeri ipsarum partium. Quod si istæ duæ variabiles quantitates ita sint invicem connexæ, ut altera crescat in eadem ratione qua primæ quadratum, aut cubus, aut potentia quarta &c. tunc illa, esse dicetur in hujus ratione duplicata, triplicata, quadruplicata &c. Sic in sphæris superficies sunt in ratione duplicata radiorum, moles vero in ratione triplicata.

cata eorumdem. At si in eadem ratione decrescit, quia crescent primæ quadrata vel cubi, dicetur esse in ratione hujus reciproca duplicata aut triplicata. Sic gravitas Newtonianæ est in ratione reciproca duplicata distantiæ; quia decrescit in eadem ratione, qua distantiarum quadrata augeritur. Dicitur demum una quantitas esse in ratione composita plurium quantitatum, quando crescit in eadem ratione, qua productum ex his quantitatibus. Sic in diversis motibus uniformibus spatiū est in ratione composita celeritatis; & temporis. Porro componuntur hæ rationes ex directis, & reciprocis, sive simplicibus, sive duplicatis, triplicatis, subduplicatis &c.

29. In quantitatibus variabilibus ratio inversa, qua una ad alteram refertur bene etiam exprimitur per hoc quod una esse dicatur directe ut unitas, sive constans quælibet quantitas, per alteram variabilem divisa; nam fractio quæ inde emergit tanto minor est, quo major est ille divisor. Sic ubi spatiū diversis celeritatibus percurritur, tempora sunt in ratione reciproca celeritatum; hoc est, ut unitas sive alia constans quantitas per easdem celeritates divisa, aut ad easdem applicata: quod loquendi genus satis est Geometris familiare ad hanc divisionem designatidam.

30. Hoc proportionis genus, quod inter quantitates variabiles intercedit, signo etiam æqualitatis exprimitur. Sic, si spatiū dicatur S , tempus T , velocitas C , erit $S \asymp CT$, hoc est, spatiū æquabitur velocitati in tempore ductæ. Nempe si fuerit aliud spatiū s , aliud tempus t , alia velocitas c , erit $S : s :: CT : ct$.

31. Hinc argumentamur utrinque multiplicando aut dividendo, tamquam si vera & propria æqualitas intercederet. Cum sit enim $S \asymp CT$, erit utrinque dividendo per $C \frac{S}{C} \asymp T$, hoc est, tempus in ratione composita ex directa spatii S , & reciproca velocitatis C . Quod autem ita se res habere debeat patet ex eo, quia cum sit $S : s :: CT : ct$, si primus & tertius terminus

dividatur per C, secundus & quartus per $\frac{c}{c}$, manebit rationum æqualitas (per num. 15.) eritque $\frac{s}{c} : \frac{s}{c} :: T : t$

32. Si quantitas quædam, quæ prius variabilis erat, constans evadat; poterit ejus loco unitas substitui, atque adeo auferri, si vel in fractionis denominatore erat, vel in numeratore cum aliis quantitatibus composita. Sic cum sit $S \equiv CT$, si duo motus æquabiles inter se comparentur, & eadem sit utrobique velocitas, erit $S \equiv T$, hoc est, spatia in ratione temporum directa: & rursus cum sit $T \equiv \frac{S}{C}$, si idem fuerit in duobus motibus spatium, erit $T \equiv \frac{1}{C}$, hoc est tempora in ratione reciproca velocitatum. Eodem pacto res agitur in aliis similibus casibus, in quibus hac methodo ex uno Theoremate alia quamplutina facillimè eruuntur. Facilis est demonstratio, cum enim $S : s :: CT : ct$, ubi C constans est, erit $C \equiv c$, quare dividendo terminos secundæ rationis per eamdem quantitatem manebit $S : s :: T : t$. Similiter cum sit $T : t :: \frac{S}{C} : \frac{s}{c}$, si fuerit $S \equiv s$, dividendo per hanc quantitatem tertium, ac quartum terminum, manebit $T : t :: \frac{1}{C} : \frac{1}{c}$, quoq[ue] piäm $\frac{S}{s} \equiv 1$ & $\frac{t}{c} \equiv 1$.

C A P U T III.

De Progressionibus, & Logarithmis.

I. PROGRESSIO vocatur, uti dictum est, terminorum series, qui in eadem continua proportione crescunt, vel decrescent. Est autem progressio arithmeticæ, vel geometricæ pro qualitate rationis, qua termini ad invicem referuntur. Geometricam habes in A, Arithmeti-

ARITHMETICA. 89

meticam in B. Et hæ quidem Progressiones crèscentes sunt; decrescentes vero in C, & D exhibentur.

$$\left(\begin{array}{l} A 1:2:4:8:16:32:64:128:256:512 \&c. \\ B 0:1:2:3:4:5:6:7:8:9 \&c. \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{l} C 4:2:1: \frac{1}{2}: \frac{1}{4}: \frac{1}{8}: \frac{1}{16}: \frac{1}{32}: \frac{1}{64} \&c. \\ D \frac{1}{2}:1:0: -1:-2:-3:-4:-5:-6 \&c. \end{array} \right)$$

2. Progressionis ratio ea est, quam habet primus terminus ad secundum, eadem est enim qua quilibet aliis terminis ad proxime sequentem refertur.

3. Si terminus quilibet refertur ad eum, qui secundus ab illo est, invenietur habere ad eumdem rationem progressionis duplicatam, si ad tertium triplicatam, & sic deinceps.

Patet ex eo quod rationes ejusmodi ex omnibus intermediis componuntur. Sic in A est 8 ad 32 in ratione duplicata 1 ad 2; & 8 ad 64 in eadem ratione triplicata, & sic de reliquis.

4. Igitur si in qualibet progressione, sumantur quantior termini; quorum priores duo eodem intervallo distent inter se, ac duo posteriores, erunt hi proportionales. Sic si sumatur in A secundus terminus 2, & quintus 16, itemque sextus 32, & nonius 256; erit 2. 16:2 32. 256. Nam harum rationum utraque æque multiplex est rationis in qua termini progrediuntur.

5. In progressione Geometrica terminorum differentiae erunt pariter in eadem continua ratione: & si in quadam terminorum serie fuerint differentiae terminis proportionales, erunt hi in progressione geometrica. Sic in 18, 6, 2, differentiae 12, 4 sunt ut 18 ad 6, in tripla nempe ratione, adeoque termini illi 18, 6, 2 sunt in progressione geometrica.

Dem. Sit $a, b :: b, c$. Erit (per num. 13 & 14 cap. 2.)

Convertendo $a \cdot b :: b \cdot b - c$. ergo alternando (per num. 12. ib.) erit $a \cdot b :: a - b \cdot b - c$. Sit jam $a \cdot b :: a - b \cdot b - c$; erit alternando $a \cdot a - b :: b \cdot b - c$; & convertendo $a \cdot b :: b \cdot c$.

6. In omni progressionē Geometrica termini crescunt, vel decrescent in infinitū, nec illa est finita quantitas ultra quam vel crescens non ascendet, vel non descendat decrescens: quin tamen hæc ad nihilum usquam perveniat.

Dem. Cum enim terminorum differentiæ sint ipsis terminis proportionales, his crescentibus illas quoque augeri necesse est. Sit jam quælibet data quantitas p , & differentia termini primi a secundo q . Erit proposito numerus aliquis m , in quem si ducatur q datam quantitatem excedet. Quod si igitur tot progressionis termini sumantur post primum, quot habet m unitates, erit postremus major quam p . Etenim quod quilibet terminus sequens antecedenti addet, erit plus quam q , & universa incrementa totidem terminorum quot sunt in m unitates, erunt plusquam mq , adeoque datam quantitatē p excedent, & progressio eamdem prætergredietur. Sit rursus quantitas r quantumvis exigua, dico progressionem Geometricam decrescentem infra illam demum descendere. Dicatur enim primus terminus a , & sumatur aliquis terminus p , qui sit ad a ut a ad r . Si progressio fiat crescens a termino a in eadem ratione, in qua decrescit, post aliquem terminorum numerum perveniet ad quemdam numerum u , qui major sit quam p . Sumatur jam in decrescente idem numerus terminorum, & sit t terminus, ad quem pervenitur: erit (per num. 4.) $t \cdot a :: a \cdot u$, est autem ex hypothesi $a \cdot r :: p \cdot a$, erit ergo perturbate (per num. 21. cap. 2.) $t \cdot r :: p \cdot u$; Et quia p minor est quam u , erit & t minor quam r , ex quo constat nullam esse finitam quantitatē infra quam series decrescens non descendat. Nec tamen ad nihilum perveniet, quia in serie crescente post quemlibet terminorum numerum ad finitam aliquam quantitatem u pervenietur, & post eundem terminorum numerum

rum in decrescente invenietur t qui sit ad a ut a ad u , nec esse poterit $t \leq 0$ cum sit $\leq aa: u$.

7. Progressio Arithmetica crescens ultra quamlibet positivam quantitatem ascendet, decrescens vero infra quamlibet negativam descendet, & in ejus terminis etiam o esse poterit.

Cum enim eadem quantitas continuò adjiciatur vel adiatur; limitem quemcumque vel positivum vel negativum prætergredi neceſſe eſt. Quod si terminos eſſe contingat differentiæ exactè multiplices; crescens aut decrescens series per o necessariò transibit, cum additio vel subtractio continua terminos deſtruat. Sic in D series per o transit, & ab o incipit in B. (pag. 111.)

8. Dato termino primo, ratione terminorum, & eorum numero, tam in geometrica progressionē, quam in arithmetica postremus inveniuntur.

Sit a terminus primus, & terminorum ratio in geometria ut 1 ad r , & numerus terminorum $m \neq 1$. Erit terminus secundus ar , tertius ar^2 , quartus ar^3 , ultimus ar^m . At in Arithmetica si primus terminus sit a , ratio vero ut o ad r , hoc eſt differentia terminorum r , & numerus terminorum $m \neq 1$, erit secundus $a + r$, tertius $a + 2r$, quartus $a + 3r$, & ultimus $a + m - 1 r$. Hinc duo hæc theorematā inferuntur. In progressionē geometrica ultimus terminus æquatur factō ex primo in exponentem rationis ad eam potestatem elevatum, quam exprimit numerus terminorum unitate multatus. At in progressionē arithmetica ultimus terminus æquatur summa ex primo, & differentia terminorum in eorumdem numerum ducta unitate multatum. Sic in A (pag. 55) terminus quintus ita inveniuntur: $a = 1$, $r = 2$, $m = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5$, $m = 4$, ergo quintus $ar^m = 1 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16$. At in B $a = 0$, $r = 1$, $m = 4$, unde terminus quintus $a + rm = 4$.

9. In progressionē Geometrica eſt differentia primi a secundo ad differentiam primi ab ultimo, ut primus ad totam seriem dēmpto ultimo.

ELEMENTA

$$\begin{array}{l} a \cdot b \\ b \cdot c \\ c \cdot d \\ d \cdot e \\ e \cdot f \\ f \cdot g \\ \hline M \cdot N \end{array}$$

Sint enim a, b, c &c. seriei termini, quorum postremus g : Distribuantur in duas columnas, quarum alterius summa sit M ; alterius N ; ita ut prima contineat omnes terminos praeter ultimum, & secunda omnes praeter primum. Cum quilibet terminus columnæ M ad quemlibet columnæ N sit in eadem ratione, erit pariter in eadem ratione summa omnium primæ ad summam omnium secundæ: siquidem proportionales quantitates proportionalibus additæ rationem non mutant, quod facile ostenditur. Erit igitur $a \cdot b :: M \cdot N$, & convertendo $a : a - b :: M - M$. $M - N$, aut invertendo $a - b : a :: M - N : M$. Sed $M - N$ est differentia primæ columnæ a secunda, hoc est, differentia $a - g$; cum reliqui termini communes sint, ergo $M - N :: a - g$; & $a - b : a :: a - g$. M : sive alternando $a - g : M :: a - b : a - g$. M . Quod erat dem.

Itaque ut in A (p. 45.) habeatur summa priorum quinque terminorum, fiat ut 1 (differentia primi a secundo) ad 31 (differentiam primi a sexto), ita 1 (terminus primus) ad summam quæsitam, quæ erit 31.

10. Si progressio decrescit in infinitum ultimo contemptu termino, qui pariter in infinitum decrescens prorsus evanescit, habebitur tota series; si fiat ut differentia primi a secundo ad primum, ita primum ad omnium summam. Sic progressio, $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \&c.$ in unam summam collecta invenietur $\frac{1}{1}, \&$ hæc alia $\frac{1}{1} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \frac{1}{256} + \frac{1}{1024} + \dots$. Unde si quis unum deberet, & primo anno solveret $\frac{1}{2}$, secundo $\frac{1}{4}$, & sic deinceps; post infinitas solutiones totum debitum solveret. At qui deberet 2, & primo anno sol-

vetet

veret 1, secundo $\frac{1}{4}$; tertio $\frac{1}{16}$, & sic deinceps; post infinitas solutiones adhuc aliquid deberet.

11. In progressionē Arithmeticā dimidium summæ termini primi & ultimi in numerum terminorum ductum dat totam seriem.

Cum enim sit primus ad secundum ut penultimus ad ultimum, summa primi & ultimi eadem erit, quæ secundi & penultiimi, & sic de cæteris, cum omnia ejusmodi binariae camdem habeant summam. Cum igitur tot sit binaria quo habet terminos dimidia series, manifestum est summam termini primi & ultimi in dimidium numerum terminorum totam seriem colligere. Sic in B (pag. 15!) summa priorum sex terminorum, quorum primus est 0, postremus 5, erit $(0 + 5) \times 6 : 2 = 30 : 2 = 15$.

12. Hæc si conferas cum his quæ dicta sunt in n. 8. facile intelliges summam omnium numerorum in serie naturali ab unitate progradientium usque ad numerum quemdam x inclusive fore $(xx - x) : 2$; & summam omnium imparium pariter ab unitate, existente terminorum numero x , fore x^2 . Sic omnium numerorum summa usque ad 6 inclusive est $(36 - 6) : 2 = 21$. & summa sex priorum imparium $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36$. Similiter si sumas quemdam numerum x numerorum parium in serie naturali a 2 progradientium, invenies hanc fore $xx - x$. Sic summa priorum quinque numerorum parium $2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 25 + 5 = 30$.

13. Si sint duæ progressiones, quarum altera Geometrica sit, altera arithmeticæ, & sub singulis primæ terminis singuli secundæ notentur, undecumque initium fiat, hi dicuntur illorum Logarithmi. Sic termini progressionis F sunt logarithmî progressionis E, singuli singulorum sibi imminentium: 6 est logarithmus 2, & 16 est Log. 64.

$$E \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. \&c.$$

$$F \cdots 4 \cdots 2. 0. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. \&c. \quad 14.$$

14. Logarithmi multipliciter variari possunt. Integrum est enim cuivis duas quaslibet progressiones assumere, & alteram alteri affigere. Sed ad rem totam determinandam satis est duos geometricæ progressionis terminos cum suis Logarithmis constituere. Sic ubi semel decreveris 4 & 6 esse Log. 1 & 2, reliqui Logarithmi constituti sunt.

15. Utcumque fuerit constituta progressio geometrica cum suis Logarithmis, utramque seriem licebit interjectis quotcumque terminis augere. Si quidem inter duos quoslibet Geometricæ terminos medium geometricè proportionale, & inter duos eorum Logarithmos medium arithmeticè proportionale constituas. Sic inter 2 & 4 medium proportionale est $\sqrt{2 \times 4} = \sqrt{8} = 2.829$ &c. cuius Log. est $(6 \frac{1}{4})$: 2 = 7. Et eadem methodo semper inveniri poterunt infiniti alii Logarithmi numerorum, qui vel integri sint, vel ex integris & fractis compositi, medios terminos inter duos proximos semper inquirendo. Porro geometricæ progressionis termini dicuntur sine ullo addito numeri, termini vero arithmeticæ Logarithmi.

16. Utumque fuerint Logarithmi constituti, semper verum erit hoc generale Theorema, quod si e progressionē Geometrica quatuor sumantur termini, qui sint inter se geometricè proportionales, erunt eorum Logarithmi in proportione arithmeticā. Erunt enim illi ita in serie dispositi, ut priores duo æque distent inter se, ut duo posteriores: quod idem cum Logarithmis contingat, erunt etiam hi arithmeticè proportionales.

17. Igitur quæcumque fuerit Logarithmorum constitutio, in regula trium satis erit secundi & tertii termini Logarithmos addere, & ab ea summa Logarithmum primi subtrahere ut habeatur Logarithmus quarti; cum enim sint geometricè proportionales numeri, quorum tres dantur & unus inquiritur, erunt eorum Logarithmi arithmeticè proportionales; quare summa primi & ultimi æqualis erit summa secundi & tertii, adeoque habebi-

bebitur quartus, si ab horum summa primum subducas.

18. Logarithmi designantur prafigendo quantitati litteram L, vel Log. quod frequentius usurpatur. Itaque Log. a denotat Logarithmum numeri a. Quod si his notis utar, clarius etiam intelliges quod dicebamus; fore nempe Log. x = Log. b + Log. c - Log. a, si fuerit a. b :: c. x. Cum sint enim numerorum geometricè proportionalium Logarithmi arithmeticè proportionales, erit Log. a = Log. b = Log. c - Log. x; ergo Log. a + Log. x = Log. c - Log. b; adeoque Log. b + Log. c - Log. a = Log. x.

19. Forma Logarithmorum omnium commodissima est, in qua Logarithmus unitatis constituitur 0, & utraque progressio crescit. Sunt duæ hujusmodi progressiones G, & H.

$$G \frac{1}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 \&c.$$

$$H = 4, = 3, = 2, = 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 \&c.$$

20. In hac forma Logarithmorum in primis quilibet numerus erit aliqua potestas ejus, qui proximè sequitur unitatem; sic in nostro exemplo 4 est potestas secunda ipsius 2, 8 potestas ejusdem tertia, 16 potestas quarta &c. Erit enim 1. 2 :: 2. 4 = (2 X 2): 1, & 1. 2 :: 4. 8 = (2 X 2 X 2): 1, & sic deinceps.

21. Præterea si progressio arithmeticæ habeat post 0 unitatem, erunt Logarithmi hujusmodi potestatum exponentes. Sic 4 est Logarithmus 16, qui est quarta potestas ipsius 2. Id manifestè sequitur ex num. præcedenti.

22. In qualibet forma Logarithmorum, in quibus 0 sit Log. 1., locum habebunt hæc quatuor Theorematæ.

$$1^{\circ} \text{Log.}(pq) = \text{Log.}p + \text{Log.}q.$$

$$2^{\circ} \text{Log.}\frac{p}{q} = \text{Log.}p - \text{Log.}q.$$

$$3^{\circ} \text{Log. } p^m \equiv m \text{ Log. } p.$$

$$4^{\circ} \text{Log. } \sqrt[m]{p} \equiv \frac{1}{m} \text{ Log. } p.$$

Horum theorematum sensus; ac vis est quæ sequitur.

23. Denotat primum æquari Logarithmum facti Logarithmis coefficientium simul sumptis. Sic quia $2 \times 8 \equiv 16$, hujus numeri Logarithmus in progressionē H æqualis est $1 + \frac{1}{2}$, qui sunt Logarithmi numerorum 2 & 8. Facilis est demonstratio. Est enim $1 : p :: q : pq$. Ergo $\text{Log. } 1 + \frac{1}{2} \text{ Log. } (pq) \equiv \text{Log. } p + \text{Log. } q$. (per num. 18.), sed $\text{Log. } 1 \equiv 0$, ex hypothesi; ergo $\text{Log. } (pq) \equiv \text{Log. } p + \text{Log. } q$.

24. Secundi theorematis sensus est: Logarithmum quoti æquari Logarithmo divisi, dempto Logarithmo divisoris. Sic quoniam $64 : 16 \equiv 4$ erit $\text{Log. } 4 \equiv \text{Log. } 64 - \text{Log. } 16 \equiv 6 - 4 \equiv 2$. Etenim cum sit per regulam trium $q : 1 :: p : pq$, erit $\text{Log. } q + \text{Log. } (p : q) \equiv \text{Log. } 1 + \text{Log. } p$, & delendo $\text{Log. } 1$, qui in nostro casu est $\equiv 0$, & auferendo utrinque $\text{Log. } q$, erit $\text{Log. } (p : q) \equiv \text{Log. } p - \text{Log. } q$.

25. Tertium theorema est: Logarithmum potestatis cuiuslibet numeri obtineri multiplicando per exponentem potestatis ipsius numeri Logarithmum. Sic si elevare velis numerum 4 ad tertiam potestatem, & hujus potestatis Logarithmum queras, obtinebis ducendo $\text{Log. } 4$ in 3. Nempe $\text{Log. } 4 \equiv 2$, & $2 \times 3 \equiv 6$, qui est $\text{Log. } 64$; est autem 64 potestas tertia ipsius 4. Etenim potestates oriuntur ducendo numerum in se ipsum, quare hujus Logarithmus continuo sibi ipse adjicitur, ut novæ potestatis Logarithmus habeatur. Sic $a^2 \equiv a \times a$, ac propter ea $\text{Log. } a^2 \equiv \text{Log. } a + \text{Log. } a \equiv 2 \text{ Log. } a$, eodemque modo $a^3 \equiv a \times a \times a$, & $\text{Log. } a^3 \equiv \text{Log. } a + \text{Log. } a + \text{Log. } a \equiv 3 \text{ Log. } a$.

26. Quartum theorema est: Logarithmum radicis alijus numeri haberi, si ejus Logarithmus per exponentem.

tem radicis dividatur. Sic Log. $\sqrt[3]{64} \equiv 6:3$, hoc est Logarithmo 64 per 3 diviso, est autem quotus ex hac divisione emergens 2 Logarithmus ipsius 4, qui radix tertia est numeri 64. Demonstratio facile intelligitur ex superiorum theorematum demonstratione.

27. Hinc factum est, ut numerorum radices ab Arithmeticis tamquam quædam ipsorum potestates per exponentes fractos designentur, ut eodem pacto illas pertrahere liceat, quo reliquæ numerorum potestates, quæ communiter hoc nomine designantur. Sic $\sqrt[3]{4}$ scribitur $4^{\frac{1}{3}}$, & $a^{\frac{m}{n}}$ denotat radicem cubicam quadrati ipsius a ; & $a^{\frac{m}{n}}$ denotat radicem n ipsius a . Patet igitur quantitates radicales, sive numeros surdos ordinis diversi ad eundem ordinem redigi, non aliter quam fractiones ad eundem denominatorem, id ipsum nempe efficiendo in eorum radicalium exponentibus fractis: quod ex num. 71. cap. I. in hunc locum rejecimus. Sic si oporteat invicem multiplicare \sqrt{a} & $\sqrt[n]{aa}$, cum id fieri nequeat, nisi prius ad eundem ordinem redigantur, scribe pro \sqrt{a} , $a^{\frac{1}{2}}$, & pro $\sqrt[n]{aa}$, $a^{\frac{2}{n}}$ & revocando exponentes ad eundem denominatorem habebis $a^{\frac{3}{6}}$, & $a^{\frac{4}{6}}$, sive $\sqrt[6]{a^3}$, & $\sqrt[6]{a^4}$, quorum factum est $\sqrt[6]{a^7}$, sive $a\sqrt[6]{a}$. Eadem ratione $\sqrt[2]{2} \equiv 2^{\frac{1}{2}}$ & $\sqrt[3]{6} \equiv 6^{\frac{1}{3}}$, quibus ad eundem ordinem redactis habebis $2^{\frac{3}{6}}$, & $6^{\frac{3}{6}}$, sive $\sqrt[6]{8}$, & $\sqrt[6]{36}$, quarum factum est $\sqrt[6]{388}$.

28. Si numerorum omnium Logarithmi haberri possent, supputandi rationem commodissimam haberemus. Multiplicatio enim additione perficeretur, divisio subtractione, & qualibet dati numeri potestas, vel radix multiplicatione aut divisione ejus Logarithmi inve-

niretur. Nunc autem cum omnes accurate haberi non possint, obtinentur quantum libuerit veris proximi continuā mediorum proportionalium inquisitione: Sic multorum anniorū labore supputati sunt Logarithmi pro omnibus numeris usque ad 100000. Sed hi sunt alterius cuiusdam formæ; de qua mox dicemus.

29. In hac Logarithmorum forma; in qua unitati respondet 0; integri numeri Logarithmos habebunt positivos; fracti negativos, ut facile apparet in H, ex quo constat hoc theorema. Dato Logarithmo negativo, ut ejus numerus habeatur satis erit unitatem accipere per numerum divisam; cui idem Logarithmus si positivus esset responderet. Nemipe si fuerit $a = \text{Log. } b$, et it $-a = \text{Log. } \frac{1}{b}$; etenim $\text{Log. } \frac{1}{b} = \text{Log. } 1 - \text{Log. } b = -\text{Log. } b$. Sic -3 est $\text{Log. } \frac{1}{8}$, quia 3 est $\text{Log. } 8$:

30. Præterea si plures fuerint Logarithmorum series utcumque constitutæ, dummodo in omnibus $\text{Log. } 1$ sit 0, erunt cujuslibet numeri logarithmi inter se, ut logarithmi cujaslibet alterius. Nam si ex. gr. $\text{Log. } 2$. fuisset constitutus pro 1 quilibet alias numerus, cum numerorum sequentium Logarithmi æquabiliter crescant, tanto majores cmines reliqui obvenissent, quanto major primus assumptus esset:

31. Forma Logarithmorum commodissima, quæ nunc usurpatur est ea, in qua geometrica progressio in ratione decupla est 1; 10, 100, 1000 &c. Arithmetica vero 0, 1, 2, 3 &c. quamvis, ad habendos Logarithmos pro numeris intermediis, integris numeris decimales fractiones adjectæ sint, ut Logarithmi evadereint 0. 0000 &c. 1. 0000 &c. 2. 0000 &c. Incredibili labore inventi sunt veris quam proximi Logarithmi numerorum, qui medii sunt inter 1 & 10, inter 10 & 100. &c. inquirendo medios proportionales veris quam proximos, & eorum Logarithmos. Sic ut haberetur $\text{Log. } 9$ quæsitus est medium proportionalis inter 1 & 10, sive inter 1, 000000, & 10. 000000, extrahendo ex

10. o &c. radicem quadratam veræ proximam 3. 1622777,
cujus Logarithmus est dimidiüs Log. 10. Es iste quidem
numerus major est aliquanto quam 3; sed adhuc longè
distat a 9. Itaque inter eum & 10. o &c. iterum quæ-
situs est medius proportionalis extrahendo radicem nu-
meri, qui oritur ducendo 10. oo &c. in 3. 16 &c. &
inverita est radix veræ quam proxima 5. 6234132.
Hic numerus paulo major est quam 5; & ejus Loga-
rithmus habetur si summa Logarithmorum 10. oo &c.
& 3. 16 &c. bifariam dividatur. Sic continua inqui-
sitione mediorum proportionalium intor duos numeros
qui sint proximè majores vel minores quam 9, deveni-
tur tandem ad numerum qui ne una quidem millione-
sima differat à 9; ejusque Logarithmus numero 9 at-
tribuitur. Hoc artificio supputatæ sunt tabulæ Logarit-
hmorum præ numeris naturalibus ab 1 usque ad 100000,
sed hæ majoris formæ volumen implent: In libellis,
qui vulgo solent circumferri, producuntur tabulæ usque
ad 10000. Nos ad calcem Trigonometriæ post tabulas
sinuum Logarithmos adjecimus ab 1 ad 1000, ne vo-
luminis moles augeretur, & quod hi ad instituti nostri
rationem satis essent.

32. Cœterum in tabulis supputandis non necesse est
eam, quam innuimus, methodum adhibere; nisi in nu-
meris primis. Nam in his, qui ex aliorum multiplicati-
one oriuntur, satis erit Logarithmos coefficientium ad-
dere, ut habeatur Logarithmus facti: Sic Log. 15 =
Log. 3 + Log. 5 & Log. 27 = Log. 3 + Log. 9.

33. In hac Logarithmorum forma Log. numerorum
ab 0 ad 10 habebunt o cum aliquot decimalibus adjun-
ctis. Sic invenietur in tabulis Log. 3 = 0.4771213.
At qui sequuntur a 10 usque ad 100 habebunt unitatē
decimalibus auctam, & ita porrò. Sic Log. 15 = 1.
17609 13. Log. 171. = 2.2329961. Numerus ille inte-
ger decimalibus præfixus dicitur Logarithmi characteristi-
ca, & hoc habetur Theorema. Omnis quantitas, que
designatur unitate, & quolibet cyphrarum numero, ha-
bet in Logarithmi characteristica tot unitates meritis cy-
phris

phris præfixas, per ipsa cyphras. Sic Log. 1000000 = 6. 000000. Quilibet aliis numerus tot habet procharacteristica unitates decimalibus præfixas, quot ipse notis constat una dempta. Sic Log. 897 = 2. 9527924.

34. Igitur ubi semel Logarithmi characteristica innotuerit, jam sciri potest quo notis ejus numerus constabit: id quod multoties percommode accidit. Sic si scire velles ad quam perveniet quantitatem qui unitatem continuò duplacet per 64 vices, dicens nempe 1, 2, 4, 8 &c. satis erit notare eum esse perventurum ad sexagesimam tertiam potestatem binarii, quare ejus numeri Logarithmus æqualis erit 63 X Log. 2, seu 18. 9648900. Jam vero si Logarithmus haberet post integras notas metas cyphras, constaret ejus numerus unitate & 18 cyphris, adeoque trillio esset: si vero haberet characteristica 19, quam meræ cyphræ subsequerentur, esset una Trillionum decas: cum igitur inventus Logarithmus inter hos duos medius sit, & quidem proprius accedens ad secundum, quam ad prium, et si nondum de ejus numero constet, habes tamen Trillione longe majorem esse, & ad denos Trilliones proxime accedere:

35. Cognita jam Logarithmorum natura, videndum superest quomodo dato numero ejus Logarithmus inventatur, vel contra; & quomodo tabulae ultra suos limites extendi possint. Quod ubi fecerimus alicujus problematis solutionem adjiciemus, quod sine Logarithmis esset ad solvendum difficillimum.

36. Si datus numerus integer est, eoque minor ad quem tabulae pertingunt, inventatur in ipsis tabulis Logarithmus numero appositus. Sic Log. 257. = 2. 4099331. Si fractionem adjunctam habeat, cape Logarithmum integrum, & ejus differentiam a Logarithmo proxime sequente. Tum dic: si numerus integer augeretur unitate, ejus Logarithmus augeretur inventa differentia; cum ergo augeatur datis partibus unitatis quanto major evadit ejus Logarithmus? id nempe invenies per regulam trium, & additum Logarithmo integrum dabit Logarithmum compositum ex integro & fractis. Sic si queratur

Log.

Log. 257. 325, proime ex tabulis Log. 258, & ex ea subtrahere Log. 257, invenies differentiam 16866. Tantum nempe crevit Logarithmus, ubi numerus augetur unitate; at in nostro casu augetur non quidem 325 unitatibus (quod probè notandum est) sed 325 millesimis partibus unitatis, unde ita ille numerus tractari debet, ut fractio habens denominatorem 1000. Fac igitur

I: 16866 ; : $\frac{325}{1000}$ ad quartum, quem minutis contemptis invenies 5481. Tantum nempe crevit Log. 257, ob additas numero fractiones datas, igitur Logarithmo 257 adde 5481, & habebis Log. 257. 325 = 2.4104812 quamproximè.

Etsi enim Logarithmorum differentiæ numerorum differentiis non sint proportionales, tamen ab ea proportione tam parum aberrant in differentiis exiguis, cujusmodi hæ sunt, ut pro talibus haberi possint sine ullo sensibilis erroris periculo. Quod si commodius sit integrum numerum per fractionis denominatorem multiplicare, ut tota quantitas simul collecta fractio spuria evadat, commodius etiam invenietur ejus Logarithmus subducendo Logarithmum denominatoris a Logarithmo numeratoris per n. 24. Sic si queratur Log. 9

$\frac{1}{3}$ cum ea quantitas commodè redigatur ad spuriam fractionem $\frac{28}{3}$, a Log. 29 aufer Log. 3, & habebis Log. 9 $\frac{1}{3} - \frac{28}{3} = 0.9700367$.

37. Quod si numerus datus sit vera fractio, erit Logarithmus denominatoris major quam numeratoris; quare hic ab illo subtrahendus, & præfigendum differentiæ signum negativum, ut habeatur Log. numeri unitate minoris negativus, juxta num. 29. Sic Log. $\frac{3}{25} =$ Lo. 3. — Log. 25 = 0.4771213 — 1.3979400 = — 0.9208187.

Quod si fractio sit decimalis notandum est in ea subaudiri denominatorem constantem unitate, ac totidem cyphris quot sunt in ipsa notæ, itaque hujus denominatoris Logarithmum subtrahere a Log. numeratoris, &

G signum

signum negativum differentiæ præfigens rem, ut supra, confeceris. Sic si queratur Log. o. 194 aufer Log. 194 a Log. 1000 (hic enim est denominator ejus fractionis) & habebis Log. o. 194 $\equiv -0.7121983$.

38. At si numerus detur major iis, qui in tabulis continentur, ejus Logarithmum vero proximum sic invenies. Ex numero dato tot notas puncto interjecto reseca, quot opus est, ut non plus valeat, quam qui in tabulis continentur. Tum ejus Log. inquires non aliter quam si ex integris & decimalibus constaret, ut factum est in num. 36. Logarithmi sic inventi characteristicam tot unitatibus auge, quot in dato numero notæ pro decimalibus sunt habitæ, & habebis Log. quæsumum. Quæratur exempli gr. Log. 257325. Punctum insere post 257, ut fiat 257.325. Ejus Log. invenies ut supra 2. 4104812; & quia tres notæ ab integro resectæ sunt, & pro decimalibus habitæ, adde 3 hujus characteristicæ, & habebis Log. 257325 $\equiv 5.4104812$. Operacionis ratio facile intelligitur, etenim dum integræ numeri notas aliquas ad ordinem decimalium deprimis, perinde facis, ut si illum divideres per numerum constantem unitate & totidem cyphris, quot sunt depeñatae notæ. Sic in nostro casu est 257.325 $\equiv 257325 : 1000$. Redibit autem numerus ad priorem quantitatem, si per eundem numerum illum multiplices, per quem divisus est, eritque 257.325 $\times 1000 \equiv 257325$; quare Log. 257325 \equiv Log. 257.325 $- 3 =$ Log. 1000 (per n. 23); sed Log. 1000 $\equiv 3.000000$, & in genere loquendo Log. numeri constantis unitate & meritis cyphris totidem unitates habet pro characteristica, quot numerus cyphras, ergo &c. Sic si daretur num. 25732.5, cum duas tantum ex integro notas ad decimales deprimere necesse sit; perinde erit ut si illum divideres per 100, quare invento Log. 257.325 ut antea, ejus characteristica duabus tantum unitatibus augenda esset, & habetur Log. 25732.5 $\equiv 4.4104812$.

39. Notandum tamen, quod si datus numerus ita numeros tabularum excedat, ut plusquam duplo plures notæ

notas habeat, Logarithmi hac methodo inventi non satis erunt accurati, cum proxima sit, non accurata, ea proportio, in qua regulæ trium usus innititur. Quare in his casibus satius est tabulas consulere, quæ ad numeros maiores pertingunt: aut, si numerus ex his componitur, qui habeantur in tabulis, coefficientium Logarithmos in unam sumimam colligere.

40. Et hactenus quidem dato numero ejus Logarithmus quæsusus est. Superest, ut dato Logarithmo numerus investigetur. Si Logarithmus datus in tabulis accuratus occurrat, numerum capies eidem appositum. Sic si detur 2.7371926, illum facile invenies, si duellum sequaris characteristicæ & notarum proximè sequentium numerus autem 546 eidem adscriptus, est ille qui quærebat. Quod si datus Logarithmus accuratus in tabulis non occurrat, & tamen habeat characteristicam, quæ in illis contineatur; duos invenire licebit, quorum alter sit proximè major dato, alter proximè minor. Utrumque ex tabulis deprime cum numeris sibi respondentibus, & ex proximè majori aufer proximè minorē, deinde hunc ipsum aufer a dato, & numero, qui proximè minori respondet adjice fractionem, cuius denominator sit prima illa differentia, numerator vero secunda, & sic habebis quæsumum numerum. Sic si proponatur Logarithmus 2.7375292, invenies in tabulis 2.7379873 proximè majorem, cui respondet numerus 547, & 2.7371926 proximè minorē, cui respondet 546. Aufer hunc & a proximè majori, & a dato Logarithmo, habebisque geminas differentias, 7947 & 3366, ex his fractionem compone adjiciendam numero 546, & habebis numerum quæsumum $546 \frac{3366}{7947}$. Operationibus ratio est, quia numerorum differentiae sunt differentiis Logarithmorum quamproxime proportionales. Igitur ut 7947 (quæ est differentia Log. in tabulis existentium) ad 1 (quæ est differentia numerorum illis respondentium) ita 3366 (differentia Log. proxime mino-

ris a dato) ad differentiam, qua numerus dato Log. respondens excedit minorem numerum 546.

41. Fractio inventa facile revocatur ad decimales numeros dividendo numeratorem quo opus fuerit cyphris auctum per denominatorem, & contemptis tenuioribus minutis, si quotus accuratus haberi nequit. Sic in nostro casu fractio evadet 0. 4235, & numerus Log. dato respondens 546. 4235.

42. Si dati Logarithmi characteristica tabularum canonem excedit, jam primum constabit quot notas quæsusit numerus habere debeat, totidem nempe, quot characteristica unitates, ac præterea unam. Ut autem inveniri possit ejus characteristica tot unitatibus multiplicanda est, quot opus fuerit, ut in tabulis possit inveniri. Logarithmus ita depresso inquiratur in canone & si accuratus occurrat, numerus ei respondens tot cyphris auctus, quot unitates e characteristica ademptæ sunt, erit quæsita quantitas. Quod si accuratus non invenerit sumatur proxime major, & minor, & exinde, ut supra factum est, querantur notæ decimales adjiciendæ numero, qui logarithmo proxime minori respondet. Curandum est autem, ut totidem saltem per divisionem eliciantur, quot unitates a characteristica dati Logarithmi ademptæ sunt. Nam si tot ejusmodi notæ integro illi numero adjectæ jam pro integris habeantur, habebitur simul quæsita quantitas. At si characteristica fuerit plus quam duplo major ea, quæ in tabulis maxima occurrit, inventus numerus in ultimis notis accuratus non prodiret hac methodo ob rationem in re simili supra adductam.

43. Ex. gr. detur Logarithmus 5. 7375292, & tabulis utatis his elementis adjectis. Multiplicanda erit characteristica 3 unitatibus, ut fiat 2. 7375292. Inventus est supra hujus Logarithmi numerus 546. 4235. Tres ex his decimalibus notis ad integros redigantur, eritque quæsusit numerus 546423. 5. Si datus Logarithmus fuisset 4. 7375292, numerus ei responderet 54642. 352. Si 3. 7375292; 5464. 235. Ac demum si datus Logarithm.

A R I T H M E T I C A E. 101

Rithmus idem fuisset accurate ac Log. 546, fuisset quæ sita quantitas 546000, & sic de reliquis. Operationis ratio facile intelligitur, nam duim dati Logarithmi characteristicam aliquot unitatibus immiuimus, perinde facimus ut si numerum ei respondentem per numerum divideremus unitate & totidem cyphris expressum quo sunt e characteristica sublatae unitates. Quantitas igitur huic depresso Logarithmo respondens in eundem numerum ducenda est, ut illa habeatur, quæ dato Logarithmo respondet.

44. Si Logarithmus datus fuerit negativus, queratur positivi numerus, & hic unitati subscriptus fractionem dabit, quæ illi respondeat. Sic si detur $\neg 2.7371926$, cum ei respondeat 546, erit quæ sita quantitas $\frac{1}{546}$

45. Artificii hactenus expositi utilitatem ruriquam sat Tyrone intelligent, nisi ubi se cœperint in Trigonometria exercete. Sed tamen vel ex hoc uno problema poterunt ex parte conjicere. Fœnori det aliquis deha aureorum millia, ita ut 100 aureorum annuus fructus tres aurei sint. Quæritur quot anni requirantur ut fors cum suis fructibus, & fructuum quotannis crescentium fructibus ad 40 aureorum millia perveniat. Dicatur 100 $\equiv a$, 103 $\equiv b$, 10000 $\equiv c$, 40000 $\equiv d$, numerus annorum quæsitus $\equiv x$. Erit in fine anni primi $a \cdot b :: c$.

$\frac{bc}{a}$. Ineunte anno secundo fors est $\frac{bc}{a}$, & si fiat iterum a .

$b :: \frac{bc}{a} \cdot \frac{b^2 c}{a^2}$, hæc erit fors in eiente anno tertio, unde in ejus fine $a \cdot b :: \frac{b^2 c}{a^2} \cdot \frac{b^3 c}{a^3}$. Constat igitur, quod in fine annorum x , erit fors $\frac{b^x c}{a^x}$, & ex hypothesi esse debet $\frac{b^x c}{a^x} \equiv d$. Igitur (per n. 24. 25.) $x \log. b + \log.$

$c - x \log. a \equiv \log. d$; & auferendo utrinque $\log. c$, erit $x \log. b - x \log. a \equiv \log. d - \log. c$, ac de-

$\frac{\text{Log. } d - \text{Log. } c}{\text{Log. } b - \text{Log. } a}$. Substitue datos valores literis, & habebis $x = \frac{\text{Log. } 40000 - \text{Log. } 10000}{\text{Log. } 100 - \text{Log. } 100}$

40000 habetur, si colligas in unam summam Logarithmos 40, & 1000, qui sunt ejus coefficientes; & Log. 10000. si Log. 1000 unitate augeas in characteristicā. Sic eritis ex tabulis Logarithmis, habebis $x = \frac{4.6020600 - 4.0000000}{0.6020600} = 46.8. \&c.$

$$2.0128372 - 2.0000000 = 0.0128372$$

Itaque anni requiruntur 46, 9 menses, ac præterea aliquot dies, & unius diei partes in hujusmodi re contemnendæ, ut sors ad datam quantitatē eo fœnore augeatur.

46. Et hæc de progressionibus & Logarithmis satis dicta sint. Superest, ut aliquid etiam dicatur de proportione Harmonica.

C A P U T IV.

De proportione Harmonica.

1. SI tres fuerint ejusmodi numeri, ut sit primus ad tertium in eadem proportione geometrica, in qua est differentia primi & secundi ad differentiam secundi & tertii, hi numeri dicuntur harmonicè proportionales. Sic 2. 3. 6. sunt harmonicè proportionales, quia $2.6 :: 3 - 2 = 1.6 - 3 = 3$.

2. Si fuerint tres numeri harmonicè proportionales, factum ex medio in summam extreñorum, æquale est duplo producto ex ipsis extremis. Sic in adducto exemplo $(2 - 1 - 6) \times 3 = 2 \times (2 \times 6) = 24$. Facile demonstratur, quia si fuerint a, b, c harmonicè proportionales, erit $a. c :: a - b. b - c$. Ergo multiplicando extreñas & medias quantitates, erit $ab - ac = ac - cb$, & ad-

& addendo utrinque ac $\frac{1}{a+b}$ cberit $ab+cb \leq 2ac$; hoc est $(a+c)Xb \leq 2ac$.

3. Hinc datis extremis terminis medius invenitur, si fiat ut summa extreborum ad eorum alterum, ita duplum alterius ad quæsitum. Sic $2+6.2::2X6.3$, hoc est $8.2::12.3$. Ratio est manifesta, erit enim $a+\frac{c}{a}::2c.b$.

$a+c.a::a$

4. Dato quoque extreborum altero una cum medio alter extreus invenietur, si fiat ut differentia dupli extrebi dati a medio ad ipsum extreum datum, ita medius ad quæsitum. Sic $2X2-3.2::3.6$. Cum sit enim $ab-\frac{1}{a+b}cb \leq 2ac$, si utrinque auferatur cb , habebitur $ab \leq 2ac - cb$, hoc est $2a - b. a :: b.c$.

5. Idem facilius obtinebitur opere alterius Theorematis vi cuius harmonica proportio ad continuam arithmeticam redigitur. Proportio nempe harmonica est inversa ratio continuæ arithmeticæ, & contra. Hoc est si fuerint a, b, c harmonicè proportionales, erunt $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c}$ in continua arithmeticæ ratione, & contra. Sic in exemplo aducto $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : : \frac{1}{3} : \frac{1}{6}$, hoc est, reducendo fractiones ad eundem denominatorem $\frac{3}{6} : \frac{2}{6} : : \frac{2}{6} : \frac{1}{6}$ & rursus cum sint, 2, 4, 6 in continua ratione arithmeticæ, erunt $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}$ harmonicè proportionales, cum sint $\frac{1}{2} : \frac{1}{6} : : \frac{1}{2} : \frac{1}{4} : : \frac{1}{4} : \frac{1}{6}$, sive $\frac{6}{12} : \frac{2}{12} : : \frac{6}{12} : \frac{3}{12} : : \frac{3}{12} : \frac{1}{12}$, hoc est $\frac{6}{12} : \frac{2}{12} : : \frac{3}{12} : \frac{1}{12}$. Facilis est demonstratio, cum sit enim primus terminus a , tertius c , erit medius $b = \frac{2ac}{a+c}$, ergo si per tres ejusmodi terminos unitas dividatur habebitur $\frac{1}{a} : \frac{a+c}{2ac} : \frac{1}{c}$, ubi si addantur extrebi termini $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{c}{ac} + \frac{a}{ac} = \frac{a+c}{ac}$, quantitas habetur dupla ipsius $\frac{a+c}{2ac}$. Ergo tres

Illi termini sunt arithmeticè proportionales:

6. Quod si tres fuerint ejusmodi quantitates, in quibus differentia primæ & secundæ ad differentiam secundæ & tertiaræ sit ut tertia ad primam: dicentur esse hæc quantitates in proportionē Contraharmonica. Si erunt contraharmonicè proportionales a, b, c , si fuerit $a - b : b - c :: c : a$. Facile ad hanc proportionem transferuntur quæcumque de Harmonica dicta sunt.



ELEMENTA SOLIDORUM.

1. **Q**Uædam; quæ admodum facile sine demon-
strationibus intelliguntur, præmittemus, ut per
se nota.

2. *Axioma 1.* Recta linea vel cum plano tota con-
gruit, vel ipsi parallela est, quo casu æquidistant tota,
vel ex altera parte ab ipso recedit, ex altera accedit,
quo casu, si satis producatur, ipsum in unico puncto
secabit.

Coroll. 1.

3. Si bina rectæ puncta cum plano quodam congru-
unt, congruit tota.

Coroll. 2.

4. Ejusdem rectæ pars in quodam plano, pars extra
ipsum esse non potest.

Coroll. 3.

5. Binorum planorum intersectio est linea recta, cum
recta ducta per bina quævis intersectionis puncta de-
beat jacere in utroque, per num. 3.

6. *Ax. 2.* Per quotvis puncta in directum jacentia,
sive per quævis rectam lineam infinita numero plana
duci possunt.

7. *Ax. 3.* Per binas rectas sive concutentes in ali-
quo puncto, sive parallelas inter se, ac per tria pun-
cta non in directum jacentia, vel per tria cujusvis tri-
anguli rectilinei latera planum semper duci potest}, id-
que unicum.

8. *Ax. 4.* Bina plana vel parallela sunt, & semper
æquidistant; vel ex una parte a se invicem recedunt,
ex altera accedunt, & ex eadem satis producta debent
se intersecare in recta quadam.

Coroll. 1.

9. Planorum inter se parallelorum intersectiones cum eodem plano sunt inter se parallelæ.

10. Cum enim plana illa parallela nusquam concur-
rant, illæ intersectiones nusquam concurrent.

Coroll. 2.

11. Binæ rectæ quæcumque GI, KM (Fig. 1.) a planis parallelis AB, CD, EF secantur in eadem ratione in H, & L.

12. Ducatur enim e punto K recta parallela GI, occurrentis planis CD, EF in N, O, & GK, HN, IO intersectiones planorum illorum parallelorum cum plano GHOI erunt parallelæ inter se (per num. 9.), ut & NL, OM intersectiones plani OKM cum iisdem. Quare in parallelogrammis KGNH, HNOI erunt latera KN, NO æqualia lateribus GH, HI. Est autem ob LN, MO parallelas KL ad LM, ut KN ad NO (pr. 12. Geom.); erit igitur etiam ut GH ad HI.

13. *Definitio 1.* Recta piano perpendicularis dicitur, cum est perpendicularis rectis omnibus in eodem piano ductis per concursum ejus rectæ cum ipso piano.

Coroll. 1.

14. Binæ rectæ, ut AC, BC (Fig. 2.) eidem piano in eodem punto C ad eandem partem ductæ perpendicularares esse non possunt.

15. Si enim ducatur planum per ipsas, id occurret priori piano in quadrata recta DCE per num. 8. erit que tam angulus ACE, quam BCE rectus, nimirum totum æquale parti.

Coroll. 2.

16. Si bina plana fuerint eidem rectæ perpendicularia, erunt parallela inter se, & si binorum planorum parallelorum alteri perpendicularis sit quædam recta, erit & alteri.

17. Occurrat enim ea recta (Fig. 3.) binis iis planis in A, & B & ducta quavis recta CBD in posteriore, ducatur per hanc planum CDEF, cuius intersectio cum priore sit EAF. Tum si AB est perpendicularis utrique piano,

plano; anguli ad A & B erunt recti, adeoque ipsæ AE, BD parallelæ (per cor. i. def. 7. Geom.). Quare nulla recta posterioris plani occurret plano priori, & proinde plana ipsa nusquam concurrent. Si autem plana fuerint parallela, & recta AB perpendicularis priori, erit BD parallela AE per num. 9, adeoque AB, quæ continet angulos rectos cum AE, continebit etiam cum BD, eritque idcirco perpendicularis ad omnes rectas posterioris plani transversentes per B, & proinde perpendicularis ipsi piano,

THEOREMA.

18. Si recta quædam AC (F. 4.) sit perpendicularis binis rectis BD, EF in quodam plano ductis per ejus concursum cum ipso piano, erit perpendicularis & reliquis omnibus, ac ipsi piano.

19. Ducatur enim quævis alia GCH, cui occurret alicubi in G recta occurrens binis datis hinc inde in B, E, captisque CD, CF æqualibus ipsis, CB, CE, ducatus FD, occurrens ipsi GH alicubi in H, tum considerentur septem paria triangulorum æqualium.

20. BCE, DCF ob angulos ad verticem C æquales, & latera CF, CD æqualia lateribus CB, CE per constructionem.

21. BCA, DCA ob angulos ad C rectos ex hypothesi, latera CB, CD æqualia per constructionem, & latus CA commune.

22. ECA, FCA pariter ob angulos ad C rectos, latera CE, CF æqualia, CA commune.

23. BAE, DAF ob latera singula singulis demonstrata æqualia, nimirum BE, FD num. 20., AB, AD, num. 21, AE, AF num. 22.

24. BCG, DCH ob angulos ad verticem C æquales, CBG, CDH demonstratos æquales num. 20., latera CB, CD æqualia per constructionem.

25. ABG, ADH ob latera AB, AD demonstrata æqualia num. 21, BG, DH num. 24, angulos ABG, ADH num. 23.

26. ACG, ACH ob latera CG, CH demonstrata æqualia num. 24, AG, AH num. 25, & CA commune.

27. Quare & anguli ACG, ACH æqualēs erunt, & recta AC cuivis GH, adeoque toti plano perpendicularis. Q. E. D.

Coroll. 1.

28. Si e quodam punto C. (F. 5.) cuiusdam rectæ AC exeant tres rectæ CB, CD, CE ipsi perpendiculares, in eodem erunt plano.

29. Si enim ducto plano EH per binas CE, CD, tertia CB in eo plano non jaceat, ducto plano GC per ACB, quod priori occurret in aliqua recta CF; recta AC perpendicularis binis CD, CE erit perpendicularis & ipsi CF. Quare angulus ACF rectus erit, & æqualis recto AEB, pars toti.

Coroll. 2.

30. Si recta CA (F. 6.) semper perpendicularis rectæ cuidam MN gyret circa ipsam immotam, producit planum ipsi perpendicularare.

31. Si enim ductis in ea superficie genita binis rectis ex C, ducatur quævis tertia, ea erit in eodem plano cum ipsis, cum nimis omnes tres eidem MGN perpendicularares esse debeant.

Coroll. 3.

32. Per datum quodvis punctum potest duci planum perpendicularare datæ cuivis rectæ MN.

33. Sit primo punctum datum C (Fig. 7.) in ipsa recta, & ductis per eam binis planis, MQ, MO dicantur in iis ipsi MN perpendicularares CA, CB, & planum per ACB ductum erit per num. 18. perpendicularare rectæ MN perpendicularari binis AC, BC.

34. Quod si punctum datum sit A extra ipsam, ducatur AC ipsi perpendicularis, tum in quovis alio piano MQ per MN ducto, & non transente per A recta CB perpendicularis eidem MN, & pariter erit factum.

Coroll. 4.

35. E binis rectis parallelis AB, CD (Fig. 8.) si altera sit perpendicularis piano cuiquam, erit & altera, & si amba fuerint perpendicularares, erunt parallelae.

36. In plano enim DA ducto per ipsas AB, CD, quod piano dato occurret in recta AC, ducatur CB ad quodvis punctum B in priore assumptum, tum in plano dato recta CE perpendicularis CA, & æqualis AB, ac ducantur rectæ AE, BE.

37. Triangula CAB, EGA habentia angulos ad C, & A rectos, latus AC commune, latera AB, CE æqualia, habebunt & bases CB, AE æquales. Quare in tri, angulis BAE, ECB singula latera singulis æqualia, ad consequē angulus BCE æqualis recto BAE (per prop. 4. Geom.). Cumque etiam ACE sit rectus, recta EC perpendicularis binis CA, CB erit perpendicularis etiam tertiaz CD per num. 18. Quare ipsa CD perpendicularis binis CA, CE erit pariter per num. 18. perpendicularis etiam toti plano dato ACEF.

38. Si autem ambæ fuerint perpendicularares, ducto piano BACD, erunt bini anguli BAC, ACD interni simul æquales duobus rectis, adeoque ipsæ parallelæ erunt. (per cor. 1. def. 7. Geom.)

Coroll. 5.

39. Rectæ FO, GQ (Fig. 7.) parallelæ eidem MN, licet non in eodem piano positæ, sunt parallelæ inter se.

40. Si enim per quodvis punctum D rectæ MN ducatur per num. 33. planum ACB ipsi perpendicularare, erit perpendicularis eidem tam FO, quam QG, per num. 35. Adeoque erunt inter se parallelæ per eund. num.

Coroll. 6.

41. Si binæ rectæ CD, CB (Fig. 9,) fuerint parallelæ, binis AE, AI etiam jacentibus non in eodem piano, continebunt angulos DCB, EAI ad easdem partes æquales.

42. Nam assumptis CB, CD ad arbitrium, tum AE, AI ipsis æqualibus, ducantur CA, DE, BI, & quoniam CB, AI sunt parallelæ, jacent in eodem piano per num. 7. Quare cum & æquales sint; etiam rectæ CA, EI, quæ illas claudunt, erunt & æquales & parallelæ,

parallelæ, & eodem argumento DE, CA parallelæ erunt, & æquales. Hinc & DB, EI, quæ illas claudunt, erunt æquales, & parallelæ. Igitur in triangulis DCB, EAI habentibus singula latera singulis æqualia, erunt anguli ad C & A æquales.

Coroll. 7.

43. Si bina plana IACB, EACD se invicem secantia in recta quadam AC secentur utcumque binis planis DCB, EAI parallelis inter se, anguli DCB, ~~EAI~~ ^{AI} ab intersectionibus contenti ad easdem partes erunt æquales.

44. Nam intersectiones CD, AE, & CB, AI singulorum planorum cum planis parallelis erunt inter se parallelæ per num. 9.

Coroll. 8.

45. Dato puncto vel extra datum planum, vel in ipso, poterit duci recta ipsi piano perpendicularis, eritque unica.

46. Si punctum sit A extra datum planum (Fig. 10.), ducta quavis recta MN in piano dato, ducatur ex A perpendicular AB in ipsam: tum BC eidem MN perpendicularis in piano dato, in quam ex A ducatur perpendicularis AC, quæ erit perpendicularis piano dato.

47. Nam in primis erit per num. 18. MN perpendicularis piano AIBC cum sit perpendicularis rectis BA, BC. Quare si ducatur recta DCE parallela MBN, erit & ipsa perpendicularis eidem piano per num. 35., adeoque etiam perpendicularis erit rectæ AC. Cumque ipsa AC sit etiam perpendicularis rectæ CB per constructionem, erit perpendicularis toti piano dato MNED per num. 18.

48. Quod si detur punctum B in ipso piano, assumatur punctum quocunque A extra ipsum, & ducatur perpendicularis AC. Tum in piano BCAI ex B recta BI parallela rectæ CA, quæ pariter erit eidem piano perpendicularis per num. 35.

49. Si autem essent binæ rectæ ut AB, AC eidem piano perpendiculares ex eodem punto A extra planum posito;

S O L I D O R U M .

117

posito; anguli ABC, ACB in eodem triangulo ABC essent recti, quod est absurdum. Unica igitur ex eodem puncto extra planum assumpto duci potest. Unicam verò duci posse e puncto positio intra planum patet ex num. 14.

Coroll. 9.

50. Per datum punctum, vel per datam rectam dato piano parallelam duci poterit planum piano ipsi parallelum.

51. Si enim datur punctum C (Fig. 9.), demissa CA perpendiculari in planum datum, ducantur in eo binæ AE, AI ad arbitrium, tum CB, CD iis parallelae, & planum DCB erit parallelum piano dato.

52. Erit enim CA perpendicularis rectis AE, AI per num. 13., adeoque & rectis CB, CD, nimirum per n. 18. piano DCB, quod idcirco erit parallelum piano EAI per num. 16.

53. Si autem datur linea parallela piano dato, assumpto in ea quovis puncto C, & ducto per C piano parallelo dato, debebit recta illa data jacere in hoc piano; si enim ex eo exiret, vel accederet ad planum datum, vel ab eo recederet.

Coroll. 10.

54. Si binæ rectæ CA, CB (Fig. 7.) coeuntes in quodam puncto C binis aliis DE, DH coeuntibus in D parallelae sint, nec in eodem piano jaceant, planum per ilias ductum erit parallelum piano ducto per has.

55. Nam e puncto C demisso perpendiculari CN in planum EI, in quo jacent DE, DH, ducantur NO, NQ parallelae ipsis DE, DH, quæ proinde erunt per n. 39. parallelae etiam ipsis CA, CB, erunt autem per num. 13. anguli CNQ, CNO recti. Quare & NCB, NCA recti erunt, & proinde planum ACB perpendiculari rectæ CN per n. 18, cui cum perpendiculari sit ONQ, erunt ea plana inter se parallela per num. 16.

56. *Def. 2.* Angulum binorum planorum se in quodam recta intersecantium dico, inclinationem plani ad planum, quam metitur angulus rectilineus contentus

ab

ab intersectionibus plani perpendicularis communis intersec-
tioni eorumdem planorum, qui si fuerit rectus, di-
co planum piano perpendicularare.

Coroll. 1.

57. Si in binis planis CI, AD (Fig. 9.) e quovis pun-
cto C mutuae intersectionis CA ducantur binæ re-
ctæ CB, CD perpendicularares ipsi intersectioni, angulus
stilineus DCB erit mensura inclinationis planorum.

58. Erit enim per num. 18 planum BCD perpendicularare
intersectioni CA perpendiculari ad binas CB, existentes in eo plano.

Coroll. 2.

59. Ad quamvis rectam cujusvis plani duci potest la-
num cum eo continens angulum aequalem dato.

60. Si enim sit recta CA plani DCAE, & ca-
tetur in eodem plano CD ipsi perpendicularis, tum in
planu perpendiculari ipsi rectæ CA recta CB continua-
ns angulum DCB aequalem dato, erit BCAI quæsumum pla-
num.

Coroll. 3.

61. Si planum piano insistit duos angulos efficit hinc
inde simul aequales duobus rectis, & si bina plana se
intersecant, angulos ad verticem oppositos aequales con-
tinent.

62. Id enim accidit in rectis omnibus, adeoque etiam
in illis, quæ sunt communis intersectiones eorum pla-
norum cum piano perpendiculari ad communem illorum
intersectionem.

Scholion.

63. Eodem pacto ubi planum incidit in bina plana
parallelâ, habebuntur in eorum angulis illa omnia,
quæ habentur in rectis lineis, ubi recta incidit in bi-
nas rectas parallelas.

Coroll. 4.

64. Planum transiens per rectam alteri piano perpen-
dicularem est ipsi perpendicularare.

65. Si enim recta AC (Fig. 10.) perpendicularis pla-
no

no EDMN, quod a plano ACBI per ipsam ductum sedetur in recta BC. Ducatur DE in plano DN perpendicularis ad BC, & quoniam ipsa BC est etiam perpendicularis rectæ CA, erit per num. 18. totum planum ACD ipsi perpendicularare; ac proinde angulus ACD erit mensura inclinationis planorum BD, CI per num. 56. qui cum sit rectus, erunt ea plana sibi invicem perpendicularia.

Coroll. 5.

66. Si bina planæ sibi invicem perpendicularia fuerint, recta uni ex iis perpendicularis per intersectionem ducta jacebit in altero, recta intersectioni perpendicularis ducta in altero erit alteri perpendicularis, recta alteri perpendicularis ducta ex quovis alterius punto jacebit in hoc posteriore, & in communem intersectionem cadet.

67. Sit enim primo communis intersectione BC, (Fig. 10.) & secentur illa plana piano perpendiculari ipsi intersectioni, cujus plani intersectiones cum illis planis sint CA, CD. Erit CA perpendicularis ad CB per num. 13, & angulus ACD inclinatio planorum pariter rectus per num. 56. Quare CA erit perpendicularis piano DN per num. 18, ac proinde e quovis punto intersectionis C educta recta ipsi piano DN perpendicularis debet per num. 14. congruere cum ipsa CA, jacente nimis in piano BA.

68. Pariter cum CA sit perpendicularis piano DN, & intersectioni BC, ac jaceat in piano BA; quævis recta intersectioni perpendicularis ducta in piano BA ex quovis punto A congruet cum CA, & proinde erit perpendicularis piano ND.

69. Demum recta ex quovis punto A plani BA perpendicularis piano DN debet per num. 45. congruere cum AC, adeoque jacere in piano BA.

Coroll. 6.

70. Planorum eidem piano perpendicularium intersectione est ipsi perpendicularis.

71. Nam recta ipsi piano perpendicularis educta ex

eo ipsius puncto, in quo se intersecant illa bina plana, debet jacere in utroque ex ipsis per num. 66; ac proinde debet congruere cum communi eorum intersectione.

Coroll. 7.

72. Per quodvis punctum, vel quamvis rectam plano perpendiculari infinita plana duci possunt eidem piano perpendicularia.

73. Nam per quodvis datum punctum duci potest recta AC (Fig. 10.) perpendicularis dato piano per n.45, in quo duci poterunt ex ejus punto C infinitae rectae CB, & omnia plana ACBI transibunt per punctum datum, ac per rectam AC, & erunt perpendicularia piano dato per num. 64.

Coroll. 8.

74. Per bina puncta non jacentia in recta piano perpendiculari, vel per rectam ipsi non perpendiculari semper potest duci planum piano perpendicularare, idque unicum.

75. Sint ea puncta A, I (Fig. 10.) vel recta AI; ex altero eorum punto A, vel ex quovis punto A rectae ejusdem duci poterit AC perpendicularis illi piano per num. 45, & planum ACBI transiens per ea puncta, vel per eam rectam erit perpendicularare piano dato per num. 64.

76. Quoniam autem recta AC perpendicularis piano dato, debet jacere in quovis piano ipsi perpendiculari transeunte per A per num. 66, ac unicum planum duci potest per puncta CAI non in directum jacentia per num. 7; unicum planum duci poterit dato piano perpendiculari transiens per puncta A, I, vel per rectam AI.

Coroll. 9.

77. Si recta non fuerit perpendicularis piano dato, & per eam ducatur planum ipsi piano perpendiculari, efficiet ipsa recta cum communi intersectione angulum hinc acutum, inde obtusum, & ille erit minimus, hic maximus omnium angularium, quos ea efficit cum rectis in piano dato ductis per ejus occurrsum cum ipso

pla-

plano, ac quo magis recta ex occurso ducta recedet hinc inde a recta minimum continente, ac acceder ad rectam continentem maximum, eo majorem angulum continebit cum recta illa data, & semper bini, sed bini tantum hinc inde æquales erunt, iisque recti fient, ubi recta in plano dato jacens fuerit illi intersectioni perpendicularis.

78. Sit enim ejusmodi recta AB (Fig. 11.) : interse-
ctio plani perpendicularis piano dato cum ipso piano
dato sit DBE in quam cadet perpendicularum AC per n.
66, eritque angulus ACB rectus, ac proinde ABC acu-
tus, & ABE obtusus.

79. Centro B sit in piano dato circulus DGEF : &
quoniam quævis CG erit major, quam CD, & minor
quam CE (quod facile dem. per Coroll. 2. prop. 8.
Geom.), recta autem AC communis est triangulis re-
ctangulis ACD, ACG, ACE, ac proinde quadrata AG,
AD, AE singula æqualia quadratis singulis CG, CD,
CE conjunctis cum quadrato AC , erit AG ma-
jor quam AD, & minor quam AE. Quare in trian-
gulis ABG, ABD, ABE habentibus latus AB commune,
latera BG, BD, BE æqualia, angulus ABG erit maior
quam ABD, & minor quam ABE (per Coroll. 3. pro-
pop. 8.); ac proinde ille minimus, hic maximus om-
nium, quos recta BA continere potest cum rectis in
plano dato ex B ductis.

80. Cum vero quo magis punctum G recedit a D,
& accedit ad E, eo magis crescat CG, adeoque AG,
& binæ semper, sed binæ solæ hinc inde CG, CF,
adeoque & AG, AF inter se æquales haberi possint,
etiam quo magis BG recedet a BD, vel accedit ad BE,
eo magis crescer angulus ABG, & bini semper, sed bi-
ni soli hinc inde ABG, ABF æquales erunt inter se.

81. Deinum si HBI fuerit perpendicularis ad DE,
erunt anguli CBH, CBI recti, & BH, BI æquales, adeo-
que æquales etiam CH, CI, & proinde etiam AH, AI,
ac anguli ABH, ABI, qui proinde recti erunt.

De Angulis Solidis.

82. Hinc de angulis solidis agendum esset, qui nimirum continentur pluribus angulis planis in apicem unicum coeuntibus. Sed quoniam minus necessaria sunt, & potissimum eorum usus est ad figuras regulares solidas determinandas, ac describendas, quæ itidem exigui sunt usus, ea hic innuemus tantummodo.

83. Angulus solidus facile concipitur, si ex omnibus angulis B, C, D, E (Fig. 12.) poligoni cuiuscunque rectilinei ad quodvis punctum A positum extra ejus planum ducantur rectæ. Consurget in A angulus solidus constans tot angulis planis, quot sunt poligoni latera.

84. Cavendum tamen illud, ut in poligono omnes anguli ex parte interna computati sint minores duobus rectis, nimirum ut nusquam latera CB, EB (Fig. 14.) introrsum inflectantur versus poligonum respectu rectæ jungentis angulos contiguos; eo enim casu etiam facies anguli solidi introrsum inflecterentur, ac ejusmodi, anguli solidi considerari non solent, ubi eorum proprietates generaliter demonstrantur, ut & ejusmodi polygona pariter considerari non solent.

85. Generaliter de angulis solidis hæc demonstrantur. Omnes anguli plani angulum solidum constituentes simul sumpti minores sunt quatuor rectis. Id facile intelligitur hoc pacto. Si angulus ille solidus apprimendo verticem A versus poligonum DCBE (Fig. 12. 15.) debet complanari, oportet aperiri aliquod latus, ut AD, & figura 12 abiret in 15, in qua omnes anguli plani circa A pertinentes ad priorem angulum solidum simul cum apertura nova DAD constituent quatuor rectos, adeoque omnes simul sunt quatuor rectis minores. Id vero Tyronibus ope anguli solidi e charta efformati ad modum facile ostenditur.

86. Ad datum punctum datae rectæ potest efformari angulus solidus æqualis dato. Si enim sit *ad* (Fig. 12. 13.) recta data fiat angulus *dæc* æqualis DAC, tum

pla-

planum cab faciens cum cad angulum æqualem illi, quem CAB continet cum CAD per num. 59, & in eo angulus cab æqualis CAB, & ita porro, donec deveniatur ad rectam ae respondentem AE proximæ primæ illi AD, & reliquo angulo planus ead reliquo EAD, ac totus angulus solidus a angulo solido A æqualis erit.

87. Patet enim ex ipsa costruotione debere & plana planis, & rectas rectis congruere, si superponantur.

88. Ex quotcumque autem angulis planis poterit semper angulus solidus constitui, dummodo & omnes simul minores sint quatuor rectis & quivis ex iis minor sit reliquis simul sumptis.

89. Si enim (Fig. 15.) ducantur utcumque binæ rectæ AD, AD æquales, tuin incipiendo ab altera semper versus eandem plagam ducantur rectæ AE, AB, AC, quotcumque, & in quibusunque angulis, qui nimirum omnes simul quatuor rectos non adæquabunt, facile concipitur elevari posse punctum A, inclinando eorum plana ita, ut demum rectæ AD, AD congruant, & exsurgat (angulus solidus, præter casum, quo aliquis ex angulis illis planis major esset reliquis omnibus simul sumptis, vel iis æqualis; nam reliqui omnes applicarentur illi uni ita, ut in primo casu, rectæ AD, AD ad se invicem non pertingerent, in secundo pertingent tantum in ipsa applicatione reliquorum ad illum unum.

90. Et quidem si anguli plani essent tantum tres, unicus ex iis angulus solidus componi posset, ut ex tribus rectis unicum triangulum componitur. Si enim essent tres ejusmodi anguli; CAB, BAE, EAD, & immoto BAE converterentur reliqui CAB, EAD circa rectas BA, EA; rectæ AC, AD in unico situ sibi invicem occurrerent, & angulum solidum constituerent. At ubi plures sunt anguli, immoto uno, ut CAB possunt reliqui moveri nihil mutatis magnitudine angulis planis ad A, sed mutata eorum positione, sive inclinationibus planorum in rectis AC, AB, AE; AD prorsus ut in quavis

Figura rectilinea pluribus, quam tribus lateribus constante immoto uno latere, possunt moveri reliqua, nihil mutata eorum magnitudine, sed mutatis solum inclinacionibus, sive angulis.

91. Porro haec omnia Geometrico rigore demonstrari non possunt sine fusiore apparatu: admodum autem facile ostenduntur Tyronibus ope angularium solidorum e charta efformatorum. Sunt & alia quædam circa ipsas inclinationes planorum in angulo solido multo difficultiora demonstratu, ut illud, omnes angulos, quos plana angularium planorum continent cum planis contiguis esse simul minores totidem rectis, quot exprimit duplus angularium planorum numerus, sed ab ea mensura semper minus deficere, quam quatuor rectis. Id autem in Trigonometria spherica maximum usum habere potest. Nam ubi consideratur triangulum sphaericum, revera consideratur angulus solidus ad centrum sphæræ constitutus, cuius anguli plani sunt ipsa latera trianguli sphærici, & inclinationes planorum sunt anguli ejusdem trianguli sphærici. Ac proinde hinc consequitur, in quo vis triangulo sphærico tres angulos simul & minores esse sex rectis, & majores duobus, ut e superioribus illud datur semper in eodem bina latera simul superrare tertium.

92. Dixi usum angularium solidorum maximum esse pro figuris solidis regularibus clavis faciebus planis, quæ dicuntur *poliedra* regularia, seu corpora regularia. Regularia autem dicuntur, quotiescumque & facies omnes æquales habent rectilineas, ac regulares. Ea non posse esse plura quam quinque, sic e superioribus datur. Quivis angulus solidus debet constare angulis planis, qui simul sint minores duorum rectis: non potest autem constare paucioribus quam tribus. Jam vero trianguli æquilateri angulus quivis continet gradus 60, quadrati 90, pentagoni 108, exagoni 120, reliquorum poligonorum majores sunt. Porro tres anguli exagoni jam continent gradus 360, adeoque non possunt constituere angulum solidum, & multo minus ipsum constituent anguli poli-

gonorum plura latera habentium. Tres anguli pentagoni continent gradus 324, & quatuor 432, quadrati autem tres 270, quatuor 360. Quare utrobique e tribus ejusmodi angulis planis angulus solidus constare potest, e quatuor non potest. Trianguli vero æquilateri 6 anguli continent 360, adeoque e sex ejus angulis componi non potest angulus solidus, potest autem e quinque, quatuor, vel tribus. Quare angulorum solidorum pro poliedris regularibus quinque tantum species esse possunt, eorum nimirum, qui constituuntur tribus angulis pentagonorum, quatuor quadratorum, tribus, vel quatuor, vel quinque triangulorum æquilaterorum.

93. Porrò demonstrarunt Veteres, & Euclides id libro 13 persequitur, poliedrum regulare componi e pentagonis 12, e quadratis sex, quo casu est cubus, e triangulis quatuor, ubi terni in apicem coeunt, quo casu est pyramis, vel octo, ubi coeunt quatuor, vel 20, ubi coeunt quinque, & cuivis ex iis corporibus sphæra inscribi potest, quæ omnes ejus facies contingat, vel circumscribi, quæ per omnes ejus angulos transeat. Sed ea minoris sunt usus, & hic innuisse sufficerit.

94. *Def. 3.* Figura solida habens pro basi figuram rectilineam, e cuius singulis angulis extra ejus planum consurgant lineæ æquales, & parallelae terminantes ejus faciem rectilineam dicitur *Prisma*, quæ basis si fuerit parallelogrammum, prisma dicitur *Parallelepipedum*, ac si omnes facies fuerint quadratae dicitur *Cubus*. Si autem rectæ illæ in apicem coeunt, solidum dicitur *Pyramis*.

95. Prisma super basi pentagona ABCDE exhibit Fig. 16. pyramidem Fig. 18.

Coroll. 1.

96. Quævis sectio prismatis, vel pyramidis facta plane no nisi parallelo est figura prorsus similis basi, & in prismate æqualis, in pyramidide habens latera homologa minora in ratione distantiarum ipsius a vertice ad distantiam basis ab eodem.

97. Sit enim ejusmodi sectio LPONM (Fig. 16.) & per

num. 9. singula ejus latera erunt parallela singulis lateribus basis, cum sint intersectiones planorum parallelorum cum iisdem planis. Quare & singuli anguli LPO, PON &c. erunt aequales singulis ABC, BCD &c. per num 41.

98. Præterea in prisme facies LABP, PBCO &c. erunt parallelogramma, & proinde latera LP, PO &c. aequalia lateribus AB, BC &c. adeoque sectio LPONM prorsus aequalis basi ABCDE.

99. In pyramide vero (Fig. 18.) similia erunt triangula FLP, AFB, & LP ad AB, ut FL ad FA, vel ut FP ad FB, & ita reliqua omnia latera PO ON &c. ad BC, CD &c. erunt in ratione FP ad FB, FO ad FC &c. (per Pr. 72. Geom.) quæ erit semper eadem ratio, ut FP ad FB est eadem ac FL ad FA. Quare sectio LPONM erit similis basi ABCDE, & ratio laterum eadem, ac ratio distantiarum a vertice F.

Coroll. 2.

100. Prismæ terminatur altera basi parallela opposita, ac aequali priori, & faciebus lateralibus parallelograminis.

101. Si enim planum sectionis parallela basi concipiatur transire per extremum punctum F rectæ AF (Fig. 16, in quod abeat L, reliquæ sectionis puncta BCDE) abibunt in KIHG cum omnes BP, CO &c. aequales sint AL, & omnes BK, CI &c. aequales AF. Erit igitur figura FKIHG aequalis ABCDE, & ipsi parallela, ac facies ABKF, BCIK &c. erunt parallelogramma.

Coroll. 3.

102. Prismatis, cuius latera rectilinea sunt basi perpendicularia, superficies demptis basibus est productum ex perimetro basis in unum e lateribus rectilineis: pyramidis autem habentis omnia latera rectilinea aequalia, & latera basis pariter aequalia est dimidium productum ex perimetro basis ducta in perpendiculari demissum e vertice in quodvis latus perimetri ipsius basis.

103. Nam in prisme (Fig. 16.) singulæ facies, ut GEDH, sunt in eo casu rectangula contenta sub singulis lati

Nis lateribus basis ut ED, & singulis lateribus rectilineis ut EG. Adeoque summa omnium ejusmodi rectangularium est tota perimeter basis ducta in ejusmodi latus rectilineum.

104. At in pyramide (Fig. 18.) si omnia latera basis sunt æqualia inter se, & latera rectilinea ipsius pyramidis pariter inter se æqualia, erunt omnes facies triangula isoscelia æqualia, & singulorum mensura erit dimidium productum ex latere AE basis ducto in suum perpendicularum FZ, quæ perpendiculara erunt omnia æqualia. Quare pariter summa omnium æquabitur dimidio producto ex tota perimetro basis, & unoquovis ex ejusmodi perpendicularibus.

Coroll. 4.

105. Pyramidis ejusmodi truncatae planio parallelo basi, superficies reliqua versus basim æquatur producto ex semisumma perimetrorum basis, & sectionis ducta in distantiam perpendiculararem laterum parallelorum basis, & sectionis earumdem.

106. Si enim eadem FZ occurrat lateri LM in Y, trapezii ALME, mensura erit semisumma LM, AE ducta in YZ, cum nimirum resolvatur in bina triangula ALM, AME, quorum bases ML, AE, & altitudo communis YZ distantia perpendicularis ipsarum basium parallelarum, adeoque singulorum triangulorum mensura sit dimidium productum ex singulis basibus, & ipsa YZ.

Coroll. 5.

107. Omnia prismata collata inter se, ut & omnes pyramidis inter se collatae, si super basibus æquales areas habentibus, & inter eadem plana parallela constituantur, æqualia spatia solida comprehendunt.

108. Secentur enim planis quotunque parallelis basibus (Fig. 16., 17., 18., & 19.), & sectiones LPONM, QRSTV unius prismatis, vel pyramidis, æquales erunt semper sectionibus respondentibus *lpo*, *qrs* alterius. Nam in prisme omnes erunt æquales eidem basi, in pyramide erunt ipsi similes, & singula latera respondentia

LP, *lp* erunt ad latera homologa *AB*, *ab* in ratione eadē, nimirum in ratione *FL* ad *FA*, & *fl* ad *fa*, quā ratiōnes erunt eadem per num. II., cum puncta *F*, *f* terminentur ad planum parallelum piano basium, & sectionis. Ea autem solida concipi possunt composita ex iis omnibus superficiebus, quarum singulæ cum singulis æquales sint, erunt & ipsa solida æqualia.

Scholion.

De methodo indivisibilium, & infinitesimali.

109. Hæc ratio demonstrandi dicitur methodus indivisibilium Cavalleriana, quam nimirum Cavallerius inventus primus, eaque cum successu est usus, concipiendō lineas compositas e punctis, superficies e lineis, solida e superficiebus. Révera linea producitur motu continuo puncti, superficies motu continuo lineæ, solidum motu continuo superficie, & linea e lineolis, non e punctis, superficies ex areolis, non e lineis, solidum ex spatio- lis solidis, non e superficiebus componitur. Hinc fieri potest, ut hæc methodus aliquando in errorem inducat. Sic si bina rectangula *FAEG*, *fAEG* (Fig. 20.) non in eodem piano posita terminarentur ad binas rectas *Ff*, *Gg* perpendiculares piano prioris; rectangulum posterius esset longius priore in ratione rectæ *Eg* subtendentis angulum rectum *EGg* ad *EG* latus trianguli rectanguli, cum nimirum communis altitudo esset *EA*, & tamen sectio- nes *LM*, *lm* essent æquales eidem *AE*, adeoque & inter se.

110. Eam Guldinus difficultatem Cavallerio objecit, qui respondit: in hoc casu lineas, a quibus eæ superficies veluti contexuntur, esse utrobique æquales, sed tex- tum ipsum rationem in secundo rectangulo. Si enim fiat secunda sectio *QV* non admodum proxima priori, bina fila *QV*, quae erunt æqualia inter se, sed quae ab *lm* remotius, quam *QV* ab *LM*. Suam autem methodum nunc solum procedere, cum præter æqualitatem sectio- num, e quibus figura constare concipitur, etiam bina-

rum quarumque inter se proximarum distantiae æquales sint.

111. Et quidem si methodus cum hac animadversione adhibetur nunquam in errorem inducet, & in quamplibus casibus ejus ope invenientur æqualitates, quæ ægre per longissimas ambages methodo a veteribus adhibita invenirentur. Ut methodi fundamentum pateat, concipientur parallelogrammata AG, ag (Fig. 21.) constituta in eodem plano super basibus æqualibus AE, ae, & inter easdem parallelas. Eoruin æqualitas hac methodo ostenditur ex eo, quod sectiones LM, lm, QV, qu parallelæ basibus AE, ae æquales sint iis, & inter se, ac lineæ illæ in ipsis superficiebus parallelogrammorum æque inter se distent, licet earum distantiae VM, um computatae in directione laterum non sint æquales, si eaæ directiones diversæ fuerint, adeoque ipsorum laterum æqualitas non habeatur. Sed jam superficies AFGE, afge non componentur e lineis LM, lm, sed ex areolis LMVQ, lmuq, quæ inter lineas continentur, ut & solida AF, af in Fig. 18, 19 ex spatiolis solidis LS, ls inter superficies contentis non e superficiebus LMNOP, lop, in quibus nimurum areolis, & spatiolis bases, & crassitudines æquales erunt, ac numerus idem.

112. Ex basi & crassitudine æquali ita infertur eorum elementorum æqualitas, ut demonstratio, qua totorum æqualitas evincitur rite procedat, dummodo crassitudo ipsa elementorum concipiatur infinitè parva. Si enim sectio utriusque divisa concipiatur in infinitum numerum particularum æqualium, & similiū, æqualis semper assumi poterit utrobiique earundem numerus ita, ut ubi sectiones sunt rectæ lineæ, ut in Fig. 21, utraque sectio in ejusmodi particulas accuratè dividatur, ubi vero eaæ sunt areae, ut in 16, 17, 18, 19, continuata in infinitum divisione, infinitè parva spatiola hinc inde in angulis remaneant. Tum erectis lineis perpendicularibus ad sectionem alteram, usque ad oppositam infinitè proximam, habebitur utrobiique infinitus numerus particularum æqualium, & similiū inter illas sectiones

inf.

in infinitè proximas contentarum, & solum circa margines, ut in Fig. 21. circa LQ, VM, lq, um deesse poterunt aliquæ ob laterum obliquitatem. Sed numerus eorum, quæ desunt, respectu reliquarum minuetur in infinitum, ubi in infinitum minuatur crassitudo, & sectiones oppositæ ad se invicem accedant in infinitum. Quare ubi illorum elementorum, nimirum spatiorum, quæ binis sectionibus infinitè proximis continentur, æqualitas assumitur, contemnitur aliquid infinitè parvum respectu ipsius summæ.

113. Quoties autem in comparandis binis quantitatibus finitis contemnendo aliqua, quæ respectu earum sunt infinite parva, invenitur æqualitas, toties vera æqualitas haberi debet, nec ullus ne infinitesimus quidem error inde oriti potest. Finitæ enim quantitates sunt eæ, quæ in se determinatæ sunt: infinitæ parvæ quantitates sunt eæ, quæ concipiuntur minui ad arbitrium ultra quoscumque limites in se determinatos. Porro contemptus quantitatum infinitesimarum in comparatione quantitatum finitarum nullum errorem parere potest ne infinitesimum quidem. Nam si illæ finitæ quantitates essent inæquales, haberent differentiam aliquam in se determinatam. Quoniam autem illæ quantitates infinitesimæ possunt minui ultra quoscunque limites in se determinatos, poterunt simul omnes esse minores, quam illa differentia supposita, quam idcirco compensare non posse, nec posset ex illarum contemptu derivari æqualitas quantitatis illius in se determinatæ, nimirum compensatio differentiæ suppositæ.

114. Id exemplo sequenti fiet magis manifestum. Sint in bilance hinc inde bini lapides inclusi cum liquoribus quibusdam, qui liquores perpetuo debeant effluere, vel evaporari, donec penitus evanescant. Concipiamus nos nescire utrum lapidum pondera æqualia sint, utrum liquores illis pondus addant, an auferant, utrum æque effluant; scire tamen hæc duo: donec aliquid liquorum supererit, haberi debere æquilibrium, & liquores debere immixtui ultra quoscunque limites in se determinatos,

cum

cum nimirum debeat penitus evanescere. Ex his binis veritatibus inferre licebit, lapides æqualis ponderis esse, liquores vel æque augere, vel æque minuere ipsorum pondera, & æqualiter effluere. Si enim ii lapides non æque ponderarent, esset aliqua in ipsorum ponderibus differentia in se determinata. Quoniam igitur liquores debent minui ultra quoscunque limites in se determinatos, aliquando simul omnes addent, vel auferent minus ponderi, quam sit illa differentia supposita. Igitur tunc illam differentiam compensare non possent nec æquilibrium haberetur, quod est contra hypothesim. Si igitur, donec adsunt liquores, æquilibrium habetur, & ii in infinitum imminuuntur, oportet lapides ipsi æquales sint. Quare cum ipsi lapides, & liquores simul æque ponderent; ipsi liquores æqualia pondera vel addunt, vel demunt, adeoque & æque effluunt.

115. Jam vero lapides illi referunt quantitates finitas, sive in se determinatas, liquores illi referunt quantitates infinitesimas, quibus contemptis, si finitæ quantitates æquales inveniuntur, reipsa debent esse accurate æquales, & infinitesimæ illæ quantitates, quæ contemnuntur debent se mutuo compensare. Nam nisi illa finitatum quantitatum æqualitas haberetur, contemptus ipsarum decrescentium ultra quoscunque limites, non posset compensare ipsarum differentiam tum, cum infra ipsam eam differentiam imminuerentur.

116. In casu nostro binæ quantitates finitæ sunt bina prismata, vel pyramides, quantitates infinitesimæ sunt summæ particularum illarum omnium, quæ ob laterum obliquitatem desunt in angulis singulorum stratorum binis sectionibus inter se infinite proximis contentorum, ubi eadem in similes, & æquales particulae resolvuntur ad eorum æqualitatem evincendam. Cum his neglectis illa solida inveniantur æqualia; oportet, ipsa omnino æqualia sint, nec ullus error habebitur. Quod autem de binis quantitatibus æqualibus dictum est, facile traducitur ad quantitates quamcunque rationem habentes ad se invicem. Nam si eam rationem accurate non habe-

haberent, addendum esset aliquid in se determinatum alteri, vel demendum alteri, ut eam assequerentur. Quæ autem contemnuntur, cum decrescere possint infra id, quod addendum, vel demendum esset, non possunt ejus vicem supplere, & eam rationem ostendere, quæ ex ipsorum contemptu derivatur.

117. Atque hoc scholio continetur fundanetum tam methodi Cavallerianæ, quam methodi infinitesimalis paſſim adhiberi solitæ, quarum utraque investigationi est aptissima, utraque demonstrationes mirum in modum contrahit, & secunda multo latius patet, quam prima, utraque autem paſſim adhiberi solet, & uitamque jam adhibebimus ubi opus fuerit. In priore autem illud generaliter moneri potest, eam semper habere locum, ubi areæ in eodem plano positæ per easdem secantur rectas datæ rectæ parallelas, vel ubi solida quævis secantur planis eidem dato plano parallelis; ejusmodi enim areæ vel solida erunt semper, ut sectiones, si sectiones ipsæ datum aliquam rationem habuerint ad se invicem. Habet autem locum etiam ubicumque sectiones parallelæ inter se fuerint, & æque utroque distantes, ac numero æquali tam in solidis, quam in areis, sed non in lineis. In methodo autem infinitimali cavendum, ne contemnatur aliquid, quod non decrescat ultra quoscumque limites in se determinatos respectu ejus, respectu cujus contemnitur, quod si caveatur, nullus error usquam committi poterit.

118. Veteres multo longiore ambitu utebantur adhibentes methodum, quam exhaustionum vocant. Conclu-debant singulas e binis quantitatibus comparandis inter alias binas ad se invicem accedentes magis, quam pro quavis data differentia, ac demonstrabant æqualitatem quantitatum concludentium inter se, tum inferebant propositarum quantitatum æqualitatem pariter inter se, reducendo semper demonstrationem ad absurdum. Ejusmodi methodus eodem fundamento innititur, quo methodus infinitesimalis, sed multo est implicatior, & longior. Eam apud Euclidis commentatores Tyro videre
pote-

poterit, si velit, & ubi aliquanto plus profecerit, apud veteres ipsos, Archimedem in primis. Sed de his jam satis.

Coroll. 6.

119. Pyramides basium æqualium in eundem apicem desinentes, vel utcunque eandem altitudinem habentes, sunt æquales.

120. Potest enim per communem verticem duci planum piano basium parallelum, eruntque super æqualibus basibus, & in iisdem planis parallelis; & pariter si bases collocentur in eodem piano vertices ad eandem partem siti in eadem altitudine terminabuntur ad idem planum basibus parallelum.

Coroll. 7.

121. Pyramis est tertia pars prismatis habentis æqualem basim & altitudinem.

122. Collocentur enim (Fig. 22.) bases in eodem piano, & vertices terminabuntur ad planum ipsi parallelum, ob altitudines æquales. Concipiatur autem in eodem illo basium piano triangulum ACB æquale areæ basium; ac in eadem altitudine prisma terminatum ad DFE ipsi æquale, & parallelum. Tum concipiatur secari ipsum prisma piano CDB, & orientur binæ pyramides habentes verticem in D, & altera habebit pro basi triangulum CAB, altera parallelogrammum CFE. Si hæc secunda fecetur iterum piano CDE in binas pyramides habentes eundem verticem D, & bases FCE, BEC æquales; hæc binæ pyramides erunt inter se æquales (per n. 119.) Earum autem prior considerari potest tanquam habens basim DFE & verticem C, quæ pariter (per n. 119.) æqualis esse debet primæ illi habenti pro basi triangulum ABC, & pro vertice D, cum bases ipsæ sint inter se æquales, & altitudines pariter æquales eidem illorum triangulorum distantiaæ perpendiculari a se invicem, adeoque & inter se. Erit igitur prima illa pyramis pars prismatis terria. Cumque datum prisma huic triangulari prismati æquale sit, ac data pyramis huic pyramidis.

ramidi (per num. 107); etiam data pyramis erit pars
tertia dati prismatis.

Coroll. 8.

123. Mensura cuiusvis prismatis est productum ex
basi in altitudinem, pyramidis autem ejus producti
triens.

124. Si enim capiatur basis ABCD (Fig. 24.) rectan-
gula æqualis basi dati prismatis, vel datæ pyramidis, &
ductis per ejus latera planis perpendicularibus ejus plano
in eadem altitudine construatur prisma AG habens fa-
cies basi perpendiculares; hoc erit æquale dato prismati,
ac triplum datæ pyramidis. Si autem hujus latera AD,
DC, & altitudo DF dividantur in particulas æquales
quotcumque, quarum numerus, si forte eæ recte incom-
mensurabiles fuerint, augeatur, & magnitudo minuatur
in infinitum, ut ea, quæ supersunt, & contemnuntur in-
finitè parva evadant, concipienturque per singula divi-
sionum puncta plana parallela faciebus parallelepipedi
ipsius, habebuntur tot strata, quot particulæ fuerint in
altitudine DF, & in singulis stratis tot ordines particu-
larum solidarum, quot particulæ lineares fuerint in AD,
& tot particulæ solide omnes æquales, & cubicæ, quot
particulæ lineares in latere DC. Quare multiplican-
do AD per DC habetur numerus particularum solidarum
cuiusvis strati, qui est idem ac numerus particularum
superficialium basis BD. Hunc autem numerum mul-
tiplicando per numerum particularum linearium altitu-
dinis DF, habebitur numerus particularum omnium so-
lidarum contentarum eo parallelepipedo. Igitur id pa-
rallelepipedum, adeoque datum prisma, vel triplum datæ
pyramidis est productum ex basi in altitudinem.

125. Ex. gr. Si basis habeat latus AB duorum palmo-
rum, AD quatuor, constabit superficies ABCD palmis
quadratis bis quator, sive octo. Si autem altitudo DF
fuerit palmorum trium, habebuntur tria strata cubo-
rum palmarium alia supra alia, quorum singula conti-
nebunt octo. Quare totum prisma continebit cubos ejus-
modi per octo, sive vigintiquatuor.

Co-

Coroll. 9.

126. Prismata omnia, si inter se comparentur, ac pyramides omnes inter se; erunt ut producta ex basibus; & altitudinibus: & si bases fuerint aequales, erunt ut solae altitudines: si altitudines fuerint aequales, erunt ut solae bases: si ea solida fuerint aequalia, altitudines erunt reciproce proportionales basibus: si bases fuerint reciproce proportionales altitudinibus, erunt aequalia: si bases fuerint similes, & altitudines proportionales lateribus homologis basium, erunt in triplicata ratione laterum homologorum, vel altitudinum.

127. Patent omnia ex regulis proportionum; & postremum hoc deducitur ex iisdem, ac ex eo, quod basium similiū areæ sunt in ratione duplicata laterum homologorum (per Coroll. 2. proposit. 12. Geom.) , quibus cum accedat ratio altitudinum; evadit triplicata.

Coroll. 10.

128. Similiū solidorum superficies sunt in duplicata ratione laterum homologorum; ipsa autem solida in triplicata:

129. Similia enim dicuntur ea, quæ resolvi possunt in similes pyramides, quarum bases sunt in duplicata ratione laterum, quibus accedit ratio simplex ipsorum laterum, dum in altitudines ducuntur:

130. Def. 4. Cylindrus est figura solida inclusa superficie gerita motu parallelo recte radentis circulum positæ extra ipsum planum: Conus vero, motu recte radentis circulum, & transversantis per punctum quoddam positum pariter extra ipsum planum: utriusque basis dicitur ille circulus, axis ejusmodi facta per centrum ipsum ducta, latus recta, quæ radit circulum, vertex in cono punctum illud immobile; & si axis sit perpendicularis basi, dicitur cylindrus, vel conus rectus; si ille fuerit obliquus, hic etiam dicitur obliquus. Si autem basis fuerit quævis alia curva linea, solidum dicitur Cylindricum, vel Conoidicum.

131. Fig. 23. exprimit cylindrum, 25 conum: basi est

130 E L E M E N T A

est circulus $\hat{A}aE$, axis FC , latus in cylindro BA , vel ED , in cono FA , vel FE , coni vertex F .

Coroll. 1.

132. Si basis prismatis, vel pyramidis multiplicato in infinitum numero laterum, & imminuta magnitudine, abeat in curvam continuam, satis patet prisma abire in solidum cylindricum, pyramidem in conoidicum, & prismam, cujus latera sunt perpendicularia basi, in cylindrum rectum, pyramidem vero, cujus basis latera aequantia, & distantiae a vertice aequales in conum rectum, cujus latus rectilineum quodvis erit perpendicularare perimetrum basis.

133. Cetera facile patent: ubi vero in pyramide (Fig. 18.) poligonum $ABCDE$ circulo cuidam inscriptum sit, & multiplicatis in infinitum lateribus, poligonum abit in circulum, rectae FA , FE , abeunt in ipsum perpendicularum FZ .

Coroll. 2.

134. Quamobrem quaecunque dicta sunt ac prismate & pyramide in Corollariorum defin. 3, locum habebunt in quovis solido cylindrico, vel conoidico, ac ea, quae ad superficiei mensuram pertinent, habebunt locum in cylindro, & cono rectis tantummodo ita, ut superficies coni recti truncati sit semi-summa peripheriarum binorum basium ductarum in earundem distantiam.

Coroll. 3.

135. In cono obliquo (Fig. 25.) si demisso perpendicularo FD in basim, ducatur per D diameter ACE , jacente A ad partes oppositas C , angulus FCA , & recta FA erunt maximi omnium angulorum $FC\alpha$, & restarum $F\alpha$, angulus FCE , & recta FE minimi: ipse autem angulus $FC\alpha$, & recta $F\alpha$ erunt eo minores, quo magis recedent ab A , & accident ad E , ac bini tangentum hinc inde aequales erunt,

136. Quod pertinet ad angulos patet ex Cor. 9. def. 2. Quod vero pertinet ad rectam patet ex ipso angulo, & ex eo, quod FC sit constans, & $C\alpha$ semper aequalis CA , vel CE .

137. *Def. 5.* Sphæra est solidum unica superficie comprehensum, ad quam omnes rectæ e centro ductæ aequales sunt, cuius diameter dicitur recta quævis per centrum ducta, & utrinque terminata ad superficiem: recta autem a centro ad superficiem ducta dicitur radius.

Coroll. 1.

138. Omnes sphæræ diametri aequales sunt inter se.

139. Sunt enim aequales omnes radii, quorum binos continet quævis diameter.

Coroll. 2.

¶ 140. Si semicirculus circa suam diametrum gyret, generat sphæram habentem idem centrum, & eandem diametrum.

141. Omnes enim rectæ CF, CI, CH (Fig. 26.) ductæ a centro immoto semicirculi C ad quævis superficie puncta erunt aequales eidem CA, vel CB immotæ.

Coroll. 3.

142. Si sphæra secetur quovis plano, sectio erit circulus, qui erit omnium maximus, si sectionis planum transeat per centrum sphæræ, quo casu habebit diameter, & centrum commune cum diametro, & centro sphæræ, ac deinde erit major, vel minor, prout planum sectionis magis, vel minus accedet ad centrum sphæræ, vel recedet.

143. Sit enim sectio FIH, & ad ejus planum ducatur (per num. 46.) perpendicularis diameter ACB, quæ ipsi occurrat in E; ac si punctum E congruat cum ipso centro C patet omnes EI fore radios sphæræ. Si autem cadat extra, in triangulis CEI, CEF anguli ad E erunt recti, latus CE idem, basis CI aequalis CF. Quare & quodvis latus EI aequalē erit cuivis EF (prop. 7. Geom.), adeoque in utroque casu sectio erit circulus, cuius centrum in E, quod in primo casu cadet in ipsum sphæræ centrum C, circulo maximo habente centrum, adeoque & diametrum, commune cum centro, ac diametro sphæræ.

144. Patet autem ob angulum ad E rectum, radii circuli EF fore semper minorem radio sphæræ CF; nisi congruant abeunte E in C; quo casu æquantur, & quo minor fuerit distantia CE; eo major erit chorda HF, nimirum circuli diametere.

Coroll. 4.

145. Si concipiatur (Fig. 27.) cylindrus rectus KQLM circumscriptus sphæræ habens pro axe diametrum AB, pro basi circulum æqualem circulo sphæræ maximo, quem sectio ipsi sphæræ AB perpendicularis ducta per E fecet in RN, superficies segmenti sphæræ HAF erit æqualis superficie cylindri QNRK, & area totius sphæræ areæ totius cylindri demptis basibus.

146. Concipiatur enim quævis particula Ff peripheriæ circuli genitoris ita parva, ut infinite accedat ad rectam lineam, & producta Ff usque ad BA in G, generabit recta FfG superficiem coni recti, ut patet, ac Ff superficiem coni recti truncati cuius mensura (per num. 134.) erit ipsa Ff ducta in semifummam peripheriarum habentium pro radiis EF; fe; nimirum (ducto radio CO, qui ipsam Ff fecet bifariam in O & ad angulos rectos per Cor. 4. prop. 5. Geom., & demisso perpendiculari OP) in circumferentiam habentem pro radio OP, quæ erit æqualis illi semifummæ; nam $EF : : FG$, fG , & componendo $EF \frac{1}{1} fe$. $fe : : FG \frac{1}{1} fG$, & cum sit $2OG \frac{1}{1} FG \frac{1}{1} fG$, erit etiam $EF \frac{1}{1} fe$. $fe : : OG$. fG ; est autem $OG : fG : : OP : fG$.

$EF \frac{1}{1} fe$
 fe , ergo $OP \frac{1}{1} \frac{1}{1}$ & cum peripheriæ sint ut

radii, erit peripheria ipsius OP æqualis semifummæ peripheriarum habentium radios EF & fe. Jam vero ob similia triangula rectangula Gef, GEF, GPO, OPC, erit $Ee \frac{1}{1} Nn$. $fF : : GE$. $GF : : GP$. $GO : : PO$. $CO : : EN$. (ut facile intelligitur ex Pr. 12. Geom., ejusque Coroll. 4.) ergo $Nn \times EN \frac{1}{1} fF \times PO$, atque adeo (cum peripheriæ sint ut radii) erit factum ex Nn

S O L I D O R U M .

133

In peripheriam descriptam radio EN aequale facto ex FF in peripheriam descriptam radio PO. Primum illud est area genita ab Nn, hoc secundum est area genita ab Ff. Quare tota area genita a toto arcu A^F aequatur toti areæ genitæ a recta QN, & abeunte REN in MBL tota sphæræ superficies superficieⁱ totius cylindri demptis basibus.

Coroll. 3.

147. Superficies segmenti sphærici HAF aequatur areæ circuli habentis pro radio chordam AF, superficies totius sphæræ areæ circuli habenti pro radio diametrum ipsius sphæræ, quæ proinde erit quadrupla circuli sphæræ maximi.

148. Est enim ut AE, sive QN ad AF, ita AF ad AB, adeoque ita semiperipheria radio AF, ad semiperipheriam radio AB, sive peripheriam radio CB, vel EN: Quare productum ex QN & peripheria descripta radio EN, sive area cylindrica QNRK, vel area segmenti sphærici HAF aequatur producto ex AF in dimidiā circumferentiam radio pariter AF, sive areæ circuli habentis ipsam AF pro radio, quæ AF, abeunte F in B, evadir diameter AB, ac proinde area totius sphæræ aequatur areæ circuli habentis pro radio diametrum ipsius sphæræ; quæ idcirco quadrupla est areæ circuli habentis pro radio radium ipsius sphæræ, nimirum areæ circuli sphæræ maximi.

Coroll. 6.

149. Sector sphæræ CHAFC aequalis cono habenti pro basi circulum radio AF, & pro altitudine radium ipsius sphæræ, & soliditas totius sphæræ cono habent pro basi circulum quadruplum cireuli sphæræ maximi, ac eandem altitudinem, cujus mensura erit area ejusdem circuli ducta in binos trientes diametri.

150. Si enim superficies sphæræ concipiatur resoluta in particulas ita parvas, ut infinitè accedant ad superficiem planam, & a singulis earum perimetri punctis ad centrum sphæræ tendant rectæ, habebuntur totidem pyramidæ, quarum bases erunt illæ particulæ superficieⁱ

sphæricæ, & altitudo communis radius sphæræ. Quare omnium summa æquabitur pyramidì vel cono habentì basim æqualem toti illi superficiei sphæricæ, & altitudinem eandem. Postò cùm (per n. 147.) totius sphætæ superficies sit quadriplà circuli sphætæ maximæ, & conius (per num. 134. & 123.) triens producti ex basi & altitudine, erit soliditas sphætæ equalis trienti producti ex quadruplo circuli maximæ, & radio; vel trienti producti ex duplo ipso circulo; & diametro; sive binis trientibus producti ex circulo ipso; & diametro.

Coroll. 7.

151. Si concipiatur conus MAL habens pro basi pariter circulum sphætæ maximum, ut cylindrus QLMK; erunt conius, sphæra, cylindrus ad se invicem ut numeri 1, 2, 3, & superficies sphætæ, ad superficiem cylindri, inclusis basibus, pariter ut 2 ad 3:

152. Nam cylindrus equatur producto ex basi sua, sive area circuli sphætæ maximæ, & diametro AB (per nu. 134, & 123) sphæra binis ejus producti trientibus (per n. 149), conus unì trienti (per n. 134, & 123).

Coroll. 8.

153. Sphætarum superficies sunt in duplicata ratione radiorum, sphætæ autem ipse in triplicata.

154. Nam areæ circulorum maximorum sunt in duplicata ratione radiorum, quibus accedit ratio ipsorum radiorum, cum pro habenda sphæra eæ ducuntur in diametros, vel radios, ac fit triplicata.

Scholion 1.

155. Si Archimedeis numeris uti libeat pro ratione circumferentie circuli ad radium, erit sphæra ad cubum diametri, ut 21 ad 11. Erit enim quadratum radii ad aream circuli, ut 7 ad 22. Quare quadratum diametri ad aream circuli, ut 28 ad 22, vel ut 14 ad 11. Si primus ducatur in diametrum, & secundus in $\frac{2}{3}$ diametri, fiunt cubus, & sphæra, que solida proinde erunt ut 14 ad $\frac{2}{3} \times 11$, sive ut 3 X 7 ad 11, vel ut 21 ad 11.

S O L I D O R U M . 135

156. Data quavis ratione diametri ad circumferens
etiam adhuc propiore ratione verę, semper habebitut fa-
cile mensura sphären; ut & corporum omnium mensurę
ad pyramides redactę haberri poterunt ex iis, que dicta
sunt:

157. Mechanica eorum mensurā haberri potest, si cor-
pora ejusdem formę minora immittantur in vas aqua
plenum, & capiatur mensura aquę effluentis.

Scholion 2.

158. Subjiciemus indicem propositionum libri 11, &
12 Euclidis, quas fere omnes accuratè demonstravimus,
nonnullę ex demonstratis sponte fluunt: Omisimus ali-
quas, quas Euclides in gratiam sequentium demon-
strat:



Euclidi Lib. XI	Nobis	Euclidi Lib. XI	Nobis
Pr. 1	num. 4	28)	
2	7	29)	
3	5	30)	
4	18	31)	
5	28	32)	126
6	35	33)	
7	7	34)	
8	35	35)	
9	39	36)	
10	41	37)	
11)	45	38	66
12)			
13)		Lib. XII	
14	16	5)	126
15	54	6)	
16	9	7	122
17	11	8)	
18	64	9)	126
19	70	10)	
20	85	11)	
21)	88	12)	
22)		13)	(134
23)		14)	(122
24	98	15)	
25	126	18	453
26	86		

TRIGONOMETRIA.

Trigonometria dicitur ars resolvendi triangula; Nimirum in quovis triangulo habentur tria latera, & tres anguli, ex quibus si dentur alii, fere semper reliqua tria inveniri possunt. Ea cum inveniuntur, triangulum resolvi dicitur, ac ejusmodi investigationem Trigonometria docet, quæ triangulorum dimensionem græco vocabulo exprimit.

2. Porro triangula considerari solent vel in plano a rectis constituta lineis, vel in sphæræ superficie ab arcubus circulorum ejusdem sphæræ maximorum. Quæ illorum resolutionem docet Trigonometria, *plana* dicitur, quæ horum, *sphærica*. Id autem præstat ope quartam, quæ dicuntur *functiones* arcuum circuli, vel angularium eosdem arcus habentium pro mensura.

3. Quamobrem hunc tractatum dividemus in partes tres. Prima ager de arcuum functionibus, & earum tabulis, secunda de Triangulis planis, tertia de sphæricis.

P A R S P R I M A.

De arcuum functionibus, & earum tabulis.

§. I.

De natura, & proprietatibus functionum.

Definitiones.

4. **N**omine *functionis* arcus cuiuspiam hic intelligimus sinum rectum, sinum versum, tangentem, secantem, cosinum, cotangentem, cosecantem, quæ singula sunt exponenda.

5. Si ex altero extremo arcus circularis ducatur perpendicularum in diametrum ductam per alterum extre-
mum;

num; hoc perpendicularum dicitur *sinus rectus* ejus arcus; & pars diametri intercepta inter illud extreum arcus, & ipsum sinum rectum; dicitur *sinus versus*: In Fig. I. DE est sinus rectus arcus AD; AE est sinus versus ejusdem:

6. Si ex altero extremitate arcus ducatur tangens; donec occurrat rectae ductae per alterum extremitatum, & per centrum, ipsa dicitur *tangens* ejusdem arcus. AF est tangens arcus AD; Af arcus Ad:

7. Illud segmentum rectae ductae per centrum, & alterum extremitatum arcus; quod interjacet inter centrum; & tangentem ductam per alterum extremitatum; dicitur *secans* ejusdem arcus. Cf est secans arcus AD; Cf arcus Ad:

8. Id quod arcui cuiquam deest ad complendum semicirculum, dicitur ejus *complementum ad semicirculum*; vel *ad 180 gradus*: ejus differentia a quadrante, sive ipsum excedat, sive ab ipso deficiat, dicitur *absolutum complementum*, ac *sinus*, *tangens*, *secans* complementi arcus; dicitur ejus *cosinus*, *cotangens*, *cosecans*: DB est respectu AD complementum ad semicirculum, dB respectu Ad: GD, Gd sunt complementa AD, Ad: DH, dH sunt ipsorum cosinus: GI, Gi ipsorum cotangentes: Ci, Ci ipsorum cosecantes; cum sint sinus tangentes secantes complementorum GD, Gd.

Coroll. I.

9. Bini arcus, qui simul sumptu semicirculum compleant, habent omnes functiones aequales.

10. Sint AD, Ad simul aequales semicirculo AdB: erit dB aequalis AD, ac proinde etiam complementum GD aequale Gd; eritque angulus DCd bifariam sectus per rectam CG (per Schol. def. 7. Geom.), adeoque (per pr. 5. Geom., & ejus Cor. 4.) chotta Dd secta bifariam, & ad angulos rectos in H: Quare etiam cosinus DH, dH erunt aequales, & sinus DE, de aequales eidem CH (per Cor. 4. pr. 3. Geom.) erunt aequales inter se. Cumque angulus ACf sit aequalis dCe ad verticem opposito (per Cor. 4. def. 8. Geom.), adeoque

que angulo DCA, ob arcus dB , DA aequales; etiam in triangulis ACF, ACf erunt (per pr. 3. Geom.) aequales tangentes AF, Af, & secantes CF, Cf, ut pariter ob aequalitatem angulorum GCI, GCi erunt aequales cotangentes GI, Gi, & cosecantes CI, Ci.

Coroll. 2.

11. Chorda dupli arctis est dupla sinus ejusdem.

12. Nam Dd chorda DGd est (per num. 10.) dupla DH sinus DG, ac arcus DGd est duplus arcus DG.

Coroll. 3.

13. Quadratum radii aequatur summa quadratorum sinus, & cosinus arcus cuiusvis; ac differentiae quadratorum secantis, & tangentis. Quadratum vero secantis summa quadratorum tangentis, & radii:

14. Nam ob angulum CHD rectum, est (per pr. 7. Geom.) $CD^2 \equiv CH^2 + HD^2 \equiv DE^2 + DH^2$, & ob angulum CAF rectum, $CA^2 \equiv CF^2 - FA^2$, & $CF^2 \equiv FA^2 + CA^2$.

Coroll. 4.

15. Idem quadratum radii aequatur rectangulo sub cosinu, & secante, ac rectangulo sub tangente, & cotangente.

16. Est enim (per prop. 12. Geom.) ob triangula CED, CAF similia, $CE : CA \cdot CF$; adeoque (per pr. 13. Geom.) $CE \times CF \equiv CA \times CD \equiv CA^2$. Præterea cum sit angulus ICG aequalis (per Coroll. 1. def. 17. Geom.) alterno CFA; ac proinde similia triangula rectangula CAF, ICG; est $AF : AC :: CG : GI$, adeoque $AF \times GI \equiv AC \times CG \equiv CA^2$.

Coroll. 5.

17. Binorum arcuum quorumcumque tangentes sunt in ratione reciproca cotangentium.

18. Nam (per num. 15.) rectangulum sub tangentie, & cotangente primi aequatur rectangulo sub tangentie, & cotangente secundi; cum utrumque aequetur quadrato radii; ac proinde (per pr. 10. Geom.) illius tangens ad tangentem hujus est, ut cotangens hujus ad cotangentem illius.

Co-

140 TRIGONOMETRIA.

Coroll. 6.

19. In quovis arcu est cosinus ad finum, ut radius ad tangentem, ac est sinus ad radium, ut tangens ad secantem.

20. Est enim CE , sive DH . $ED :: CA$, AF , & ED , $DC :: AF$, FC .

Coroll. 7.

21. Sinus versus arcus quadrante minoris est differentia radii a cosinu, & arcus majoris summa.

22. Nam $AE \asymp AC - CE$, & $Ae \asymp AC + Ce$.

Coroll. 8.

23. Mutato utcumque radio functiones omnes arcuum similiū, vel angulorum æqualium mutantur in eadem ratione, & inter se rationem constantem servant.

24. Nam figura 1, aucto utcumque, vel imminuto radio CA , erit semper sibi similis, & omnia triangula habebunt eosdem angulos, quos prius; ac proinde ratio radii CA ad omnes alias lineas, & ratio earundem inter se, erit eadem ac prius.

Coroll. 9.

25. In quovis triangulo rectangulo si basis (cujus nimirum nomine in triangulis rectangulis soler intelli-
gi latuſ recto angulo oppositum, quod etiam hypothe-
nusa dicitur) habeatur pro radio, latera erunt sinus an-
gulorum oppositorum, & cosinus adiacentium; ac si la-
tuſ alterum habeatur pro radio, alterum latuſ erit tan-
gens, basis vero secans anguli adjacentis illi primo la-
teri, & oppositi huic secundo, ac illud cotangens, hæc
tosecans alterius anguli oppositi primo lateri, & adja-
centis secundo.

26. Sit enim quodvis triangulum CED rectangulum in E , & concipiatur circulus radio CD . In eo erit DE sinus arcus DA , vel anguli DCA , adeoque cosinus ar-
cus DG , & anguli DCG æqualis alterno CDE .

27. Sit vero quodvis triangulum CAF rectangulum in A , & concipiatur circulus radio CA . In eo erit la-
tuſ AF tangens, basis CF secans arcus AD , vel anguli
 ACF adjacentis AC , & oppositi AF ; adeoque illud co-

tan-

tangens, hæc cosecans anguli DCG, nimisum anguli CFA alterni, adeoque æqualis ipsi.

LEMMA GENERALE.

28. Binorum quantitatum semidifferentia addita semisummæ efficit majorem, subtrahita relinquunt minorem: ac si semidifferentia sit major quam semisumma, altera quantitas negativæ erit, quæ hic semper pro minori habebitur, cum habeatur ut minor etiam nihilo:

29. Sint in fig. 2. binæ quantitates AD, DB: Seceatur AB bifariam in C, sumaturque CE \leq CD, ut relinquatur AE \leq DB; eritque AC, vel CB semisumma, ED differentia, cujus dimidium CD additum semisummæ AC exhibet majorem AD, at idem ablatum a semisumma CB relinquit minutem DB:

30. Si vero earum quantitatibus altera sit Ad, & altera habita pro negativa Bd, summa negativæ & positivæ majorem minuit, adeoque erit AB summa, CB, vel CA semisumma, & facta Ae ex parte opposita Bd ipsi æquali, erit ed differentia, ejusque dimidium Cd majus ipsa semisumma CB. Adhuc tamen AC - Cd \leq Ad, & CB - Cd \leq Bd, sive parti alteri negativæ.

THEOREMA.

31. In binis arcibus quibuscumque summa sinus ad differentiam est, ut tangens semisummæ eorundem arcuum ad tangentem semidifferentię, & summa cosinus ad differentiam, ut cotangens semisummæ ad tangentem semidifferentię.

32. Sint enim in fig. 3. bini arcus AD, DB, & seceatur AB bifariam in E: erit AB summa eorum arcuum, AE semisumma, & (per num: 28.) DE semidifferentia. Ductis autem CD, CE, quibus AB occurrat in G, I, ac (per pr. 5. Geom., & ejus cor. 4.) fecerit bifariam, & ad angulos rectos in I, erit AI semisumma, GI semidifferentia binatum AG, GB, ac tandem ducantur AP, BQ perpendicularares CD, que erunt sinus arcuum AD, DB.

33. Jam vero ob triangula similia AGP, BGQ, que preter angulos rectos in P, & Q, habent angulos in G ad

742 TRIGONOMETRIA.

G ad veticem oppositos equales, erunt ii sinus, ut AG, GB, adeoque eorum semisumma ad eorum semidifferentiam ut AI harum semisumma ad semidifferentiam IG. At habendo CI pro radio, in triangulis CIG, CIA rectangulis sunt IG, IA tangentes angulorum ICG, ICA (per num. 25.). Sunt igitur etiam tangentes arcum qui eos metiuntur, ut eadem recte IG, IA. Quare semisumma sinuum arcuum AD, DB, ad eorum semidifferentiam, adeoque & eorum summa ad differentiam erit, ut tangens AE semisumme ipsorum arcuum ad tangentem ED eorum semidifferentie.

34. Completa jam diametro ACK, secetur bisariam etiam KB in M, & capiatur MN \asymp ED versus eandem plagam. Erit EM dimidium totius semicirculi, adeoque quadrans. Quare etiam DN erit quadrans, adeoque DB complementum BN: cumque relinquantur AD, NK equales alteri quadranti; erit AD complementum NK, & ipsorum BN, NK erit BM semisumma, BE, seu AE complementum semisumme, MN \asymp ED semidifferentia.

35. Cum igitur summa sinuum arcuum AD, DB ad eorum differentiam sit, ut tangens eorum semisumme AE ad tangentem eorum semidifferentie ED, erit summa cosinuum binorum arcuum KN, NB ad eorum differentiam, ut cotangens eorum semisumme ad tangentem eorum semidifferentie.

Scholion.

36. Multa alia theoremeta possunt facile demonstrari circa hafce arcuum functiones: sed hec ad usus, qui communiter occurunt, abunde sunt. Ut autem ea ad usum deduci possint, ostendendum est, quo pacto divisorio radio in quemlibet partium numerum invenire liceat, quot earum partium contineat quavis functio cuiusvis arcus, saltem eorum omnium, qui constant gradibus, & minutis, ut in tabulas ordinentur, & ubi opus fuerit presto sint.

37. Radius dividi potest in quoicunque partes libuerit, plerumque autem assumitur unitas cum quopiam numer-

numero cyphrarum o, ut 100000, 1000000, 10000000, vel alius aliquis ejusmodi numerus; ac si inventis functionibus pro aliquo majore radio, querantur eodem pro minore, habebuntur facile ope numeri 23. Sic si constructis tabulis pro radio 10000000, querantur pro radio 100000, satis est ex inventis functionibus rejicere postremas duas notas, & eas habere pro decimalibus; ita enim erit ille primus radius ad hunc novum, ut illa prima functio ad hanc novam.

38. Ut habeantur ejusmodi tabule, satis erit easconstruere usque ad 90 gradus; quoniam (per n. 9.) post gradus 90 eadem functiones redcunt. Porro inferius illud etiam ostendemus, quo pacto ordinandæ sint, ut complementa sibi e regione respondeant.

39. Interea notetur illud: evanescente in fig. 1. arcu AD, ubi punctum D congruat cum A, sinus rectus ED, & tangens AF evanescunt; sed secans CF evadit equalis radio CA. Crescente arcu, crescunt omnes tres, donec facto $AD = 90^\circ$, ubi punctum D abit in G, sinus DE fit equalis radio CG. Quamobrem radius appellatur etiam *sinus totus*, nimirum sinus totius quadrantis: tangens vero AF, & secans CF evadunt infinitè, cum fiant parallele, adeoque punctum F in infinitum recedat. Crescente vero arcu ita, ut quadrantem excedat, quemadmodum eum excedit Ad, quo magis ipse augmentatur, eo magis decrescit ejus sinus dø, tangens Af, secans Cf; donec illo abeunte in semicirculum, evanescat sinus, & tangens, ac secans fiat equalis radio.

40. Sinus autem versus AE, arcu evanescente, evanescit, crescente vero arcu, crescit, donec in arcu eequali quadranti equetur radio, & in semicirculo fiat equalis diametro AB.

§. II.

De constructione tabularum i

41. Si describeretur circulus ita magnus, ut radius haberet palmorum 1000000; dividi posset in gradus, & minuta, ac ductis sinibus, tangentibus, & secantibus, liceret earum mensuras capere; & invento in singulis palmorum numero; tabulas ita construere. Sed id & mechanicum esset; & ferme factu impossibile, potissimum ob immannem postremarum tangentium, ac secantium longitudinem: Computandae sunt igitur ope Geometriæ, & Arithmeticæ ejusmodi functiones, quæ tamen ob quantitates radicales, in quas incidit, accuratae haberi non possunt; sed tantummodo veris proximæ quantum libuerit: Multæ methodi ad contrahendum calculi laborem inventæ sunt; verum cum ita multæ jam computatae sint tabulae, non id agitur, ut immanni sane, ac inutili jam prorsum labore iterum computentur, sed ut Tyroni innoverescat; qua ratione computari possint. Trademus igitur methodum, quæ & captu facillima sit, & scopum attingat, ac licet in praxi non omnium expeditissima, nec justo tamen sit operosior:

P R O B L: I.

42. Data tangentie invenire secantem, & sinum.

43. Ex summa quadratorum radii, & tangentis extrahatur radix, & habebitur secans (per n. 13). Fiat ut secans ad tangentem, ita radius ad sinum quæsiriunt (per n. 19). Et erit factum:

P R O B L: II.

44. Datis tangentibus binorum arcuum non majorum quadrante invenire tangentem arcus medii arithmeticè proportionalis.

45. Ex datis tangentibus inveniantur secantes (per num. 41.): tum fiat ut summa secantium ad secantem minorem, ita differentia tangentium, ad quantitatem,

quæ

quæ addita tangenti minori, exhibebit tangentem quæfitam.

46. Sint enim in fig. 4. arcus dati AB, AE, medius Arithmeticè proportionalis AD, tangentes datæ AF, AH, quarum differentia erit HF, ac secantes inventæ CF, CH, tangens vero quæfita sit AG. Ob arcum BD \equiv DE rectæ CG bifariam secat angulum FCH. Igitur (per Cor. 4. pr. 12. Geom.) erit CH. $CF :: GH :: GF$. Quare componendo $CH = CF$, $CF :: HF :: FG$. Habetur autem AF \neq FG \equiv AG.

Coroll. 1.

47. Si alter e binis arcubus esset $\equiv 0$, abeunte B in A tangens AF, evanesceret, secans CF fieret æqualis radio, & AG ipsi FG. Quare problema mutaretur in hoc aliud. *Data tangentे arcus, invenire tangentem ejus di-*
midii, & solutio huc rediret: Inventa datâ arcus secante, fiat, ut summa radii, & secantis ad radium, ita tan-
gens data ad quæfita.

48. Si alter e binis arcubus fieret quadranti æqualis, abeunte E in I, CH, FH abirent in infinitum, & ratio summæ FC, CH ad FH abiret in rationem æqualitatis. Quare etiam esset $FC \equiv FG$. In eo igitur casu solutio huc redit: *Secans arcus minoris addatur tangentи ejusdem, & invenietur quæfita tangens*. Porro ejusmodi solutio pro eo casu sic etiam immediate demonstratur. Angulus FGC æquatur alterno GCI, cum quo in eo casu congruit GCH, cui æqualis est FCG. Quare in eo casu FGC = FCG, & $FC \equiv FG$

Coroll. 3.

49. Si utrumque simul contingere, altero arcu exi-
stente $\equiv 0$, altero $\equiv 90^\circ$; tangens AF arcus minoris evanesceret, ac secans FC evaderet æqualis radio, adeo-
que ipsi radio æqualis etiam quæfita tangens, arcus ve-
ro ille medius arithmeticus evaderet $\equiv 45^\circ$. Quare so-
lutio problematis in eo casu huc redit: *Tangens arcus*
 45° *equatur radio*. Id autem etiam immediate constat.
Si enim angulus ACG est semirectus, erit (per pr. 1. Geom.

semirectus etiam \widehat{AGC} ob angulum \widehat{GAC} rectum, adeoque triangulum CAG isoscele.

PROBL. III.

50. Datis functionibus binorum arcuum, qui inter se parum admodum differant, invenire functionem cujuscumque intermedii arcus dati veræ proximam.

51. Fiat ut differentia arcus minoris a majori, ad differentiam minoris ab intermedii, ita differentia datarum functionum ad quartum addendum functioni, quæ responderet arcui minori, vel ab ea auferendum, prout crescentibus arcubus functio crescit vel decrescit, ut habeatur functio quæsitæ.

52. Exprimantur enim in Fig. 5. & 6. segmentis AB cujuspiam rectæ arcus, & rectis BF ipsi perpendicularibus tangentes eorumdein. Omnia puncta F erunt in quadam linea continua MN ; quæ si curva sit, exigui arcus ejusdem haberi potuerunt pro rectis lincis. Exprimantur jam bini arcus inter se proximi rectis AB , AC , intermedius recta AD , functiones autem datae rectis BF , CE , quæsitæ functio recta DG , ac ipsas DG , CE secet in H , & I recta FI parallela BC . Habita FE pro recta linea erunt similia triangula EFI , GFH , eritque FI ad FH , sive BC ad BD , ut EI ad GH , nimisum differentiæ arcuum circuli ut differentiæ functionum. Porro GH erit addenda ipsi HD , vel FB in Fig. 5, demanda ab eadem in Fig. 6., ut habeatur DG ; quia ibi crescentibus arcubus functiones crescunt, hic decrescunt.

Scholium

53. Hac methodo utimur in quovis tabularum generere, in quibus bina quantitatuum genera a se invicem pendent, quarum nimisum exiguae differentiae habentur pro proportionalib[us] inter se, ac eadem usi sumus in arithmeticā (cap. 3. num. 36.) ad erudiant logaritmos numerorum intermediorum inter integros a tabula exhibitos: ac eadem utemur infra ad erudiant arcus, ope functionum intermediarum inter eas, quas tabule exhibent; uti satis erit considerare functiones

ut expositas segmentis AB, arcus vero rectis BF.

54. Pertinet hæc methodus ad methodum generaliorum, quam interpolationis dicunt: Semp̄t autem ritore procedit, ubi quantitates assumuntur ita inter se proximæ, ut differentiæ sint inter se proportionales; quod ex ipsis tabulis cognoscitur, & quidem admodum facile in iis tabulis, in quibus alterius generis quantitates & quæ se excedunt, ut in tabula logarithmorum numeri naturales. Tunc enim satis est assumere differentias quantitatuum iis respondentium, & si binæ hujusmodi differentiæ sint inter se proxime æquales, invenietur pariter quæsita quantitas proxime æqualis vera. Differentia logarithmorum numeri 832, & 833 est 5217, numeri 833, & 834 est 5210 proxime æqualis priori, ac proinde multo proprietas proportionalitati erunt differentiæ intermediæ inter ipsos numeros 832, 833.

55. Quod si plus aequo inæquales differentiæ deprehenderentur, tunc ad interpolationem non binæ tantum quantitates adhibendæ essent altera major, altera minor quæsita, sed plures, lege quadam, quam alibi exponeimus; nam ad usus trigonometricos, methodus traditæ sufficit fere semper.

P R O B L. IV.

56. Datō arcū quovis, qui quadrante sit minor, invenire ejus tangentem, secantem, sinum.

57. Arcus datus vel erit inter 0, & 45° , vel inter 45° , & 90° . Inveniatur per Probl. 2, & ejus Corollaria tangens arcus medii arithmeticè proportionalis inter eos, inter quos arcus datus jacet. Idem arcus datus jacebit inter hunc novum, & alterum e prioribus binis extremis. Habeantur igitur hi duo pro extremitatibus, & inveniatur tangens arcus medii arithmeticè proportionalis inter ipsos, ac ita fiat semper, donec deveniatur ad arcum datum, vel ad arcum dato proximum, quantum libet. Devenietur autem, quia differentia inter eos, qui assumuntur pro extremitatibus & datum concludunt, semper duplo minor evadet, ac proinde continuata operatione minuetur ultra quoscunque limites.

58. Inventa tangentē invenietur secans, & sinus (per num. 42.

Scholion 1.

59. Methodus hic exposita inveniendi tangentem arcus dati est admodum similis methodo indicata Arithmeticæ cap. 3 num. 31, inveniendi Logarithmum dati numeri. Potest autem hac methodo ope solius problematis secundi, nec serius, quam par est inveniri tangens, utcumque veræ proxima: nam in prima operatione distabunt arcus extremi per 45° , in 2° per 22° .

$30'$, in 3 per $11^\circ . 15'$, in 4 per $5^\circ . 37' \frac{1}{2}$ in 5 per $2^\circ . 48' \frac{3}{4}$ in 6 per $1^\circ . 24' \frac{3}{8}$ in 7 per $42' \frac{3}{16}$ &c ita porro.

60. At ubi jam deventum fuerit ad binos arcus satiis inter se proximos, potest plurimum contrahi labor ope Problematis tertii, inveniendo tangentem pro intermedio illo dato per differentias habitas pro proportionibus, quod ipsum in Logarithmorum investigatione liceret. Licebit autem tuto, ubi differentiæ extremarum a recens inventa in postrema operatione obvenerint inter se æquales.

61. Tacquetus in sua Trigonometria habet pro proportionalibus sinus arcus $45'$. Hac nostra methodo post sextam operationem institutam per propositionem 2, posset septima institui per prop. 3, cum extremorum differentia jam sit $42' . \frac{3}{16}$ tantummodo. Sed non solum pro radio ≈ 1000000 , sed etiam pro 100000, adhuc plus æquo inæquales sunt differentiæ in tanto intervallo.

62. Plerumque pro radio 100000, instituendæ erunt 9 operationes pro radio vero 10000000, saltem 12. Notandum tamen, cum in singulis operationibus contémnantur minores fractiones, assumendas esse saltem binas præterea decimalium notas, ne error in postremis integrorum notis committatur.

63. Porro ut methodus exemplo illustretur, quaeratur tangens $27^\circ . 42'$. In tabella sequenti operatio distincta

T R I G O N O M E T R I A. 149

Stincta est in 12 spatia, in quorum singulis habentur bini arcus cum tangentibus jam inventis, ac inter eos medius Arithmeticè proportionalis cum sua, præter postremum, in quo non medius Arithmeticè proportionalis adest, sed ipse arcus datus. Binæ decimales fractio-nes adhibitæ ad inveniendos integros minus accuratæ sunt; integrorum notæ accuratissimæ.

Arcus	Tangentes.	Arcus	Tangentes
I.		II.	
45° 0'.	10000000.00	45° 0'.	10000000.00
22. 30.	4142135.62	35. 45.	6681786.37
0. 0.	0.	22. 30.	4142135.62
III.		IV.	
33. 45.	6681786.37	28. 7. $\frac{1}{2}$	5345111.35
28. 7. $\frac{1}{2}$	5345111.35	25. 18. $\frac{3}{4}$	4729647.75
22. 30.	4142135.62	22. 30.	4142135.62
V.		VI.	
28.° 7' $\frac{1}{2}$	5345111.35	28.° 7' $\frac{1}{2}$	5345111.35
26. 43. $\frac{1}{8}$	5033577.98	27. 25. $\frac{5}{16}$	5188352.84
25. 18. $\frac{3}{4}$	4729647.75	26. 43. $\frac{1}{8}$	5033577.98

350 TRIGONOMETRIA.

Arcus	Tangentes	1	Arcus	Tangentes
VII.			VIII.	
28. $7\frac{1}{2}$	5345111.35		27. $46\frac{13}{32}$	5266478.81
27. $46\frac{13}{32}$	5266478.81		27. $35\frac{55}{64}$	5227353.18
27. $25\frac{5}{16}$	5188352.84		27. $25\frac{5}{16}$	5188352.84
IX.			X.	
27. $46\frac{13}{32}$	5266478.81		27. $46\frac{13}{32}$	5266478.81
27. $41\frac{17}{128}$	5246900.25		27. $43\frac{197}{256}$	5256685.58
27. $35\frac{55}{64}$	5227353.18		27. $41\frac{17}{128}$	5246900.25
XI.			XII.	
27. $43\frac{197}{256}$	5256685.58		27. $43\frac{197}{256}$	5256685.58
27. $42\frac{231}{512}$	5251791.92		27. 43	5253829.13
27. $41\frac{17}{128}$	5246900.25		27. $42\frac{231}{512}$	5251791.92

64. In computandis tabulis integris labor plurimum minueretur, cum operationes pro uno arcu instituta, pro pluribus haliis usui esse debeant, ut patet. Quin immo inventis tangentibus, & secantibus arcuum minorum gradibus 45, admodum facile reliquorum omnium tangentes invenientur. Nam (per num. 15.) divisorio quadrato radii per tangentem, habetur cotangens, & (per num. 48.) tangens arcus $45^\circ - a$, qui nimirum

nimirum est medius arithmeticè proportionalis inter 2α , & 90° , est $\frac{1}{2} \tan \alpha + \frac{1}{2} \sec \alpha$; ac multa ejusmodi compendia haberi possunt.

Scholion 2.

65. Computatis sinibus, tangentibus, ac secantibus, possunt etiam earum functionum logarithmi computari methodo exposita in Arithmetica (cap. 3. num. 31, & 38). Adsumt autem plures methodi computandi logarithmos functionum ipsarum immediate. Sed hic satis est indicare rationem aliquam, qua inveniri possint. Porro ipsos quoque earum functionum logarithmos appellabimus in posterum pariter functiones.

P R O B L. V.

66. Functionum computatarum tabulas ordinare.

67. Tabula sex columnas contineat. In prima scribantur arcus, nimirum gradus, vel graduum minuta, in secunda sinus, in tertia tangentes, in quarta secantes iis respondentes, in quinta logarithmi sinuum, in sexta logarithmi tangentium. Porro arcus ipsi in pagina sinistra incipient a 0 , & descendendo perpetuo crescant, & in pagina dextra incipient a 90° , & perpetuo crescant: & erit factum.

Coroll.

68. Civis arcui existenti in altera pagina respondebit e regione in altera ejus complementum, adeoque & cosinus, cotangens &c.

69. Nam initio 90 , & 0 quadrantem compleat, ac deinde semper quantum in altera pagina additur, tandem in altera derrahitur.

Scholion.

70. Logarithmi in tabulis aptari solent radio 1000000000; ut nimirum logarithmus radii, qui in calculis trigonometricis sapissime occurrit, sit 10.00 &c., ac proinde facile & addi possit, & derahi.

71. Secantium Logarithmi adscribi non solent; cum siidem admodum facile eruantur ex Logarithmis cosinuum. Cum enim (per num. 15.) quadratum radii divisum per cosinum exhibeat secantem; satis erit e

152 TRIGONOMETRIA.

Duplo Logarithmo radii, sive ex 20.000 &c. subtrahere Logarithmum cosinus.

72. Ut exempla deinceps aliqua dari possint, adjecimus ad calcem hujus tractatus binas tabulas alteram Logarithmorum numerorum naturalium usque ad 1000, alteram harum functionum pro solis gradibus, ex quibus per num. 50, & 51) inveniri poterunt etiam functiones pro minutis. Aptati autem sunt sinus, tangentes, secantes radio 100000. 00, Logarithmi autem Logarithmo radii 10. 000 &c., sive radio continent cyphras nullitatis decem.

§. III.

De usu tabularum

73. Usus tabularum, quem hic exponimus, reducitur ad bina Problemata, quorum altero ex datis arcibus querantur functiones, altero contra arcus e functionibus.

P R O B L. I.

74. Dato quovis arcu, eruere e tabulis functionem ipsi respondentem.

75. Si arcus datus non sit quadrante major, & solos gradus contineat; invenietur in prima columnia paginae sinistrae, vel dexteræ, prout fuerit minor vel major 45° , ac e regione ipsius in eadem pagina respondebit in secunda columnia sinus, in tertia tangens &c., ac in altera pagina complementum cosinus, cotangens &c.

76. Si praeterea contineat minuta; inveniatur functio arcus proximè majoris, & proximè minoris ac capiatur earum differentia: arcuum autem differentia erit 1° , vel $60'$. Fiat igitur ut $60'$ ad numerum minutorum, qui in arcu dato continentur supra numerum graduum, ita differentia functionum etatarum e tabulis ad quartum, qui addatur functioni respondenti arcui minori, si queritur sinus, tangens &c., quæ crescentे arcu crescunt, vel diminuntur, si queritur cosinus, cotangens &c., quæ illo crescente.

scentē contra décrescunt ; & habebitur quæsita functio (per num. 50. & 51).

77. Quod si arcu quadrantem excedat , subtrahatur à 180° , ac residui inveniatur functio , quæ erit functio arcus dati (per n. 9).

Scholion.

78. Hac methodo habebunt functiones etiam pro minutis ita accuratae , ut nullus in minutis ipsis committatur error , prorsus ut in vulgaribus tabulis continentibus gradus , & minuta eadem prorsus methodo eruuntur pro minutis secundis , sine ullo in ipsis secundis errore , atque id ubique præter arcus quadranti nimis proximos , in quibus differentiae multo magis inæquales sunt , & error comittitur aliquanto major .

79. Et quidem in sinibus , tangentibus , ac secantibus plerumque vix ullus , vel admodum exiguis aderit error in nota integrarum postrema : at decimales illæ fractiones haud accuratae provenient ; quas idcirco in sequentibus exemplis omittemus , vel pro unitate computabimus : ut etiam in Logarithmis rejiciemus postremas binas notas , quæ la veris abluderent . In vulgaribus tabulis , si arcus non sint nimis proximi quadranti , assumpto radio cum septem cyphris 0 , omnes pro minutis etiam secundis accuratae obveniunt .

80. At sublimiore illa interpolationis methodo , de qua mentionem fecimus num. 55 , ternis adhibitis functionibus , vel quaternis , possunt habeti accuratae etiam pro minutis , & secundis , omnes harum quoque tabularum functiones . Sed ea sublimior est , quam ut hic proponenda videatur . Præbebimus igitur exemplum methodi expositæ num. 75 .

81. Detur arcus $27^{\circ} \cdot 43'$, & queratur tangens . In tabulis tangens $28^{\circ} = 53171.$, tang. $27^{\circ} = 50953$, quarum differentia 2218 . Fiat igitur ut 60 ad 43 , ita 2218 , ad quartum : prodit 1590 , quo addito tangenti 50953 , habebitur tangens quæsita 52543 . Porro eam num. 63 invenimus 5253829 , pro radio 10000000 , adeoque 52538 . pro radio 100000. , quæ ab hic inventa

154 TRIGONOMETRIA.

venta differt per 5. Cum vero differentia debita minutiis 60 inventa sit 2218, adeoque uni minuto 37; ex hoc 5 particularum errore, ne septimæ quidem partis unius minutū error committitur.

P R O B L. II.

82. Data functione invenire arcum, cui respondet.

83. Si functio data inveniatur in tabulis; invenietur etiam arcus ipsi ē regione respondens. Si vero ea in tabulis non habeatur; inveniatur in iisdem functio proxime minor, & proxime major, ac fiat ut harum differentia ad differentiam proxime minoris a proposita, ita 60' ad numerum minutorum addendum arcui respondenti functioni minori, si ea sit sinus, tangens &c., demandum ab eo si sit cosinus, cotangens &c. Porro tam arcus ita inventus erit is, qui habebit functionem illam dataam (per num. 53), quam is qui proveniet eo ablato a 90° (per n. 2).

Scholion.

84. Detur Logarithmus tangentis 9. 87343, & queratur arcus. In tabulis logarithmus tangentis proxime major, omissis postremis binis notis, est graduum 30 = 9. 87711, proxime minor graduum 36 = 9. 86126. Differentia secundi a primo est 1585, secundi a proposito 1217. Fiat igitur ut 1585 ad 1210, ita 60 ad quartum, & prodit 46' omissis fractionibus. Arcus igitur quæsitus est $36^\circ . 46'$.

TRIGONOMETRIA. 155

PARS SECUNDA.

De resolutione triangulorum planorum.

§. I.

De Triangulis rectangulis.

85. PRO resolutione triangulorum rectangulorum adhibebimus sequentes tres canones, quos ubi demonstraverimus, proponemus unicum problema, quo omnes casus triangulorum rectangulorum complectemur, ac singulis casibus apponemus exempla, pro quibus eruemus e tabulis hic adjectis functiones ex arcubus, & arcus e functionibus, licet functiones ita erunt non nihil discrepabunt a veris, ita tamen, ut nec in angulis error minutus primi, nec in basibus error integræ partis occurrat.

86. I. In triangulo rectangulo angulorum obliquorum alter est complementum alterius; ac proinde dato altero datur etiam alter.

87. Patet ex prop. 1. Geom.

88. II. Basis ad latus est ut radius ad sinum anguli oppositi ipsi lateri, vel ut secans anguli ipsi adjacentis, ad radium, vel ut secans anguli ipsi oppositi ad ejus tangentem.

89. Patet ex num. 25, si habeatur pro radio prius basis, tum ipsum latus, ac demum latus alterum.

90. III. Alterum latus est ad alterum, ut radius ad tangentem anguli adjacentis primo, vel ut tangens anguli ipsi oppositi ad radium, vel ut sinus anguli ipsi oppositi, ad sinum adjacentis.

91. Patet ex eodem numero, habendo pro radio prius primum latus, tum latus secundum, ac demum basim.

PROBLEMA.

92. Datis in triangulo rectangulo plano præter angulum

156 TRIGONOMETRIA.

gulum rectum binis aliis ad ipsum triangulum pertinētibus, reliqua invenire.

93. *Casus 1.* Si dēntur bini anguli, perinde erit, ac si daretur unicus; cum alter innotescat p̄ canon. I. in eo casu solum habebitur ratio, quæ intercedit inter latera, & basim, ope canon. II, & III. ex: gr: sumpto radio, & binis angulorum sinibus, ii per can. II. expriment rationem, quæ intercedit inter basim, & latera ipsis angulis opposita.

94. Sint in fig. 7. $A = 57^\circ$ erit $C = 90^\circ - 57^\circ = 33^\circ$; eruntque AC; BC, AB, ut 100000. 00.83867. 06, 54463.49.

95. *Casus 2.* Detut basis, & alter angulus. Invenietur angulus alter per canon. I., latus oppositum utrilibet angulo per can. II, adhibita quavis ex tribus proportionibus ejusdem canonis.

96. Sit AC = 875, A = 57° erit C = 33°. Fiet autem ut radius 100000 ad sin. A = sin. 57° = 83867, ita AC = 875 ad BC = 733.8 &c., sive 734.

97. Quod si habeantur Logarithmi, facilius invenietur summando Logarithmum sinus 57° = 9.92359, ac Log. AC = Log. 875. = 2.94201, & demendo Logarithmum radii = 10.00000. Erit nimurum Log. BC = 9.92359 - 2.94201 = 10.00000 = 3.86560, cui Logarithmo numerus proximus in tabulis est 734.

98. *Casus 3.* Detut basis, & alterum latus. Invenietur alter angulus per can. II. adhibita altera, e prioribus bins proportionibus. Hinc alter angulus innotescet per can. I, ac deinde latus alterum, adhibita quavis e tribus proportionibus, sive canonis II., sive III.

99. Sit AC = 627, AB = 356. Erit per can. II, Log. sin. C = Log. AB - Log. radii - Log. AC = Log. 356 - Log. radii - Log. 627 = 2.55145 - 10.00000 - 2.79727 = 9.75418. Adeoque C = 34°. 26', qui nimurum angulus invenitur per num. 33. Hinc angulus A = 90° - 34°. 36' = 55. 24' per can. I, & Log. BC = Log. sin. A - Log. AC - Log. rad. = 9.91544 - 2.79727 - 10.00000 = 2.71271, adeoque BC = 516.

100. *Casus 4.* Dentur bina latera. Invenietur alter angulus ope utriuslibet e binis prioribus proportionibus canonis III. tum alter angulus per can. I, ac demum basis pér quamvis e tribus proportionibus canonis II.

101. Sit $AB \approx 476$, $BC \approx 595$, erit per can. III Log. tang. $A \approx \text{Log. } BC - \text{Log. rad.} \approx \text{Log. } AB \approx \text{Log. } 595 + \text{Log. rad.} \approx \text{Log. } 476 \approx 2.77452 + 10.00000 = 2.67761 \approx 10.09691$. Adeoque $A \approx 51^\circ 20'$. Quare, per can. I, $B \approx 38^\circ 40'$, & per can. II, $\text{Log. } AC \approx \text{Log. } BC - \text{Log. rad.} \approx \text{Log. sin. } A \approx \text{Log. } 595 + \text{Log. rad.} \approx \text{Log. sin. } 51^\circ 20' \approx 2.77452 - 10.00000 = 9.89251 \approx 2.88201$, adeoque $AC \approx 762$.

Scholion.

102. Sic omnes rectangulorum solvuntur casus. In casu quarto, potest etiam sine Trigonometria obtineri basis AC , extrahendo radicem e summa quadratorum laterum, & in casu tertio latus BC extrahendo radicem ex differentia quadrati basis AC , & quadrati lateris AB . Nimirum ibi est $AC \approx \sqrt{(226576 - 354025)} \approx \sqrt{580601} \approx 762$, hic $BC \approx \sqrt{(393129 - 126736)} \approx \sqrt{266393} \approx 516$. Immo quia facile deducitur ex demonstratione corol. 2. pr. 13. Geom. differentiam quadratorum binarum quantitatum quarumcumque æquari producto ex earum summa & differentia, facilius eruetur latus, ducendo in se invicem summam basis, & lateris dati, ac differentiam, & extrahendo radicem, quo pacto & Logarithmi adhiberi possunt. Sic in ipso casu tertio cum sit $AC \approx AB \approx 983$, $AC - AB \approx 271$; erit $BC \approx \sqrt{271^2 + 983^2} \approx \sqrt{266393} \approx 516$, & $\text{Log. } BC \approx \frac{1}{2}(\text{Log. } 271 + \text{Log. } 983) \approx \frac{1}{2}(2.43297 + 2.99255) \approx \frac{1}{2} \times 5.42552 \approx 2.71276$, adeoque $BC \approx 516$, ut prius.

103. Supereft monendum tantummodo in casu 3, si basis non fuerit major latere, casum fore impossibilem, ut patet ex eo, quod basis debeat habere quadratum æ quale

quale summae quadratotum laterum. Sed id ipsum calculus quoque indicaret: Nam si assumetur basis AC æqualis lateti AB; sinus anguli C obvertiret æqualis radio, & proinde angulus ipse rectus; ac angulus A nullus. Si autem assumetur basis minor latere, sinus ille prodit radio major, quod est absurdum:

§. II.

De triangulis obliquangulis.

104. **T**res alii canones exhibebunt solutionem triangulorum obliquangulorum. At primum in quovis triangulo obliquangulo ACB (fig. 8, & 9) habito quovis latere, ut AB, pro basi, concipiatur demissum ab angulo ipsi opposito C perpendiculum CI in ipsum latus, quod cadet intra basim, si uterque angulus ad basim acutus fuerit, ut in fig. 8; & extra ipsam, si alter fuerit obtusus, ut in fig. 9.

105. Binas rectas AI, BI dicimus segmenta basis etiam in casu figuræ 9, in quo I cadit extra basim ad partes B, quo casu segmentum BI consideramus, ut negavimus. Quamobrem si sumatur ID æqualis, & opposita BI, in utroque casu dicimus AB summam, AD differentiam ipsorum segmentorum, quæ differentia in casu figuræ 9 erit major quam summam. Segmentum AI dicimus adiacens lateri AC, & angulo A, ac oppositum lateri BC, & angulo C; contra vero segmentum BI adiacens his, oppositum illis.

106. Patet vero hoc Theorema. Segmentum majus lateri majori adjacet. Quadratum enim segmenti cum quadrato perpendiculi CI utrobique communi æquatur quadrato latetis adiacentis, ob angulos ad I rectos. En autem ipsos canones.

107. IV. In quovis triangulo latera sunt, ut sinus angulorum oppositorum.

108. Nam in triangulo rectangulo AIC, per can. II., sit AC ad IC, ut radius ad sinum anguli CAI, vel CAB,

$\hat{C}AB$, ac in triangulo BIC est IC ad BC , ut sinus anguli CBI , qui etiam in fig. 9. est idem ac sinus CBA (per num. 9.) ad radium. Quare ex æqualitate perturbata est (per num. 21, cap. 2. Arith.) latus AC ad latus BC , ut sinus anguli CBA oppositi primo ad sinum CAB oppositi secundo:

109. V. In quovis triangulo summa binorum laterum ad differentiam est, ut tangens semisummae angulorum ad basim, quæ æquatur complemento dimidiæ anguli lateribus intercepti, ad tangentem semidifferentiæ:

110. Cum enim sint ea latera, ut sinus angulorum oppositorum; erit eorum summa ad differentiam, ut summa eorum sinuum ad differentiam, nimurum (per num. 21) ut tangens semisummae eorum angulorum, ad tangentem semidifferentiæ. Cum vero omnes simul anguli conficiant 180° ; binorum dimidium, cum dimidio tertii continent 90° ; ac proinde binorum semisumma, est complementum dimidii tertii.

111. VI. In quovis triangulo summa segmentorum basis, sive basis ipsa est ad summam laterum, ut horum differentia ad differentiam illorum.

112. Nam ob $DI \cong BI$, & CI communem triangulis rectangulis CID , CIB , erit (per pr. 2. Geom.) etiam $CD \cong CB$. Quare circulus centro C , & radio CB descriptus transibit per D . Secabit autem AC productam, quantum opus fuerit, in E versus A , & in F ad partes oppositas, eritque AF summa, AE differentia laterum AC , CB , ac erit AB , $AE :: AF \cdot AD$ (per pr. 13. & 10. Geom.)

PROBLEMA.

113. Tribus datis in triangulo obliquangulo, reliqua invenire.

114. Casus 1. Si dentur tres anguli; perinde erit, ac si dentur bini tantum; tertius enim invenitur, si eorum summa auferatur a 180° . Porro in eo casu solum invenitur ratio laterum, quæ per can. IV est eadem, ac ratio sinuum angulorum oppositorum.

115. Casus 2. Dentur bini anguli, & unum latus.

Ter-

Tertius angulus invenitur per num. 114. Tum utrumvis e reliquo lateribus invenitur per can. IV, si fiat, ut sinus anguli oppositi lateri dato ad sinum anguli oppositi lateri quæsito, ita latus datum ad quæsitum.

116. *Casus 3.* Dentur bina latera cum angulo alteri eorum opposito. Invenietur per can. IV, sinus anguli oppositi alteri lateri dato, factis ut primum illud latus ad hoc secundum, ita sinus anguli dati ad sinum anguli quæsiti. Invento sinu, eruentur e tabulis (per num. 83) bini anguli ipsi respondentes, alter acutus alter obtusus, complementum acuti ad 180° .

117. Hinc binas hic casus solutiones habere poterit, & ambiguus s^epe erit, quod in ipsa Fig. 3 est manifestum, in qua triangula ACB, ACD, habent eandem magnitudinem laterum AC, CB & AC, CD, ac eundem angulum A oppositum lateri CB. Angulus autem acutus CBD, cum æquetur (per Cor. 2. prop. 2. Geom.) angulo CDB, est complementum ad duos rectos anguli CDA.

118. Quare aliunde definienda erit species alterius anguli oppositi alteri e lateribus datis, nimirum an debeat esse acutus, an obtusus, & si forte latus oppositum angulo dato fuerit majus altero latere, constabit assumendum esse angulum acutum. Si enim is obtusus esset, multo magis deberet esse obtusus alter angulus lateri majori oppositus, & in triangulo bini anguli binos rectos excederent.

Invento autem secundo angulo, invenietur tertius, & ejus ope tertium latus (per num. 115).

119. *Casus 4.* Dentur bina latera cum angulo intercepto. Invenietur utervis reliquorum angiorum factis, per can. V, ut summa datorum laterum ad differentiam, ita cotangens dimidii anguli dati ad tangentem anguli, qui, ubi inventus fuerit, additus complemento dimidii anguli dati exhibebit angulum oppositum lateri majori, ablatus exhibebit oppositum minori. Inventis autem angulis invenietur latus tertium, ut in casu II.

120. *Casus 5.* Dentur tria latera. Invenietur quivis angu-

angulus, habendo pro basi alterum e lateribus; quibus concluditur. Factis enim prius per can. VI, ut ea basis ad summam reliquorum laterum, ita eorumdem differentia, ad differentiam segmentorum basis, ac hujus dimidio addito semisumma segmentorum basis, sive dimidiæ basi (per n. 105), vel ab ea ablati, habebitur (per num. 28) segmentum basis majus, vel minus; ac assumendum erit illud, vel hoc (per num. 106), prout latus adjacens angulo quæsito erit majus, vel minus opposito. Tum vero, per can. I, fiat ut latus adjacens ad hoc segmentum, ita radius ad cosinum anguli quæsiti.

121. Porro invento cosinu invénientur bini anguli ipsi respondentes alter acutus, alter obtusus. Assumendus autem erit acutus semper præter casum, in quo segmentum ex subtractione proveniens fuerit adhibitum, & existente semidifferentia majore, quam semisumma, evaserit negativum.

122. Invento angulo opposito uni e lateribus, ope can. IV admodum facile invenitur angulus oppositus cuilibet e binis reliquis.

Scholion.

123. Exempla sibi quisque facile assumet. Unicum afferemus casus quarti. Sint tria latera 745, 647, 421, & quæratur angulus oppositus primo. Fiat basis secundum ex iis 647, & reliquorum summa erit 1166, differentia 324. Factis igitur ut 647 ad 1166, ita 324 ad quartum, prodit 584, cuius dimidium 292 additum, ac ablatum dimidiæ basi 323, exhibet bina segmenta 615, ac 31. Quoniam vero latus adjacens angulo quæsito 421 est minus opposito 745, adhibendum est segmentum minus, nempe 31; ac faciendum, ut latus adjacens 421 ad 31, ita radius ad cosinum anguli quæsiti, cuius cosinus logarithmus erit idcirco $\equiv \text{Log. } 31 - \frac{1}{4} \text{ Log. rad.} - \text{Log. } 421 \equiv 1.49136 - \frac{1}{4} 10.00000 - 2.62428 \equiv 8.86708$, adeoque angulus respondens tam $85^\circ . 47'$, eru-tus e tabulis, quam ejus complementum ad duos rectos: sed assumendus est ipse $85^\circ . 47'$; cum differentia seg-

mentorum. 584 obvenerit minor, quam summa, sive
quam basis 647.

124. Notandum autem, aliquando problema posse e-
vadere impossibile: nimis in casu 1, & 2, si bini
anguli dati simul non sint minores duobus rectis: in
casu 4 si latus oppositum angulo dato sit nimis exigu-
um, nimis minus perpendiculari CI: in casu 5, si bi-
na latera datae simulte majora non sint. At in omni-
bus iis casibus impossibilitatem manifestabit ipse calcu-
lus; vel enim sinus aliquis obveniet radio non minor,
vel aliqua secans eodem non major, vel aliquod seg-
mentum non minus latere adjacente. In solo casu 4
problemata est semper possibile.

P A R S T E R T I A.

De resolutione triangulorum sphæricorum.

§. I.

*De angulorum, & triangulorum sphæricorum natura, &
proprietatibus quibusdam.*

Definitio I.

125. Circuli, quorum plana transeunt per centrum
sphæræ, dicuntur circuli sphæræ maximi.

126. Maximos revera esse patet ex num. 142 Solid.

Coroll. I.

127. Circuli maximi se omnes mutuo bifariam secant,
& communis intersectio planorum eorumdem est dia-
meter sphæræ.

128. Cum enim omnium plana per centrum tran-
seant; sibi occurruunt in ipso centro; ac proinde paralle-
la non sunt; adeoque se invicem secant in aliqua re-
cta, quæ cum transeat, per centrum sphæræ quod ipsis
commune est (per num. 142. Solid.) ; ipsa eorum
planorum intersectio, & erit diameter eorum circu-
lorum,

lōrum, quos proinde secabit bifaria, & erit diameter sphæræ.

Coroll. 2.

129. Per quævis bina puncta assumpta in superficie sphæræ potest duci circulus maximus, & per quodvis punctum potest duci circulus maximus cujus planum sit perpendicularare piano dati circuli maximi:

130. Patet primum, quia per data duo puncta, & centrum potest duci planum (per n. 7. Solid.) cuius sectio cum superficie sphæræ erit circulus (per num. 142. Solid.); & maximus (per num. 124), ac transibit per data puncta:

131. Patet secundum, quia ex illo dato punto potest demitti perpendicularum in planum dati circuli maximi, (per n. 45. Solid.) & per ipsum, ac centrum potest duci planum (per n. 73. Solid.), cuius sectio erit circulus maximus, ac ejus planum erit perpendicularare piano dati circuli maximi (per n. 64. Solid.).

Definitio 2.

132. Diameter sphæræ perpendicularis piano circuli orti ex sectione sphæræ in ipsius sphæræ superficie, dicitur axis, & extrema axis puncta dicuntur poli.

133. In fig. 10. Pp est axis circulorum EFH, ABD, quorum plana pertinidunt in G; & C ad angulos rectos: P, p sunt eorumdem poli.

Coroll. 1.

134. Axis transit per centrum circuli, cuius est axis.

135. Si circulus sit maximus, patet; cum axis transeat per centrum sphæræ (per n. 132), cum quo quisvis circulus maximus commune centrum habet (per n. 142. Solid.).

136. Si autem circulus non sit maximus, ductis ad bina quævis ejus puncta F, H rectis ex C, & ex osculo axis G cum ejus piano, erunt recti anguli CGF, CGH (per n. 13. Solid.), cum nimis axis sit perpendicularis piano FGH (per n. 132). Quare quadrata GF, GH, erunt (per prop. 7. Geom., excessus qua-

dratorum æqualium CF, CH supra quadratum CG, adeoque æqualia; & proinde quævis GF æqualis eidem GH, & G centrum circuli.

Coroll. 2.

137. Omnia puncta peripheriae cujuscunque circuli in superficie sphæræ distant per æquales arcus circulorum maximorum ab eodem suo polo.

138. Si enim assumantur bina ejusmodi puncta quæcunque H, & F, & per ea, ac polum P ducantur circuli maximi (per num. 129) PHp, PFp, & radii HC, FC, HG, FG, pater ex demonstratione præcedentis corollarii fore æqualia triangula GCH, GCF, adeoque & eorum angulos ad C, & proinde etiam arcus PH, PF æquales fore.

Coroll. 3.

139. Circulus maximus ab utrolibet suo polo distat quaquaversus per quadrantem circuli maximi, & circulus, cuius aliquod punctum distat a polo suo per quadrantem circuli maximi, est maximus.

140. Si enim circulus fuerit maximus, ut ABD, transibit per centrum C, & radii CB, CD, qui erunt ejus intersectiones cum planis PFp, PHp, erunt perpendiculares axi PCp, qui toti plano BCD perpendicularis est; ac proinde tam arcus PB, PD, quam pB, pD erunt quadrantes.

141. Si autem circulus non fuerit maximus ut EHF, non transibit ejus planum per centrum; ac proinde fæta (per n. 50. Solid.) sphæra per centrum piano ABD parallelo ipsi EHF, erunt PB, PD, pB, pD quadrantes: adeoque PF, PH minores iis, & pF, pH majores erunt. Nullum igitur punctum circuli non maximi distat per quadrantem a suo polo; adeoque is, cuius aliquod punctum ita distat, maximus est.

Definitio 3.

142. Angulus sphæricus dicitur is, quem in superficie sphære continent bini arcus circulorum maximorum, ubi concurreunt, pro cuius mensura ipsi equali consideratur angulus rectilineus, quem continent rectæ jacentes

TRIGONOMETRIA: 165

tes cum iisdem arcibus in iisdem planis, & ad easdem partes, ac eos tangentes in ipso concursum.

143. EPH est angulus sphericus, cui substituitur pro ejus mensura angulus rectilineus fPb , quem continent tangentes fP , bP in P.

Coroll. 1.

144. Si arcus supra arcum cadit, duos angulos facit aut rectos, aut simul duobus rectis aequales.

145. Nam tangens fP cum tangentie eh duos angulos facit, aut rectos, aut duobus rectis aequales (per cor. 2. def. 10. Geom.).

Coroll. 2.

146. Si bina anguli latera ultra verticem producantur; angulos ad verticem oppositos aequales continebunt.

147. Si enim tangentes fP , bP producantur ultra verticem P, continebunt angulos ad verticem P aequales (per cor. 4. def. 10. Geom.).

Coroll. 3.

148. Si plana laterum fuerint sibi invicem perpendicularia; angulus erit rectus: & si angulus fuerit rectus; plana laterum erunt sibi invicem perpendicularia.

149. Si enim planum Fpp fuerit perpendicularare plano Hpp ; tangens fP , que est perpendicularis diametro Pp (per cor. 5. & 6. prop. 8. Geom.), communi intersectioni eorum planorum, erit (per n. 66. Solid.) perpendicularis toti plano Hpp , adeoque & tangentis Ph .

150. Si autem tangens fP fuerit perpendicularis tangentis Ph , cum etiam sit perpendicularis diametro Pp (per cor. 5. pr. 8. Geom.), erit (per num. 18. Solid.) perpendicularis toti plano Hpp , ac proinde & planum FPh erit (per n. 64. Solid.) perpendicularare eidem.

Coroll. 4.

151. Si è quovis puncto diametri transversali per verticem anguli exstant in planis arcuum, quibus continebuntur, bine recte ipsi perpendicularares; angulum continebunt rectilineum sphericum aequalem.

152. Si enim ejusmodi recte fuerint GF, GH, erunt eae (per Cor. 1. def. 17. Geom.) parallelae rectis Pf, Ph

166 TRIGONOMETRIA.

perpendicularibus eidem diametro Pp ; ac proinde angulus FGH erit (per n. 41, Solid.) equalis angulo fPh .

Coroll. 5.

153. Angulus sphericus est equalis angulo, quem continent plana arcuum continentium ipsum angulum sphericum.

154. Nam eorum planorum angulum, sive inclinationem plani ad planum exhibet idem angulus rectilinus FGH (per n. 57. Solid.).

Coroll. 6.

155. Mensura equalis angulo sphérico erit arcus circuli cuiuscumque habentis polum in ejus vertice interceptus inter ejus crura.

156. Secta enim sphera plano quovis ABD , vel EFH perpendiculari ad diametrum Pp , communem intersectionem planorum arcum PF , PH , sectio erit circulus habens polum in P (per n. 132) cuius arcus BD , vel FH interceptus cruribus PF , PH erit mensura equalis angulo BCD , vel FGH , qui cum contineatur radiis BC , DC , vel FG , HG perpendicularibus axi Pp , equatur angulo sphérico FPh (per n. 151).

Coroll. 7.

157. Si anguli sphericci crura producantur; iterum concurrent ita, ut singula semicirculum compleant, & angulum sphericum contineant priori equalē.

158. Cum enim PCp sit diameter utriusque arcus PF , PH ; debet uterque productus transire per p ; eruntque PFp , PHp semicirculi, & angulorum FpH , FPh mensura erit idem arcus BD , vel FH (per n. 155).

Coroll. 8.

159. Circulus maximus circulo maximo perpendicularis transit per ejus polos, & si circulus maximus transit per polum circuli maximi, est ipsi perpendicularis.

160. Sit enim circulus maximus PBp perpendicularis circulo maximo ABD ; erit planum PBp perpendicularare piano ABD (per num. 149). Quare in eo jacebit axis circuli ABD (per n. 66. Solid.), cum sit perpendicularis piano ABD (per n. 133) & transeat per BC inter-

sc.

TRIGONOMETRIA. 167

sectionem planorum ABD, PBp. Ac proinde poli, qui sunt extrema axis puncta (per n. 133) jacebunt in ipsa peripheria circuli PBp.

Defin. 4.

161. Triangulum sphæricum dicitur, quod continetur in superficie sphære tribus arcibus circulorum maximumrum, qui dicuntur ejus latera.

Coroll. 1.

162. Si in triangulo sphærico binī anguli fuerint recti; latera iis opposita erunt quadrantes: & si bina lata fuerint quadrantes, anguli iis oppositi erunt recti; ac in utroque casu tertium latus erit mensura equalis tertio angulo sibi opposito.

163. Si enim sint anguli PBD, PDB recti, polus circuli ABD, qui debet jacere in utroque circulo BP, DP (per n. 159), cadet in ipsam eorum intersectionem, sive in anguli verticem P; ac proinde PB, PD quadrantes erunt (per n. 139).

164. Si autem arcus PB, PD fuerint quadrantes; anguli BCP, DCP erunt recti; ac proinde recta CP perpendicularis piano BCD (per n. 18. Solid.): & idcirco plana arcuum PB, PD perpendicularia erunt piano arcus BD, & anguli PBD, PDB recti (per n. 148).

165. In utroque casu, cum P sit polus circuli BD, arcus BD est mensura equalis angulo BPD (per num. 155).

Coroll. 2.

166. Si omnes anguli fuerint recti; omnia latera erunt quadrantes, & si omnia latera fuerint quadrantes, omnes anguli erunt recti.

167. Si enim etiam tertius angulus fuerit rectus, etiam tertium latus erit quadrans, & viceversa (per n. 165).

Scholion 1.

168. Hinc patet resolutio trianguli habentis omnes angulos, vel saltem binos rectos, in quibus nullum opus est tabulis functionum. Superest igitur ut agamus de triangulis, in quibus unus angulus est rectus, que di-

168 TRIGONOMETRIA:

cuntur rectangula, ac de iis, in quibus rectus est nullus, quæ obliquangula appellantur. Ac in illis quidem appellatur basis latus illud, quod recto angulo opponitur; in his latus quocunque pro basi assumi potest.

Scholion 2.

169. Consideratio trianguli sphærici eodem recidit cum consideratione anguli solidi constituti a tribus angulis planis ut innuimus n. 91. Solid. Consideretur enim in fig. 11. angulus solidus, quem continent tres anguli plani BCD, BCA, ACD, & concipiatur radio CB sphæra occurrens eorum angulorum planis in BD, AD, AB. Hi tres arcus continebunt triangulum sphæricum BAD, cuius latera mēnsurabuāt angulos illos planos ad C, anguli vero ad B, D, A, erunt æquales inclinationibus, seu angulis, quæ plana eorundem angulorum continent cum planis contiguis (per n. 153). Quare, quæ demonstrantur de eo angulo solidō pertinent ad triangulum sphæricum, & viceversa.

170. Porro hinc, & ex iis, quæ in Solidis a num. 82. de angulo solidō vel demonstravimus, vel innuimus inferuntur juxta n. 91 ipsorum solidorum sequentes triangulorum sphæricorum proprietatēs.

171. In quovis triangulo sphærico, tria latera simul circulo minora sunt; potest autem eorum summa in infinitum minui: at bina quævis tertio majora sunt.

172. Nam anguli plani, ex quibus angulus solidus constat, & simul minores sunt quatuor rectis, (per n. 85. Solid.), & possunt esse magnitudinis cujuscunque dummodo quivis ex iis sit minor reliquis simul sumptis.

173. Ex tribus lateribus quibuscunque potest semper constare triangulum sphæricum, idque unicum; dummodo & omnia simul circulo minora sint, & quodvis ex iis minus reliquis simul sumptis.

174. Id enim ostendimus num. 90. Solid. de angulis planis constituentibus solidum.

175. Trianguli sphærici tres anguli simul & minores sunt sex rectis, & maiores binis,

176. Id constat ex n. 91 Solid. Id ipsum autem, ut etiam a tribus angulis eas conditiones impletibus unicum triangulum constitui posse, ac superiora omnia hic accurate demonstrari possent; sed ea omnia, utpote ad resolutionem non necessaria, innuisse sufficiet.

§. II.

De resolutione triangulorum rectangulorum.

177. Resolutionem triangulorum rectangulorum planorum docuimus ope trium canonum. Pro sphæricis duplo plures requiruntur, quos omnes exhibebit consideratio solius figur. 11.

178. In ea sit jam triangulum BAD rectangulum ad A. Circulus lateris AD sit ADEF ℓ cuius planum concipiatur congruens cum piano ipsius chartæ. Latus AB insistens peripheriæ ADEF verticaliter, & basis DB obliquè, si producantur, occurrent ipsi alicubi in E, & F ita, ut AE, DF sint diametri, & ABE, DBF semicirculi (per n. 137).

179. Concipiatur BC, tum BI perpendicularis piano ADE, quæ cadet in ipsam diametrum AE (per n. 66. Solid.) alicubi in I ad angulos rectos, tum IG perpendicularis diametro DF, ac BG, quæ pariter erit perpendicularis ipsi DF. Nam planum BIG transiens per IB perpendicularēm piano ADE erit eidem perpendicularē (per n. 64. Solid.). Quare recta GC perpendicularis eorum intersectioni IG jacens in posteriore erit (per n. 66. Solid.) perpendicularis priori, nimisrum ipsi BIG, adcoque & rectæ BG.

180. Deinum sectis semicirculis DAF, DBF bisariam in L, & H, transeat per ipsa puncta L, H arcus circuli maximi (per nu. 129.) occurrens semicirculo ABE alicubi in P; eruntque anguli DLH, DHL recti (per n. 162); ac proinde D polus circuli LHP (per num. 159), & LH mēnsura æqualis angulo ADB (per nu. 162). Ob angulos vero ALP, LAP rectos, erit P polus circuli AL, & PA, PL quadrantes (per n. 139.) &

ac

170 TRIGONOMETRIA.

ac AL mensura æqualis angulo HPB (per num. 162).

181. Jam vero omnis triangulorum sphæricorum resolutio profuit a consideratione pyramidis BIGC , & comparatione triangulorum rectangulorum BAD, BHP . Illa exhibebit tres canones, hæc alios tres, quibus continguntur omnes casus triangulorum rectangulorum.

182. Primum igitur desigenda mentis acies in pyramidem ipsam . Illa in situ erecto considerata haberet basim IGC in plano chartæ, & verticem in B , at nos jacentem considerabimus ita, ut C sit vertex , basis autem vertici opposita BIG , a qua ad verticem C tendunt tria latera BC, IC, GC, quibus concluduntur tres facies BCI, BCG, ICG .

183. Porro tamen illa basis, quam hæ facies sunt triangula plana rectangula . Nam anguli BIG, BIC sunt recti ob BI perpendicularēm plano CIG, & anguli CGB, CGI ob CG perpendicularēm piano BGI . Angulorum autem rectilineorum, quos illæ tres facies continent in C, nimirum angulorum BCI, BCG, ICG mensuræ ipsius æquales sunt arcus BA, AD, BD; angulus vero rectilineus BGI pertinens ad basim illam pyramidis est (per n. 152) æqualis sphærico BDA .

184. Comparando autem inter se bina triangula sphærica BAD, BHP rectangula ad A, & H, cuivis vel lateri, vel angulo alterius, respondet aliquid in altero vel ipsi æquale, vel ejus complementum . Angulo BAD recto primi æqualis est angulus BHP rectus secundi: angulo ABD priimi æqualis est (per n. 146) angulus HBP secundi ad verticem oppositus . Angulus ADB primi ; quem exhibet LH (per n. 180) habet pro complemento latus HP secundi: latus AB primi habet pro complemento basim BP secundi: latus DA primi habet pro complemento arcum AL, adeoque angulum BPH, quem is exhibet (per n. 180): basis demum BD primi habet pro complemento latus BH secundi .

185. Jam vero priores tres canones eruemus considerando, juxta num. 25, qui hic consulendus, & habendum semper præ oculis, tamquam radium prius CB, tuni CG,

CG, ac deum **CI**. Ex prima consideratione orientur in triangulis **CIB**, **CGB**, quibus **CB** communis est, ratio rectarum **BG**, **BI**, & alteram eorum rationem exhibebit basis **BIG**, quæ rationes inter se combinatæ præbebunt primum canonem: secundum secunda præbebit ope rectarum **BG**, **IG**; tertium tertia ope rectarum **GI**, **BI**: sed jam aggrediamur rem ipsam.

186. Habiens **BC** pro radio in triangulis rectangulis **CGB**, **CIB**, erunt **BG**, **BI** sinus angulorum **BCG**, **BCI**, sive sinus basis **BD**, & lateris **BA** oppositi angulo sphærico **D**. At in triangulo **BIG** rectangulo ad **I**, eadem **BG**, **BI** referunt radium, & sinum anguli rectilinei **BGI**, seu sphærici **D**. Quare

187. I. *Radius ad sinum anguli, ut sinus basis ad sinum lateris oppositi.*

188. Habiens **CG** pro radio in triangulis rectangulis **CGB**, **CCI**, erunt **GB**, **GI** tangentes angulorum **GCB**, **GCI**, sive basis **BD**, & lateris **DA** adjacentis angulo **D**. At in triangulo **BIG**, eadem **GB**, **GI** referunt radium, & cosinum anguli rectilinei **BGI**, vel sphærici **D**. Quare

189. II. *Radius ad cosinum anguli, ut tangens basis ad tangentem lateris adjacentis.*

190. Habiens **CI** pro radio in triangulis rectangulis **CIB**, **CGI**, erunt **IG**, **IB** illa sinus anguli **ICG**, seu lateris **AD** adjacentis angulo **D**, hæc tangens anguli **ICB**, seu lateri **AB** eidem oppositi. At in triangulo **BIG** eadem **IG**, **IB** referunt radium, & tangentem anguli rectilinei **BGI**, seu sphærici **D**. Quare

191. III. *Radius ad tangentem anguli, ut sinus lateris adjacentis ad tangentem oppositi.*

192. Hæc ex pyramide: jam applicando hosce canones ad triangulum **BHP**, & ipsum comparando cum triangulo **BAD** orientur tres alii,

193. Ex can. I radius ad sinum anguli **BPH**, sive acus **AL**, nempe ad cosinum lateris **AD**, ut sinus **BP**, nempe cosinus lateris **AB** ad sinum **BH**, nempe cosinum basis **BD**. Quare

172 TRIGONOMETRIA.

194. IV. Radius ad cosinum unius lateris, ut cosinus alterius ad cosinum basis.

195. Ex eodem can. I radius ad sinum anguli PBH, sive ABD, ut sinus BP, nempe cosinus lateris AB adjacentis ipsi angulo ABD, ad sinum PH, nempe cosinum HL, sive cosinum anguli sphærici D, quem is exhibet, & qui opponitur lateri AB. Quare

196. V. Radius ad sinum anguli adjacentis, ut cosinus lateris ad cosinum anguli oppositi.

197. Ex can. III Radius ad tangentem anguli B, ut sinus BH, seu cosinus basis BD ad tangentem HP, nempe cotangentem HL, sive anguli D. Quare

198. VI. Radius ad tangentem unius anguli, ut cosinus basis ad cotangentem alterius.

199. In hisce 6 canonibus continentur combinaciones omnes, quæ haberi possunt, sumendo tria ex iis quinque, quæ præter angulum rectum continet quodvis triangulum rectangulum, nimirum binis angulis, binis lateribus, ac basi, ut paulò inferius patebit. Possent applicando canonem I'II etiam ad angulum P, & canonem II tam ad P, quam ad B, erui alii tres canones, qui tamen easdem combinaciones iterum redderent, ac ad canones præcedentes facile reducerentur, ac idcirco eos omisimus.

200. Potro in triangulorum resolutione ope horum canonum invenietur semper aliqua functio basis, vel lateris, vel anguli quæsiti, ut jam videbimus. At quoniam (per num. 9) functiones eadem communes sunt binis arcibus semicirculum complementibus, quorum alter est quadrante minor, alter major, necessariæ sunt quædam Regulæ, quæ ostendant, utram speciem habere debeant anguli, & arcus quæsiti, nimirum acuti debeant esse, an obtusi, sive minores, an majores quadrante. Binas autem ejusmodi regulas, quæ semper speciem indicabunt, quotiescumque in se determinata erit, ex fig. 12. admotum facile eruemus.

201. Manentibus in ea punctis ABPDE, ut in fig. 11. per polum P, & punctum D ducatur arcus circuli ma-

ximi (per num. 129), qui erit perpendicularis ad ADE (per num. 159), & semicirculo ADE secto bifariam in I, quod punctum erit polus circuli ABE, cum polo ejus circuli debeant esse in circulo ADE (per num. 159), ac debeant per quadrantem distare ab eodem ABE (per num. 139), ducatur arcus BI, qui erit quadrans (per n. B39). Ducatur demum arcus Bd per quodvis punctum semicirculi ADE jacens respectu I ad partes oppositas D, & polo B sit arcus circuli FIf occurrentis arcibus BD, Bd in F, f, qui ob BI quadrantem erit circulus maximus (per num. 139), & (per eundem) absindet BF, Bf quadrantes, ac constituet angulos BIF, BIf rectos (per num. 159).

202. Jam vero si latus AB sit minus quadrante AP; erit angulus ADB minor semper recto ADP, cuius erit pars: si autem illud sit maius, erit major & hic, utcunque se habuerit alterum latus AD. Quare

203. Reg. 1. *Latera sunt ejusdem speciei cum angulis oppositis.*

204. Si latus AB sit minus quadrante AB, erit angulus BIA, sive (existente etiam AD minore quadrante AI) BID minor recto per Reg. 1, adeoque minor angulo BIF, angulus vero BId major, recto BIf, & propterea basis BD minor quadrante BF, & basis Bd major quadrante Bf. In triangulis igitur BAD, BED, ubi latera sunt ejusdem speciei, basis est quadrante minor: in triangulis BAd, BED, ubi ea sunt diversæ speciei, basis est quadrante major. Quoniam vero per reg. 1, anguli sunt ejusdem speciei cum lateribus oppositis, possunt pro illis substitui, ubi agitur de eorum specie. Quare

205. Reg. 2. *Si duo latera, vel duo anguli, vel latus cum angulo adjacente fuerint ejusdem speciei; basis erit quadrante minor; si diversæ, major, & viceversa.*

P R O B L E M A.

206. In triangulo rectangulo sphærico datis allis binis præter angulum rectum reliqua invenire.

207. Ut quæstioni satisfiat, oportet arcus, vel anguli quæ-

quæstū invenire functionēm aliquam, tūm nosse utrius specieī sit.

208. Primum semper obtinebitur ope canonum. Nam in triangulo rectangulo præter angulum rectum habentur hæc quinque, basis, binæ latera; bini anguli. Ea quinque sex tantum combinationes habent, quarum singulis ternis ex iis contineantur; videlicet: 1. continetur basis cum utroque latere: 2. basis cum utroque angulo: 3. basis cum latere, & angulo adjacenti: 4. basis cum latere, & angulo opposito: 5. utrumque latus cum altero angulo: 6. uterque angulus cum altero latere. Quotiescumque autem dantur binæ quævis, & quæratur quodvis tertium, semper ea data, & id quæsitum estunt simul in una ex iis combinationibus; ut si detur basis cum altero latere, & quæratur angulus illi lateri adjacens; ea tria sunt simul in combinatione 3. Porro singulæ ejusmodi combinationes singulis canonibus continentur; sic illa combinatio tertia continetur in canone secundo: *Radius ad sinum anguli; ut tangens basis ad tangentem lateris adjacentis*, ac in eo canone, in quo ea combinatio continetur, habebitur radius, & binæ functiones binorum, quæ dantur; ut in aliato exemplo habebitur tangens basis, & sinus anguli, ac simul aderit aliqua ejus functio, quod quæritur, ut ibidem tangens lateris adjacentis. Quare dabuntur tres termini proportionis eo canone inclusæ; ac proinde eruetur & quartus terminus, sive functio quæsti arcus, vel anguli, (per num. 10. cap. 2. Arithm.); dividendo nimirum, si quæsita functio fuerit in uno ex terminis extermis, productum mediiorum per alterum extermum; vel si ea fuerit in uno e mediis, productum extermorum per alterum e mediis, & ubi logarithmi adhibeantur, substituendo multiplicacioni, ac divisioni additionem, & subtractionem.

209. Secundum semper obtinebitur per regulas, præter casum, in quo dentur alterum latus cum angulo opposito, & quæratur quodvis ex reliquis tribus. Is enim casus semper ambiguus erit, & binas solutiones admittet, ac quidvis e reliquis tribus esse poteris vel maius,

vel

TRIGONOMETRIA. 175

vel minus quadrante. Nam in triangulis BAD, BAF (Fig. 11) rectangulis ad A, quamcunque magnitudinem habeat, latus AB est commune utriusque; & angulus ADB ipsi oppositus in primo æquatur angulo AFB eidem opposito in secundo: basis autem BF, alterum latus AF, & alter angulus ABF posterioris sunt complemerita ad duos rectos basis BD, lateris AD, anguli ABD prioris; ac proinde si detur latus AB, & angulus ipsi oppositus, vi eorum tantummodo, ambiguum erit, uter e binis illis triangulis sumendus sit. Porro solum in iis casibus, in quibus detur latus cum angulo opposito illæ regulæ nos destituunt, nec determinant speciem anguli: vel arcus quæsiti, quam determinant in ceteris omnibus. Si enim ex. gr. datis binis lateribus, queratur angulus alteri oppositus; ejus species innotescet per reg. 1, cum debeat esse eadem, ac species data lateris oppositi dati. At si queratur basis; ejus species invenietur per reg. 1, cum debeat deficere a quadrante, vel illum excedere, prout bina latera data fuerint ejusdem speciei, vel diversæ.

Scholion 1.

210. Ut patet illud semper haberi per Canones, hoc semper per regulas; subjiciemus indicem combinatorum, & canonum, quibus ipsæ combinationes continentur, ac regularum, quarum ope in singulis combinationibus invenietur species: & quoniam secunda regula tres habet partes; earum singulas exprimemus.

1. Basis cum utroque late- Can. 4. Reg. 2. pars 1.
re.
2. Basis cum utroque angulo. Can. 6. Reg. 2. pars 2.
3. Basis cum latere, & an- Can. 2. Reg. 2. pars 3.
gulo adjacente.
4. Basis cum latere, & an- Can. 1. Reg. 1, vel nulla
gulo opposito. in casu ambiguo.
5. Utrumque latus cum altero Can. 3. Reg. 1, vel nulla
angulo. in casu ambiguo.

6. Uter-

6. Uterque angulus cum altero latere. Can. 5. Reg. 1, vel nulla in casu ambiguo.

211. Ut methodus resolvendi casum quemlibet illustretur exemplo, detur basis $\equiv 57^\circ. 25'$. cum latere $\equiv 41^\circ. 16'$, & quæratur angulus adjacens ipsi lateri. Tria, quæ hic combinantur sunt basis cum latere, & angulo adjacenti, quorum priora duo dantur, tertium quæritur. Huic combinationi, quæ est tertia, respondet Canon secundus, & regulæ secundæ pars tertia. In eo canone habetur *Radius ad cosinum anguli, ut tangens basis ad tangentem lateris adjacentis*. Quare Log. cosinus anguli \equiv Log. rad. \div Log. tang. $41^\circ. 16' - \log. \tan. 57^\circ. 25' \equiv 10.00000 \div 9.94323 - 10.19445 \equiv 8.74878$, cum respondet in tabulis $55^\circ. 54'$. Quoniam autem eidem combinationi respondet Reg. 2. pars 3., inde species determinabitur. Ibi enim habetur: si latus cum angulo adjacenti fuerint ejusdem speciei, basis erit quadrante minor, & viceversa. Nimirum cum hic basis $57^\circ. 25'$ sit minor quadrante; latus cum angulo adjacenti erunt ejusdem speciei. Est autem latus $41^\circ. 16'$ quadrante minus. Erit igitur recto minor & angulus quæsus; adeoque sumendum erit ille ipse $55^\circ. 54'$, quem exhibent tabulæ, non ejus complementum ad duos rectos.

212. Singulæ combinationes continent terma Problemata, cum nimirum quodlibet ex iis tribus possit queri, datis reliquis binis. Sic in combinatione, qua in exemplo allato usi sumus, posset potius quæri latus data basi & angulo adjacenti, vel quæri basis, dato latere, & angulo adjacenti. Eo pacto cum habeantur sex combinationes, Problemata essent 18. Sed bina Problemata primæ, & secundæ combinationis, coincidunt inter se; ac ejusmodi combinationes bina singulæ Problemata inter se diversa complectuntur. Nam in prima utrumlibet latus quæratur data basi, & altero latere, eodem res redit, ut in secunda idem dicendum de angulis; ac proinde omnis triangulorum rectangulorum resolu-

resolutio continetur 16 Problematis, quæ iis combinationibus includuntur. Postremæ tres combinationes habent singulos singulæ casus ambiguos, cum nimirum dato latere & angulo opposito possit quæri basis in 4° , latus alterum in 5° , alter angulus in 6° , in quibus tantum, ut supra monuimus deserimur ab iis regulis ceteros omnes complectentibus.

Scholion 2.

213. Addemus hoc secundo scholio quædam, quæ facile eruuntur è canonibus, & ostendunt, qui casus possint involvere impossibilitatem, quæ tamen, ut minus necessaria, omittere etiam Tyro poterit, si libuerit.

214. Basis in triangulo rectangulo non potest distare a quadrante magis quam latus utrumlibet.

215. Infertur ex primo canone, in quo Radius ad sinum anguli, ut sinus basis ad sinum lateris oppositi. Cum enim radius non possit esse minor sinu ullius anguli (per num. 39.); sinus basis non potest esse minor sinu lateris oppositi: æque autem facile infertur ex canone 2, vel 4.

216. At basis ipsa respectu anguli utriuslibet potest habere magnitudinem quamcumque.

217. Infertur ex can. 6, in quo radius ad tangentem unius anguli, ut cosinus basis ad cotangentem alterius. Cum enim radius possit habere (per num. 39) quancunque rationem ad tangentem unius anguli, potest, & cosinus basis habere pariter quancunque ad cotangentem alterius.

218. Patet autem etiam ex eo, quod capta utcunque basi DB, & facto utcunque angulo BDA, possit semper (per num. 129) duci ex B circulus perpendicularis circulo DAF, qui ubi semicirculum DAF secabit in A, constituet triangulum rectangulum.

219. Angulus non potest distare a quadrante minus, quam latus oppositum.

220. Infertur ex canone 1. ubi alternando est radius ad sinum basis, ut sinus lateris, ad sinum anguli op-

M positi.

positi. Patet enim simul lateris non posse esse minorem sinu anguli oppositi, ut radius non potest esse minor sinu basis. Idem aequè facile deducitur ex can. 3. pariter alternando, vel ex can. 5.

221. Eini anguli simul debent esse maiores uno recto.

222. Infertur ex can. 5. ubi alternando est radius ad cosinum lateris ut sinus anguli adjacentis ad cosinum oppositi. Cum enim radius debeat esse major cosinu lateris, etiam sinus unius anguli debebit esse major cosinu alterius. Quare si uterque sit acutus alter debebit esse major complemento alterius; adeoque ambo simul rectum excedent. Si vero neuter acutus est; pater utrumque simul debere rectum excedere. Idem inferti posset ex can. 6. pariter alternando: & idem infertur etiam ex num. 175. Cum nimirum omnes tres anguli simul debeant duobus rectis maiores esse, & unus jam rectus sit; non possunt reliqui duo simul non esse maiores recto.

223. Angulus respectu lateris adjacentis potest habere magnitudinem quancunque.

224. Infertur ex can. 2, in quo est radius ad cosinum anguli, ut tangens basis ad tangentem lateris adjacentis. Assumptis enim utcumque basi, & angulo; inventetur tangens lateris adjacentis; & nulla tangens est impossibilis utcumque magna, vel parva.

225. Patet autem etiam ex eo, quod capto utcumque latere AB, & facto quovis angulo ABD, semper arcus BD occurret arcui ADE alicubi in D, & triangulum constituet.

226. Angulum autem respectu basis posse habere magnitudinem quamcumque diximus num. 216.

227. Latus non potest distare a quadrante minus quam basis, nec magis quam angulus oppositus, respectu vero anguli adjacentis & alterius lateris potest habere magnitudinem quamcumque.

228. Patet primum ex num. 214, secundum ex num. 219, tertium ex num. 223, quartum infertur ex can. 3, in quo quicunque fuerit sinus alterius lateris, invenie-

tur tangens alterius, quæ impossibilis esse non potest, ac ex can. 5, in quo cosinus lateris utriuslibet semper proveniet minor radio adeoque possibilis.

229. Ex his patebit, qui casus possint impossibilitatem involvere qui semper possibiles sint. Id vero obtinebitur per currendo alias sex combinationes, quæ continent bina quævis, quæ dari possunt ex illis quinque.

230. Data basi, & altero latere, Problema erit impossibile, si basis data distet a quadrante magis, quam latus (per num. 214.)

231. Data basi & altero angulo, Problema erit semper possibile (per num. 216.)

232. Datis binis angulis, erit impossibile, si eorum summa rectum non superet (per num. 221.)

233. Dato angulo, & latere opposito, erit impossibile si angulus distet a quadrante minus, quam latus oppositum (per num. 219.)

234. Dato angulo, & latere adjacente, erit semper possibile (per num. 223.)

235. Datis binis lateribus, erit semper possibile (per num. 227).

236. Atque in omnibus hisce combinationibus continentur iterum illa eadem Problemata, quæ in prioribus: nam singulæ terna continent, cum datis iis binis, quæri possit quodlibet e tribus reliquis, ac in tertia & sexta coincidant bina Problemata, ubi datis binis angulis quæritur latus utrumlibet, vel datis binis lateribus, quæfitur uterlibet angulus.

237. Quoniam autem in omnibus Problematis invenitur fundatio per canones, & species per regulas præter combinationem quartam numeri 233, in qua datur latus cum angulo opposito, quæ speciem indeterminatam relinquit juxta num. 209, omnia ejusmodi problemata unicam admittunt solutionem, ac angulum, vel arcum determinant, præter illa tria in ea quarta combinatione inclusa, quæ non determinant speciem, & proinde binas singula solutiones admittunt.

238. Porro quotiescumque Problema erit impossibile;

id ipsum calculus etiam trigonometricus ostendet, ut monuimus num. 123. Detur ex. gr. basis $57^\circ. 0'$, latus vero $76^\circ. 0'$, & queratur angulus illi lateri oppositus. Tria quæ hic combinantur sunt basis cum latere, & angulo opposito, quæ in indice combinationum numeri 210 est quarta, & ipsi respondet canon 1, in quo habetur: *Radius ad sinum anguli, ut sinus basis ad sinum lateris oppositi.* Quare erit Logarithmus sinus anguli quæsiti \equiv Log. rad. $-$ Log. sin. $76^\circ. 0'$ $-$ Log. sin. $57^\circ. 0'$ \equiv $10.00000 - 9.98690 - 9.92359 \equiv 10.06331$, qui Logarithmus est major quovis sinuum Logarithmo in tabulis, cum sit major quam 10. 00000 Logarithmus radii, adeoque requirit sinum radio majorem, qui est impossibilis, & problematis impossibilitatem evincit. Eam autem facile erat deprehendere ex num. 230; cum nimis basis data $57^\circ. 0'$ magis distet a quadrante, quam latus oppositum $76^\circ. 0'$.

Scholion 3.

239. Idem canonēs exhibent alia quoque theorematā sanè multa, in quibus eruendis Tyronem poterit exercere Præceptor, ut ea omnia, quæ de triangulis habentibus plusquam unum angulum rectum diximus, & alia, quæ addi possent. At iis omissis addemus pauca quædam usui futura in consideratione casuum quorundam ambiguorum, vel impossibilium in triangulis obliquangulis.

240. In fig. 12. si ex polo P circuli ADE ducatur ad quodvis punctum D arcus PD circuli maximi; is semper erit quadranti æqualis (per num. 139.), & cum eo angulum rectum constituet (per num. 159.) ac proinde mutato utsunque loco puncti D per totum circulum AIEA, & magnitudo arcus PD, & angulus cum peripheria AIEA manebunt semper magnitudinis ejusdem $\equiv 90^\circ$. At si sumatur quodcumque aliud superficie sphericæ punctum B, & ducatur arcus BD; mutato situ puncti D mutatur & magnitudo arcus ejusdem, & ejus inclinatio ad circulum ADE. Non erit abs re contemplari mutationes omnes, quæ accidunt illi arcui, & angulo.

241. Si per B, & P ducatur arcus circuli maximi, qui occurret circulo AIEi alicubi in A, & E ad angulos rectos (per n. 159.), existente A ad partes B respectu P, ac bini semicirculi AIE, AiE secentur bifariam I, & i, qui erunt poli ipsius circuli APE, juxta num. 139; puncto D abeunte in A, arcus BD erit æqualis ipsi BA, & omnium minimus, tum puncto D recedente utralibet ex parte versus E, perpetuo crescat, donec abeunte D in I, vel i fiet quadrans, ac denum abeunte D in E fiet æqualis ipsi BE, & omnium maximus.

242. Id facile deducitur ex can. 4. Nam in triangulo BAD ex eo can. erit radius ad cosinum lateris BA, ut cosinus lateris AD ad cosinum basis BD. Quare stante latere BA, & mutato latere AD, ita mutabitur basis BD, ut cosinum ratio sit semper eadem; ac proinde de crescente complemento arcus AD per ejus continuum incrementum, usque ad I, vel i decrescat etiam continuum complementum basis BD, quæ proinde perpetuo crescat: ac complementis simul evanescentibus ibidem simul fiunt quadrantes, tum crescente perpetuo ab I, & i usque ad E complemento arcus AD, crescat perpetuo etiam continuum arcus BD, qui proinde pariter crescat.

243. Patet autem ex eadem demonstratione, tam versus I, quam versus i æque crescere arcum BD in æquilibus distantiis puncti D, hinc inde ab A.

244. Quare omnium arcuum, qui ex puncto B assumpto in superficie sphæræ applicari possunt ad peripheriam, circuli AIEi, cui hemisphérium insitit, maximus est BPE qui transit per polum P, minimus BA ipsi oppositus, reliqui eo minores, quo magis ad minimum accedunt, ac bini tantum hinc inde in æquali distantia a puncto A, vel E inter se æquales applicari possunt.

245. Si igitur ex puncto dato B oporteat applicare arcum datum, is applicari non poterit, si fuerit minor, quam AB, vel major, quam BE, nimis si distiterit a quadrante magis, quam utervis ex arcibus AB, BE: poterit applicari in unica positione, si æque disti-

terit, in binis hinc inde a perpendiculari, si distiterit minus, & eo proprius punctus I, i., quo fuerit quadranti proprius.

246. At angulus quem arcus ED continebit cum circulo ADE, puncto D abeunte in A erit utrinque rectus; tum abeunte D versus I vel i, erit semper BDA acutus versus A, BDE obtusus versus E, & ille perpetuo crescat, hic decrescat donec in I vel i fiat ille minimus, hic maximus, existente illius mensura AB, hujus BPE; deinde vero usque ad E ille iterum crescat, hic decrescat, ac abeunte D in E, iterum uterque fiet rectus.

247. Id facile deducitur ex can. 3. Nam ex eo erit radius ad tangentem anguli ADB, ut sinus lateris AD, ad tangentem lateris AB. Quare mutato utcunque puncto D, productum ex sinu lateris AD, & tangente anguli BDA erit semper idem; adeoque illius sinu crescente, vel decrescente, hujus tangens contra decrescat, vel crescat. Sinus autem illius perpetuo crescat donec ipse fiat in I vel i quadrans, tum decrescat, adeoque e contrario hujus tangens decrescat usque ad I, vel i tum crescat. Quare etiam angulus ex ea parte, ex qua erit acutus decrescat usque ad I, vel i, tum crescat, & ex altera parte, ex qua erit obtusus crescat, tum decrescat. Facto autem AD in I, vel i quadrante, ejus sinus æquatur radio; adeoque hoc ipso canone tangens ejus anguli æquabitur tangentii arcus AB, vel BE, & ipsi arcus AB, BE erunt mensura angulorum BDA, BDE in illo casu, quod etiam constat ex n. 155, cum D in eo casu abeat in I polum circuli ABE.

248. Patet autem etiam in æquali distantia punctorum D, & hinc inde ab I, vel ab i angulos hinc BDA, BdA, inde BDE, BdE æquales fore. Bini enim arcus, AD, Ad æquabuntur duplo quadrantis AI, sive semi-circulo, adeoque sinus arcuum AD, Ad æquales erunt; ac proinde & tangentes angulorum BDA, BdA eandem habebunt magnitudinem.

249. Quare omnium angulorum, qui ad circulum AIEi

AIE^2 fieri possunt per arcus ductos ex B, minimum versus A metitur AB, maximum versus E metitur BE & uterque ab eo limite ita recedit, ut in rectum definat.

250. Si igitur ex puncto dato B oporteat applicare arcum, qui contineat angulum BDA, vel BDE datum; si applicari non poterit, nisi, qua parte respicit perpendiculari minus AB, sit acutus, ex parte perpendiculari majoris obtusus: nec pariter applicari poterit, si distet a recto magis, quam uterque arcuum BA, BE a quadrante: poterit autem in I, & i tantum, si æque distiterit: ac in binis positionibus æque remotis hinc intendam ab I, quam ab i, si distiterit minus, eoque propius punctis A, E, quo fuerit proprior recto.

§. III.

De resolutione triangulorum obliquangulorum.

251. Triangula obliquangula reducuntur ad rectangula ope perpendiculari demissi ex angulo aliquo in latus oppositum habitum pro basi, ut in triangulis planis. Sit ejusmodi triangulum (in fig. 13) ABD: Assumpto pro basi latere AD, occurrant ejus circulo in a, & d semicirculi arcum AB, DB productorum. Per punctum B ducatur circulus perpendicularis circulo AD ad (per num. 129), qui ei occurret in binis punctis e diametro oppositis, adeoque jacebit altera intersectio E in semicirculo AdA, altera e in adA. Secentur demum semicirculi Eae, altera e in adA. Secentur demum semicirculi Eae, EAe bifariam in I, i.

252. Triangulum ABD, ope perpendiculari BE reducuntur ad binæ triangula rectangula ABE, DBE, ubi sive ipsum perpendicularum BE cadat intra basim, ut figura exhibet, sive extra, ut in triangulo ABd, dicimus AE, ED segmenta basis, ABE, DBE, segmenta verticis, & AE, ABE adjacentia lateri AB, & angulo A, ac opposita lateri BD, & angulo D, contra vero DE, DBE illis opposita, his adjacentia.

184 TRIGONOMETRIA.

253. Porro ope priorum sex canonum eruemus alios 7 pertinentes ad hæc segmenta, latera, & angulos, ubi quidquid dicemus de triangulo ABD, habet locum in reliquis tribus triangulis Abd, aBD, aBd, dummodo majoribus litteris apte substituantur minores.

254. Ex can. 1. Radius ad sinum anguli A, ut sinus AB ad sinum BE. Ex eodem alternando, est sinus anguli D ad radium, ut sinus BE ad sinus DB. Igitur ex æqualitate perturbata sinus D ad sinus A, ut sinus AB ad sinus BE. Quare.

255. VII. Sinus angularum, ut sinus laterum oppositorum.

256. Ex can. 2. Radius ad cosinum anguli ABE, ut tangens AB ad tangentem BE. Ex eodem alternando cosinus DBE ad radium, ut tangens BE ad tangentem DB, Igitur ex æqualitate perturbata cosinus DBE ad cosinum ABE, ut tangens AB ad tangentem DB. Quare.

257. VIII. Cosinus segmentorum verticis. ut tangentes laterum oppositorum.

258. Ex can. 3. Radius ad tangentem A, ut sinus AE ad sinum BE. Ex eodem alternando tangens D ad radium, ut sinus BE ad sinus DE. Igitur ex æqualitate perturbata tangens D ad tangentem A, ut sinus AE, ad sinum DE. Quare.

259. IX. Sinus segmentorum basis, ut tangentes angularum oppositorum.

260. Ex can. 4. Radius ad cosinum BE, ut cosinus AE ad cosinum AB, & ut cosinus DE ad cosinum BD. Ergo alternando cosinus AE ad cosinum DE, ut cosinus AB ad cosinum DB. Quare.

261. X. Cosinus segmentorum basis, ut cosinus laterum adjacentium.

262. Ex can. 5. alternando, radius ad cosinum BE, ut sinus ABE ad cosinum A, & ut sinus DBE ad cosinum D. Igitur alternando, sinus ABE ad sinus DBE, ut cosinus A ad cosinum D. Quare.

263. XI. Sinus segmentorum verticis, ut cosinus angularum adjacentium.

264. In hisce novis 5 canonibus habentur aliæ quinque

que combinationes laterum, angulorum, segmentorum tam basis, quam verticis, nimirum in combinatione.

7. *Latera, & anguli inter se.* Can. 7.

8. *Latera, & segmenta verticis.* Can. 8.

9. *Latera, & segmenta basis.* Can. 10.

10. *Anguli, & segmenta verticis.* Can. 11.

11. *Anguli, & segmenta basis.* Can. 9.

265. Supereft combinatio segmentorum verticis, cum segmentis basis, pro qua admodum facile canon eruitur ex can. 3. Est enim ex eo alternando, Radius ad sinum BE, ut tangens anguli ABE ad sinum AE, & ut tangens anguli BD \bar{E} ad sinum D \bar{E} . Igitur alternando, tangens ABE ad tangentem DBE, ut sinus AE ad sinus DE. Quare *Tangentes segmentorum verticis, ut sinus segmentorum basis adjacentium*. Sed hic canon hic nobis usui non erit, adeoque eum in hac serie canonum non ponimus.

266. Porro hi canonēs inventis jam ope triangulorum rectangulorum segmentis usui erunt, ut infra patet; at ex iis binos alios deducemus, ex quibus ipsa etiam in binis casibus segmenta inveniantur.

267. Ex can. 10. sumendo summas & differentias terminorum, erit summa cosinuum segmentorum basis ad differentiam, ut summa cosinuum laterum ad differentiam. Quare (per nūm. 31.)

268. XII. *Cotangens semisumma segmentorum basis, sive cotangens dimidiæ basis, ad tangentem semidifferentiæ, ut cotangens semisumma laterum ad tangentem semidifferentiæ.*

269. Ex can. 11. pariter summa sinuum segmentorum verticis ad differentiam, ut summa cosinuum angulorum ad differentiam. Quare (per n. 31.)

270. XIII. *Tangens semisumma segmentorum verticis, sive tangens dimidiæ anguli verticalis, ad tangentem semidifferentiæ, ut cotangens semisumma reliquorum angulorum ad tangentem semidifferentiæ.*

271. Neperus, & alii passim pro can. 12. proponunt
hunc

186 TRIGONOMETRIA.

hunc. *Tangens semisumma segmentorum basis, sive tangens dimidiæ basis, ad tangentem semisumma laterum, ut tangens semidifferentia ipsorum ad tangentem semidifferentia segmentorum basis;* ac ipsum demonstrant ex principiis Conicis. Nos eum facile admodum deducere possumus ex nostro canone 12. Prius enim alternando sit: *Cotangens dimidiæ basis ad cotangentem semisumma laterum, ut tangens semidifferentia segmentorum basis ad tangentem semidifferentia laterum.* Tum pro ratione cotangentis dimidiæ basis, ad cotangentem semisumma laterum, ponendo (per n. 17.), rationem tangentis hujus ad tangentem illius habetur: *Tangens semisumma laterum ad tangentem dimidiæ basis, ut tangens semidifferentia segmentorum ipsius basis ad tangentem semidifferentia laterum.* Demum invertendo habetur ipsum Neperianum theorema. Sed quoniam hic noster idem prorsus officium præstat; eo, qui sponte propemodum profuit, utemur potius quam Neperiano.

272. Præter hosce canones erit ad resolutionem necessaria etiam tertia regula, quæ determinet, quandonam perpendiculum cadat intra basim, quando vero extra. Eruetur autem sic.

273. Ex reg. 1. tam angulus BAE, quam BDE sunt ejusdem speciei cum arcu BE. Igitur si anguli BAD, BDA fuerint ejusdem speciei; jacebit punctum E intra basim AD, congruentibus angulis BDA, BDE, ac angulis BAD, BAE. Si vero fuerint diversæ speciei; cadet extra, ut in triangulo ABD, ubi cadit in E, vel e extra basim Ad ita, ut angulo BAd non habente eandem speciem cum BdA, tam stAE, quam BdE eandem habeant, ac pariter tam BAe, quam Bde eandem. Quare.

274. Reg. 3. Si duo anguli ad basim fuerint ejusdem speciei, perpendiculum intra basim cadet; si diversæ, extra.

PROBLEMA.

275. In triangulo sphærico obliquangulo tribus datis reliqua invenire.

276. Sex casus complectitur hoc Problema, i., in quo dentur

dentur bina latera angulo intercepto, 2. Bina latera cum angulo alteri eorum opposito, 3. Bini anguli cum latere intercepto, 4. Bini anguli cum latere alteri eorum opposito, 5. tria latera, 6. Tres anguli. Omnium solutio habebitur ope canonum, quos demonstravimus, excurrendo per casus singulos.

277. Ante tamen notandum est, in primo, &c tertio casu Problema semper esse possibile, ac ita determinatum, ut unicam solutionem admittat. Facto enim utcunque angulo A, & assumptis, ut libuerit lateribus AB, AD, poterit per B, & D duci circulus maximus (per n. 129), qui erit unicus, cum planum transiens per puncta B, D, & centrum sphæræ non in directum jacentia sit unicum (per num. 7. Solid.), ac id ipsum ejus circuli sit planum (per num. 130). Pariter facto quovis angulo ad A; assumpto quovis latere AD, quod sit minus semicirculo ADA, & facto in D quovis angulo ope semicirculi DBd, hic semicirculo ABa occurret alicubi necessario in B, & triangulum absolvet.

278. Secundus, & quartus casus possunt habere, vel binas solutiones, vel unicam vel nullam: Sit enim datum angulus BAE, & datum latus AB: ut habeatur propositum triangulum oportet ex B ita applicare arcum BD, ut in secundo casu ipse sit æqualis alteri dato lateti, in quarto vero casu efficiat angulum BDA æqualem dato. Porro ex nu. 245, & 250 facile eruitur id aliquando esse impossibile, aliquando unicam solutionem habere posse, aliquando vero binas.

279. Si latus datum vel datus angulus distet a quadrante magis quam arcus BE, qui ex datis angulo A & arcus AB facile invenitur (per combin. 4.); casus erit prorsus impossibilis, & in resolutione ejus trianguli, methodo, quam trademus infra, obveniet aliquis sinus radio major.

280. Si æque, vel minus distiterit applicabitur quidem arcus BD in una vel pluribus positionibus; sed ad hoc ut triangulum propositum sit possibile, oportet punctum D cadaç in semicirculum AE, & binorum

angu-

angulorum, qui sunt ad D is, qui respicit A, aequaliter datu.

281. Quæ ad id conditiones requirantur facile erit determinare considerando ipsos numeros 245, & 250, pro varia specie arcus AB & anguli A. Sit angulus BAE acutus, & arcus AB quadrante minor ut figura exhibet: eritque per reg. 1 etiam BE quadrante minor ac (per num. 241) arcuum omnium, qui ex B applicari possunt, minimus, & (per reg. 2.) AE pariter quadrante minor, adeoque assumptis quadrantibus EI, Ei, cadet punctum I in semicirculum AEa, punctum i in Ae.

282. Hinc in secundo casu, si latus datum sit aequale BE; solutio erit unica puncto D abeunte in E: si idem sit majus, quam BE, sed adhuc minus, quam BA; solutio erit duplex: nam poterit arcus BD applicari vel citra E versus A, vel ut exhibet figura, ultra E versus a. Si sit aequale BA, vel eo majus; sed adhuc minus quam Ba, non poterit BD applicari versus A, poterit autem versus a, & solutio erit unica. Si demum sit aequalis Ba, vel adhuc major, applicari jam non poterit, nec versus A, nec versus a, & casus iterum erit impossibilis.

283. At in casu quarto, si anguli dati fuerit mensura arcus BE; poterit applicari BD, abeunte D in I, & i, sed sola applicatio in I Problemati inserviet, adeoque solutio erit unica. Si angulus sit aliquanto major, sed adhuc minor angulo BaE, sive dato BAE; binæ erunt solutiones, puncto D cadente in arcum Ia, vel ut figura exhibet in IA. Si is aequalis fuerit ipsi BaE nimirum BAE; vel etiam major eodem, sed adhuc minor angulo BAe ejus complemento ad duos rectos; solutio erit unica, puncto D cadente in arcum IA, cadet enim in arcum IE, si fuerit acutus, in punctum E si rectus, in arcum EA, si obtusus. Quod si ipsi angulo BAe aequalis, vel eum excesserit; iterum casus fiet impossibilis.

284. Eodem pacto facile est ex iisdem principiis derivare (quando in his casibus nulla solutio habeatur quando unica, quadruplicata; sive arcus AB quadrantem excesse-

cesserit, vel angulus BAE excederit rectum, vel contigerit utrumque simul. Verum solutio ipsa idem praebet semper; nam in casu, in quo applicari non poterit arcus BD ullo pacto, obveniet sinus aliquis radio major: in casu vero, in quo is quidem applicari poterit, sed punctum D cadet extra semicirculum AE, binorum segmentorum AE, ED, vel ABE, DBE summa excedit gradus 180, puncto D abeunte ultra α , vel differentia evadet negativa, eodem cadente circa A.

285 In quinto casu Problema erit semper possibile dummodo bina quævis latera tertio majora sint, & in sexto dummodo angulorum summa sit minor sex rectis, & major binis, ac in utroque casu Problema erit determinatum, & unicam solutionem admittet ut colligitur ex num. 173, 176, & ex ipsa solutione patet.

286. Sed jam aggrediamur solutionem ipsam percuriendo singulos casus. In primis autem quatuor semper pro A sumendus est angulus datus, & pro AB latus datum, ex quibus segmentum AE, vel ABE eruetur resolvendo triangulum rectangulum AEB. In reliquis segmenta invenientur per canones postremos.

287. *Casus 1.* Dentur bina latera cum angulo intercepto: duo quæri possunt, 1^o. latus tertium, 2^o angulus utrilibet lateri dato oppositus.

288. Quæratur 1.^o latus tertium. Sume pro A angulum datum; eruntque data latera AB, AD, & queretur BD. Ex datis in triangulo rectangulo AEB basi AB, & angulo A quære AE (per combin. 3) & si forte id evaserit æquale arcui AD; abibit D in E, & triangulum erit rectangulum ad D: si minus; perpendiculari BE cadet intra basim AD: si majus, extra. Invento segmento AE, habebis & ED ob datum arcum AD. Ex segmentis AE, ED, & latere AB invenies cosinum BD (per combin. 9, & can. 10): Ex dato A habes speciem BE (per reg. 1.). Ex ipsa, & specie ED habes speciem BD (per reg. 2).

289. Quæratur 2^o angulus utervis. Assume pro AB latus

190 TRIGONOMETRIA.

latus ipsi oppositum, pro AD alterum latus datum ipsi adjacentis, eritque A datus, D quesitus angulus. Quære segmenta AE, ED ut prius. Ex iis & angulo A (per combin. 11. can. 9) invenies tangentem D. Species autem anguli D erit eadem ac A, vel diversa (per reg. 3), prout segmentum AE obvenerit majus, vel minus basi AD.

290. *Casus 2.* Dentur bina latera cum angulo opposito alteri ex iis: tria quæri possunt, 1. tertium latus, 2.º angulus datis lateribus interceptus, 3.º angulus alteri lateri oppositus.

291. Quæratur 1.º tertium latus. Sume pro A angulum datum, pro AB latus ipsi adjacens: eritque datum & latus BD, ac quæretur AD. Invenies AE, ut num. 288: Ex datis lateribus AB, BD, & segmento AE, invenies (per combin. 9, can. 10) cosinum ED, qui cosinus si obvenerit æqualis radio, erit $ED = 0$, & puncto D abeunte in E, triangulum rectangulum ad D. Ex specie BE, (quæ est eadem ac BAE), & BD invenies speciem ED (per reg. 2.). Sed quoniam aliquando haberi poterit duplex solutio hinc inde ab E, subtrahit ED ab EA, & habebis primam, adde & habebis secundam. Si forte AD ex subtractione evaserit $= 0$, vel negativus ob AE æqualem ipsi ED vel minorem, vel ex additione evaserit æqualis, vel major semicirculo ob ED æqualem vel majorem Ea; eam solutionem rejice abibit enim in principio casu D in A vel circa ipsum, in secundo in & vel ultra ipsum, juxta num. 284.

292. Quæratur 2.º angulus ABD interceptus. Ex datis AB, & A quære segmentum verticis ABE (per combin. 2.). Ex lateribus AB, BD, & segmento verticis ABE invenies (per combin. 8, can. 8.) cosinum EBD, qui cosinus si fuerit æqualis radio, erit pariter DBE $= 0$, & triangulum rectangulum ad D. Ex BD dato, & specie BE communi angulo dato BAE invenies speciem DBE (per reg. 2.). Subduc. DBE, ab ABE, & habebis primam solutionem; adde, & habebis alteram: Si angulus ABD, ex subtractione evaserit $= 0$, vel negativus, vel ex additione æqualis, aut major duobus rectis; eam solutionem rejice, ut prius.

293. Quæratur 3.^o angulus D oppositus lateri AB. Ex lateribus AB, BD & angulo A invenies (per combin. 7. can. 7.) sinum D: species in secunda solutione erit eadem ac A, in prima diversa, (per reg. 3.).

294. *Casus 3.* Dentur bini anguli cum latere intercepto: duo quæri possunt, 1.^o tertius angulus, 2.^o latus utilibet angulo oppositum.

295. Quæratur 1. tertius angulus. Sume pro latere AB latus datum, eruntque dati anguli A, & B, ac quæretur D. Ex datis AB, & A quære segmentum verticis ABE, (per combin. 2.), quod segmentum si evaserit ex quale angulo ABD, punctum D abibit in E, & triangulum erit rectangulum ad D, si minus, perpendiculum BE cadet intra basim BD; si majus, extra. Invento segmento ABE, habebis est DBE ob datum totum ABD. Ex segmentis ABE, DBE, & angulo A invenies (per comb. 10. can. 11.) cosinum D. Is erit ejusdem speciei cum A, si ABE fuerit minor, quam ABD, perpendiculo BE cadente intra basim, diversæ, si major.

296. Quætatur secundo latus utrumvis. Assume pro A angulum ipsi oppositum, pro ABD alterum angulum ipsi adjacentem; etirique AB latus datum, BD quæsumus. Quare segmenta ABE, DBE, ut prius. Ex iis, & latere AB (per combin. 8. can. 8.), invenies tangentem BD. Ejus speciem invenies (per reg. 2.), e specie DBE inventa, & specie BE, quæ est eadem, ac anguli dati A.

297. *Casus 4.* Dentur bini anguli cum latere opposito alteri ex iis: tria quæri possunt, 1.^o tertius angulus, 2.^o latus datis angulis interceptum, 3.^o latus alteri angulo oppositum.

298. Quæratur 1.^o tertius angulus. Sume pro AB latus datum, pro A angulum datum ipsi adjacentem; etirique datus etiam angulus D, & quæretur ABD. Invenies ABE, ut num. 295. Ex datis angulis A, D, & segmento ABE invenies (per combin. 10. can. 11.) sinum DBE, qui in eo canone non poterit evadere $\equiv 0$, existente angulo D obliquo. Ejus autem species erit inde-

determinata, cum solum detur species lateris BE eadem; ac anguli A, & species anguli D oppositi ipsi lateri BE in triangulo BDE, qui est casus ambiguus trianguli rectanguli (per num. 209.). Inde autem colligitur posse aliquando haberi duplarem solutionem, puncto D carente hinc, vel inde ab I, vel i. Quare poterit assumi segmentum DBE tam acutum, quam obtusum. Si autem angulus D fuerit ejusdem speciei cum A, debebit ad habendos pro binis solutionibus binos angulos ABD, utrumque addi segmento ABE, ut (juxta reg. 3.), perpendicularum intra basim cadat. Si vero D fuerit diversae speciei, debebit utrumque subtrahi. Si ex additione non obvenerit angulus minor binis rectis, vel ex subtractione positivus; eae solutiones rejiciendae erunt; abibit enim punctum D in a, vel ultra ipsum, aut in A, vel citra ipsum, ut num. 291.

299. Quæratur 2.^o latus AD interceptum. Ex datis AB, & A quære segmentum AE (per combin. 3.). Ex angulis A, D, & segmento AE invenies (per combin. 11. can. 9.) sinum ED. Species ipsius erit pariter indeterminata: assume valorem tam minorem, quam maiorem quadrante, & adde segmento AE, vel subtrahere, prout angulus D habuerit eandem speciem, ac A, vel diversam, & habebis binas bases AD pro binis solutionibus. Sed si basis ipsa ex additione non obvenerit semicirculo minor, vel e subtractione non manferit positiva, eam solutionem rejice, ut prius.

300. Quæratur 3.^o latus BD oppositum angulo A. Ex angulis A, D, & latere AB invenies (per combin. 7. can. 7.) sinum BD. Species altera adhibenda erit in altera e solutionibus, quam in triangulo rectangulo BED definit (per reg. 2) species BE cognita, nimirum eadem ac species A, una cum specie assumpta segmenti ED, sive segmenti EBD.

301. Casus 3. Dentur tria latera; potest quæri angulus quivis!

302. Sume pro A angulum quæsitus, pro basi AD utrumvis latus ipsi adjacens. Ex datis AB, BD, & di-

midia basi AD invenies (per can. 12.) tangentem semidifferentiarum segmentorum AE , ED , quam semidifferentiam sumes quadrante minorem. Eam adde dimidiæ basi, & subtrahe, & cum dimidia basis sit semisumma eorundem segmentorum, habebis (per num. 28) bina segmenta AE , DE . Sed pro AE assumes segmentum illud, quod magis vel minus distet a quadrante, prout latus adjacens AB distabit pariter magis vel minus; cum nimis (per can. 10.) sint: *Cosinus segmentorum basis*, ut *cosinus laterum adjacentium*, & *arcus proprii quadranti cosinus sit minor* (per n. 39.) Jam in triangulo rectangulo AEB ex AB , & AE invenies angulum BAE (per combin. 3.). Sed si AE habitum fuerit per subtractionem, & obvenerit negativum, perpendiculo BE cadente circa A , Angulus quæsusitus BAD non erit idem, ac BAE , sed ejus complementum ad duos rectos.

303. *Casus 6.* Dentur tres anguli: potest quæri latus quodvis.

304. Sume pro AB latus quæsumum, pro vertice ABD utrumvis angulum ipsi adjacentem. Ex datis A , D & dimidio angulo verticali ABD invenies (per can. 13.) tangentem semidifferentiarum segmentorum ABE , EBD , quam semidifferentiam sumes quadrante minorem. Eam adde dimidio angulo verticali & subtrahe, & cum dimidiis angulus verticalis sit semisumma eorundem segmentorum, habebis (per num. 28.) bina segmenta ABE , DBE . Sed pro ABE assumes segmentum illud, quod magis, vel minus distet ab angulo recto, prout & contrario angulus A adjacens distabit minus, vel magis; cum nimis (per can. 11.) sint sinus segmentorum verticis, ut *cosinus angulorum adjacentium*, & *arcus proprii quadranti cosinus sit minor*, *sinus major* (per num. 39.). Jam in triangulo rectangulo AEB ex AB , & ABE invenies angulum BAE (per comb. 2.). Sed si ABE habitum fuerit per subtractionem, & obvenerit negativum, perpendiculo EE cadente circa A , angulus quæsusitus BAD non erit idem, ac BAE , sed ejus complementum ad duos rectos.

305. Licebit inter se conferre solutiones casus 1, 3, 5, cum 2, 4, 6, quæ ita sibi respondent, ut saepe eadem prorsus verbâ adhibeantur. Plerumque solent demonstrare insignem proprietatem triangulorum sphæricorum ac eam in solutione adhibete. Si nimirum in quovis triangulo latera mutentur in angulos, anguli viceversa mutantur in latera, & e contrario. Sed in ea mutatione in novo triangulo angulis quibusdam, vel lateribus substituenda sunt eorum complementa ad duos rectos. Hinc expositis casibus 1, 3, 5, ad eos reducunt reliquos tres ope ejusmodi transformationis. Sed quoniam & transformationis ipsius demonstratio, & determinatio casuum, in quibus lateri, vel angulo transformato substitui debet ejus complementum ad duos rectos, est aliquanto operosior, & per nostros canones æque facile immedie solvuntur posteriores tres casus, ac priores tres; libuit potius hanc aliam adhibere methodum, quæ multo & expeditior est visa, & magis concinna.

306. Pariter cum secantium Logarithmi in tabulis adscribi non soleant, consulto ubique secantes vitavimus, per solos sinus, & tangentes re perfectas.

307. In quinti & sexti casus solutione semidifferentiam ex tangente deduximus minorem 90° . Potuisset assumi etiam major, & solutio eadē prorsus obvenisset. Secundo enim atcu AD bifariam in L, si in casu quinto pro semidifferentia LE, assumptum fuisset ejus complementum ad duos rectos, nimirum LE; pro segmentis AE, DE obvenissent segmenta AE, DE, & in triangulo quidem rectangulo BAe invenitus fuisset angulus BAe, complementum ad duos rectos anguli BAE; sed angulus BAD obvenisset idem. Præstat tamen adhibere semidifferentiam minorem 90° ; tum quia immedie eruitur e tabulis, tum quia ob AL quoque minorem quadrante nunquam segmentum ex additione proveniens semicirculum excedet, qui aliquando excederetur, ut in ipso casu hujus figuræ segmentum DEAe

pro-

TRIGONOMETRÍA: 195

proveniret semicirculo majus, pro quo, ad conferendā ipsa segmenta inter se, sumendum esset De ejus complementum ad circulum; cum in vulgati Trigonometria, nec anguli, nec arcus semicirculo majoribus considerari soleant, ac eadem est ratio prō casu 6.

Scholion 2.

308. In quibusdam casibus solutiones aliquando faciliores haberi possunt. Si bina latera BA; BD essent inter se æqualia, vel bini anguli A; D æquales; perpendicularis BE searet bifariam basim AD, & angulum ABD. Nam (per num. 244) bini arcus AB, BD possunt esse æquales solum in æquali hinc inde distan-
tia a puncto E, & ibi anguli EBD, EBA; quorum species debet (per reg. 1.) esse eadem ac species EA, ED; erint ejusdem speciei; functiones vero æquales habebunt (per cat. 8); adeoque & inter se æquales erunt. Si autem assumatur ID \cong Ia, erit angulus BDE \cong BAE (per num. 248); adeoque \cong BAE, per n. 157, nec usquam alibi in semicirculo AEa constitui poterit angulus ipsi BAE æqualis: Cum autem quadrans EI sit æqualis dimidio semicirculo ADa; & arcus DI di-
midio Da; erit DE æqualis dimidio AD, adeoque æ-
qualis AE, & inde eodem arguento etiam ABE \cong DBE: Potro satis patet, quanto facilior inde solutio debeat profluere in hujusmodi triangulis Isosceliis.

309. Quod si aliquo triangulo detur latus quadrantiæquale admodum facile dato triangulo substituitur aliud, quod rectangulum sit, & quo resoluta, illud etiam resolvitur: Capto enim quadrante AE, & per B, & E ducto circulo maximo, erint (per n. 162) anguli AEB, ABE recti, & latus BE mensura anguli A; ac proinde arcus ED, & angulus EBD erint complementa arcus AD, & anguli ABD: Datis igitur iis, quæ pertinent ad triangulum ABD, dantur ea, quæ pertinent ad BED, & hoc resoluto illud re-
solvitur.

Scholion.

Ut unico conspectu pateant omnia, quæ ad usum

196 TRIGONOMETRIA;
spectant, apponeimus hic canones, cum combinationibus, & regulas.

Pro triangulis rectangulis

- I. *Radius ad sinum anguli, at sinus basis ad sinum lateris oppositi.*
 - II. *Radius ad cosinum anguli, ut tangens basis ad tangentem lateris adjacentis.*
 - III. *Radius ad tangentem anguli, ut sinus lateris adjacentis ad tangentem oppositi.*
 - IV. *Radius ad cosinum unius lateris, ut cosinus alterius ad cosinum basis.*
 - V. *Radius ad sinum anguli adjacentis, ut cosinus lateris ad cosinum anguli oppositi.*
 - VI. *Radius ad tangentem unius anguli, ut cosinus basis ad cotangentem alterius.*
- Reg. I. *Latera sunt ejusdem speciei cum angulis oppositis.*
- Reg. II. *Si duo latera vel duo anguli, vel latus cum angulo adjacenti fuerint ejusdem speciei; basis erit quadrante minor, si diverse, major, & viceversa.*

I.	Basis cum utroque latere:	Can. 4. Reg. 2. pars 1.
Combin. 2.	Basis cum utroque angulo:	Can. 6. Reg. 2. pars 2.
3.	Basis cum latere, & angulo adjacente:	Can. 2. Reg. 2. pars 3.
4.	Basis cum latere, & angulo opposito:	Can. 1.)) Reg. 1.
Combin. 5.	Utrumque laetus cum altero angulo:	Can. 3.)) vel nul-
6.	Uterque angulus cum altero latere:	Can. 5.)) la in ca-) am-
) biguo.

Pro obliquangulis.

VII. Sinus angulorum, ut sinus laterum oppositorum.

VIII. Cosinus segmentorum verticis, ut tangentes laterum oppositum.

IX. Sinus segmentorum basis ut tangentes angulorum oppositorum.

X. Cosinus segmentorum basis, ut cosinus laterum adiacentium.

XI. Sinus segmentorum verticis, ut cosinus angulorum adjacentium.

Reg. III. Si duo anguli ad basim fuerint ejusdem speciei perpendiculum intra basim cadet; si diversa, extra.

7.	Latera, & anguli.	can. 7.
8.	Latera, & segmenta verticis	can. 8.
Combin.	9. Latera, & segmenta basis.	can. 10.
	10. Anguli, & segmenta verticis.	can. 11.
	11. Anguli, & segmenta basis.	can. 9.

Pro inveniendis segmentis in casu datorum laterum, vel angulorum.

XII. Cotangens dimidia basis ad tangentem in semidifferentiae segmentorum, ut cotangens semisummae laterum ad tangentem semidifferentiae.

XIII. Tangens dimidii anguli verticalis ad tangentem semidifferentiae segmentorum, ut cotangens semisummae angulorum ad basim ad tangentem semidifferentiae.

TABULÆ FUNCTIONUM ARCUUM.

Gr.	Sinus	Tangen.	Secantes	Log. Sin.	Log. Tang
0	0	0	100000.00	— Infin.	— Infin.
1	1745.24	1745.51	100015.23	8.2418553	8.2419215
2	3489.95	3492.08	100060.95	8.5428192	8.5430838
3	5233.60	5240.78	100137.23	8.7188002	8.7193958
4	6975.65	6992.68	100244.19	8.8435845	8.8446437
5	8715.57	8748.87	100381.98	8.9402960	8.9419518
6	10452.85	10510.42	100550.82	9.0192346	9.0216202
7	12186.93	12278.46	100750.99	9.0898945	9.0891438
8	13917.31	14054.08	100982.76	9.1435553	9.1478025
9	15643.45	15837.44	101246.51	9.1943324	9.1997125
10	17364.82	17632.70	101542.67	9.2396702	9.2463188
11	19080.90	19438.03	101871.68	9.2805988	9.2886523
12	20791.17	21255.65	102234.07	9.3178789	9.3274745
13	22495.11	23086.82	102630.39	9.3520880	9.3633641
14	24192.19	24932.80	103061.35	9.3836752	9.3967711
15	25881.90	26794.92	103527.62	9.4129962	9.4280525
16	27563.74	28974.54	104029.94	9.4403381	9.4574964
17	29237.17	30573.97	104569.18	9.4659353	9.4853390
18	30901.70	32491.97	105146.22	9.4899824	9.5117760
19	32556.82	34432.76	105762.07	9.5126419	9.5369719
20	34202.94	36397.02	106417.78	9.5340519	9.5610659
21	35836.79	38386.40	107114.50	9.5543294	9.5841774
22	37460.66	40402.62	107853.47	9.5735754	9.6064096
23	39073.11	42447.49	108636.04	9.5918780	9.6278519
24	40673.66	44522.87	109453.63	9.6093133	9.6485831
25	42261.83	46630.77	110337.79	9.6259483	9.6686725

TABULÆ FUNCTIONUM ARCUUM.

Gr.	Sinus	Tangen.	Secantes	Log. Sin.	Log. Tang
90	100000.00	Infin.	Infin	10.0000000	Infin.
89	99984.77	5728996.16	5729868.81	9.9999338	11.7380785
88	99939.08	2863625.33	1861370.83	9.9997354	11.4569162
87	99862.95	1908113.67	1910732.25	9.9994744	11.2806042
86	99756.40	1430066.63	14.3558.70	9.9989408	11.1553563
85	99619.47	1143005.23	1147371.32	9.9983442	11.0580482
84	99452.18	951436.45	956677.22	9.9976143	10.9783798
83	99254.62	814434.64	820550.90	9.9967507	10.9108562
82	99026.80	711536.97	718429.65	9.9957528	10.8521975
81	98768.83	631375.15	639245.32	9.9946199	10.8001873
80	98480.77	567128.18	575877.05	9.9933515	10.7536812
79	98162.71	514455.40	524084.31	9.9919466	10.7113477
78	97814.76	470463.01	480973.43	9.9904044	10.6725255
77	97437.01	433147.59	444541.15	9.9887235	10.6366359
76	97029.57	401070.09	413356.55	9.9869041	10.6032289
75	96592.58	373205.08	386370.33	9.9849438	10.5719475
74	96126.17	348741.44	362795.53	9.9828416	10.5425036
73	95630.48	328075.26	342030.36	9.9805963	10.5146610
72	95105.65	307768.35	323606.80	9.9781063	10.4882240
71	94554.85	290421.09	307155.35	9.9756701	10.4630281
70	93969.26	274747.74	292380.44	9.9729858	10.4389341
69	93318.04	260508.91	279042.81	9.9701517	10.4158216
68	92718.39	247508.69	266946.72	9.9651619	10.3935904
67	92050.49	235585.24	255930.47	9.9640261	10.3721481
66	91394.54	224603.68	245859.33	9.9607302	10.3514169
65	90630.78	214450.69	226620.16	9.9572757	10.223271

TABULÆ FUNCTIONUM ARCUUM.

Gr.	Sinus	Tangen.	Secantes	Log. Sin.	Log. Tang
26	43839.12	48773.26	111266.19	9.6418420	9.6881818
27	45399.05	50952.54	112233.62	9.6570468	9.7071659
28	46947.16	53170.94	113257.01	9.6716093	9.7256744
29	48480.96	55430.09	114335.41	9.6855712	9.7437520
30	50000.00	57731.03	117735.05	9.6989700	9.7614394
31	51503.81	60086.08	116663.34	9.7118393	9.7787737
32	52991.93	62486.94	117917.84	9.7242097	9.7957892
33	54463.90	64940.76	119236.33	9.7361688	9.8125174
34	55919.29	67450.85	120621.80	9.7475617	9.8289874
35	57357.64	70020.75	122077.46	9.7589913	9.8452268
36	58778.53	72654.26	123606.80	9.7692187	9.8612610
37	60181.50	75355.40	125213.57	9.7794630	9.8771144
38	61566.15	78128.56	126901.82	9.7893420	9.8928098
39	62934.04	80978.40	128675.96	9.7988718	9.9083692
40	64278.76	83909.96	130540.73	9.8080975	9.9238135
41	65605.90	86928.68	131501.30	9.8169429	9.9391631
42	66913.06	90040.41	134563.27	9.8255109	9.9544374
43	68299.84	93257.51	136732.75	9.8337833	9.9696559
44	69465.84	96168.88	139016.36	9.8417713	9.9848372
45	70710.68	100000.00	141421.36	9.8494850	10.0000000

TABULÆ FUNCTIONUM ARCUUM.

Gr.	Sinuſ	Tangen.	Secantes	Log. Sin.	Log. Tang
64	89879.40	205030.38	228117.20	9. 9536602	10. 3118181
63	89100.65	196261.05	220268.93	9. 9498809	10. 2928341
62	88294.76	188072.65	213005.45	9. 9459349	10. 2743256
61	87461.97	180404.78	206266.53	9. 9418193	10. 2562480
60	86602.54	173205.08	200000.00	9. 9375306	10. 2385606
59	85716.73	166427.95	194160.40	9. 9330656	10. 2212263
58	84804.81	160033.45	188707.99	9. 9284205	10. 2042108
57	83867.06	153986.50	183607.84	9. 9235914	10. 1874826
56	82903.76	148256.10	178829.16	9. 9185742	10. 1710126
55	81915.21	142814.80	174344.68	9. 9133645	10. 1547732
54	80901.70	137638.19	170130.16	9. 9079576	10. 1387390
53	79863.55	132704.48	166164.01	9. 9023486	10. 1228856
52	78801.08	127994.16	162426.92	9. 8965321	10. 1071902
51	77714.60	123489.72	158901.57	9. 8905026	10. 0916308
50	76604.44	119175.36	155572.38	9. 8842540	10. 0761865
49	75470.96	115035.84	152425.31	9. 8777799	10. 0608369
48	74314.48	112061.25	149447.65	9. 8710735	10. 0455626
47	73135.37	107236.87	146627.92	9. 8641275	10. 0303441
46	71933.98	103553.03	143955.65	9. 8569341	10. 0151628
45	70710.68	100000.00	141421.36	9. 8494850	10. 0000000

NUMERORUM LOGARITHMI.

N.	Logarith.	N.	Logarith.	N.	Logarith.
1	0. 0000000	34	1. 5314789	67	1. 8260748
2	0. 3010300	35	1. 5440680	68	1. 8325089
3	0. 4771213	36	1. 5563025	69	1. 8368491
4	0. 6020600	37	1. 5682017	70	1. 8450980
5	0. 6989700	38	1. 5797836	71	1. 8512583
6	0. 7781512	39	1. 5610646	72	1. 8573325
7	0. 8450980	40	1. 6020600	73	1. 8633229
8	0. 9030900	41	1. 6127839	74	1. 8692317
9	0. 9542425	42	1. 6232493	75	1. 8750613
10	1. 0000000	43	1. 6334685	76	1. 8808136
11	1. 0413927	44	1. 6434527	77	1. 8864907
12	1. 0791812	45	1. 6532125	78	1. 8920946
13	1. 1139433	46	1. 6627578	79	1. 8976271
14	1. 1461280	47	1. 6720979	80	1. 9030900
15	1. 1760913	48	1. 6812412	81	1. 9084850
16	1. 2041200	49	1. 6901961	82	1. 9138138
17	1. 2304489	50	1. 6989700	83	1. 9190781
18	1. 2552725	51	1. 7075702	84	1. 9242793
19	1. 2787536	52	1. 7160033	85	1. 9294189
20	1. 3010300	53	1. 7242759	86	1. 9344984
21	1. 3222193	54	1. 7323938	87	1. 9395192
22	1. 3424227	55	1. 7403627	88	1. 9444827
23	1. 3617278	56	1. 7481880	89	1. 9493900
24	1. 3802112	57	1. 7558749	90	1. 9542425
25	1. 3979400	58	1. 7634280	91	1. 9590454
26	1. 4142733	59	1. 7708520	92	1. 9637878
27	1. 4313638	60	1. 7781512	93	1. 9684829
28	1. 4471580	61	1. 7853298	94	1. 9731279
29	1. 4623980	62	1. 7923917	95	1. 9777236
30	1. 4771213	63	1. 7993405	96	1. 9822712
31	1. 4913617	64	1. 8061800	97	1. 9867717
32	1. 5051500	65	1. 8129134	98	1. 9912261
33	1. 5185139	66	1. 8195439	99	1. 9956352
34	1. 5314789	67	1. 8260748	100	1. 0000000

NUMERORUM LOGARITHMI.

N.	Logarith.	N.	Logarith.	N.	Logarith.
101	2. 0043214	134	2. 1271048	167	2. 2227165
102	2. 0086002	135	2. 1303338	168	2. 2253093
103	2. 0128372	136	2. 1335389	169	2. 2278667
104	2. 0170333	137	2. 1367206	170	2. 2304489
105	2. 0211893	138	2. 1393794	171	2. 2329961
106	2. 0253059	139	2. 1430148	172	2. 2355264
107	2. 0293838	140	2. 1461280	173	2. 2380461
108	2. 0334238	141	2. 1492191	174	2. 2405492
109	2. 0374265	142	2. 1522883	175	2. 2430380
110	2. 0413927	143	2. 1553360	176	2. 2455127
111	2. 0453230	144	2. 1583625	177	2. 2479733
112	2. 0492180	145	2. 1613680	178	2. 2504200
113	2. 0530784	146	2. 1643529	179	2. 2528539
114	2. 0569049	147	2. 1672173	180	2. 2552725
115	2. 0606976	148	2. 1702617	181	2. 2576786
116	2. 0644580	149	2. 1731863	182	2. 2600714
117	2. 0681859	150	2. 1760913	183	2. 2624511
118	2. 0718820	151	2. 1789769	184	2. 2648178
119	2. 0755470	152	2. 1818436	185	2. 2671717
120	2. 0791812	153	2. 1846914	186	2. 2695129
121	2. 0827854	154	2. 1875207	187	2. 2718416
122	2. 0863598	155	2. 1903317	188	2. 2741578
123	2. 0899051	156	2. 1931246	189	2. 2764618
124	2. 0934217	157	2. 1958996	190	2. 2787536
125	2. 0969100	158	2. 1986571	191	2. 2810334
126	2. 1003705	159	2. 2013971	192	2. 2833012
127	2. 1038037	160	2. 2041200	193	2. 2855573
128	2. 1072100	161	2. 2068259	194	2. 2878017
129	2. 1105897	162	2. 2095150	195	2. 2900346
130	2. 1139433	163	2. 2121876	196	2. 2922561
131	2. 1172713	164	2. 2148438	197	2. 2944662
132	2. 1205739	165	2. 2174839	198	2. 2966652
133	2. 1238516	166	2. 2201081	199	2. 2988531
134	2. 1271048	167	2. 2227165	200	2. 3010300

NUMERORUM LOGARITHMI.

N.	Logarith.	N.	Logarith.	N.	Logarith.
201	2.3031961	234	2.3692159	267	2.4265113
202	2.3053541	235	2.3710679	268	2.4281348
203	2.3074960	236	2.3729120	269	2.4297523
204	2.3096302	237	2.3747483	270	2.4313638
205	2.3117539	238	2.3765770	271	2.4329693
206	2.3138672	239	2.3783979	272	2.4345669
207	2.3159703	240	2.3802112	273	2.4361626
208	2.3180633	241	2.3820170	274	2.4377506
209	2.3201463	242	2.3838154	275	2.4393327
210	2.3222193	243	2.3856063	276	2.4409091
211	2.3242825	244	2.3873898	277	2.4424798
212	2.3263359	245	2.3891661	278	2.4440448
213	2.3283790	246	2.3909391	279	2.4456042
214	2.3304138	247	2.3926970	280	2.4471580
215	2.3324385	248	2.3944517	281	2.4487063
216	2.3344537	249	2.3961993	282	2.4502491
217	2.3364597	250	2.3979400	283	2.4517864
218	2.3384565	251	2.3996737	284	2.4533183
219	2.3404441	252	2.4014005	285	2.4548449
220	2.3424227	253	2.4031205	286	2.4563660
221	2.3443923	254	2.4048337	287	2.4578819
222	2.3463530	255	2.4065402	288	2.4593925
223	2.3483049	256	2.4082400	289	2.4608978
224	2.3502480	257	2.4099331	290	2.4623980
225	2.3521825	258	2.4116197	291	2.4638930
226	2.3541084	259	2.4132998	292	2.4653828
227	2.3560259	260	2.4149733	293	2.4668676
228	2.3579348	261	2.4166405	294	2.4683473
229	2.3598355	262	2.4183013	295	2.4698220
230	2.3617278	263	2.4199557	296	2.4712917
231	2.3636120	264	2.4216039	297	2.4727564
232	2.3654880	265	2.4232459	298	2.4742163
233	2.3673559	266	2.4248816	299	2.4756712
234	2.3692159	267	2.4265113	300	2.4771213

NUMERORUM LOGARITHMI.

N.	Logarith.	N.	Logarith.	N.	Logarith.
301	2.4785665	334	2.5237465	367	2.5646661
302	2.4800069	335	2.5250448	368	2.5658478
303	2.4814426	336	2.5263393	369	2.5670264
304	2.4828736	337	2.5276299	370	2.5682017
305	2.4842998	338	2.5289167	371	2.5693739
306	2.4857214	339	2.5301997	372	2.5705429
307	2.4871384	340	2.5314789	373	2.5717086
308	2.4885507	341	2.5327544	374	2.5728716
309	2.4899585	342	2.5340261	375	2.5740313
310	2.4913617	343	2.5352941	376	2.5751878
311	2.4927604	344	2.5365584	377	2.5763413
312	2.4941546	345	2.5378191	378	2.5774918
313	2.4955443	346	2.5390761	379	2.5786392
314	2.4969296	347	2.5403295	380	2.5797836
315	2.4983106	348	2.5415793	381	2.5806250
316	2.4996871	349	2.5428254	382	2.5820634
317	2.5010593	350	2.5440680	383	2.5831988
318	2.5024271	351	2.5453071	384	2.5843312
319	2.5037907	352	2.5465427	385	2.5854607
320	2.5051500	353	2.5477747	386	2.5865873
321	2.5065050	354	2.5490033	387	2.5877110
322	2.5078559	355	2.5502284	388	2.5888317
323	2.5092025	356	2.5514500	389	2.5899496
324	2.5105450	357	2.5526682	390	2.5910646
325	2.5118834	358	2.5538830	391	2.5921768
326	2.5132176	359	2.5550944	392	2.5932861
327	2.5145477	360	2.5563025	393	2.5943925
328	2.5158738	361	2.5575072	394	2.5954962
329	2.5171959	362	2.5587086	395	2.5965971
330	2.5185139	363	2.5599066	396	2.5976952
331	2.5198280	364	2.5611014	397	2.5987905
332	2.5211381	365	2.5622929	398	2.5998831
333	2.5224442	366	2.5634811	399	2.6009729
334	2.5237465	367	2.5646661	400	2.6020600

NUMERORUM LOGARITHMI:

N.	Logarith.	N.	Logarith.	N.	Logarith.
401	2.6031444	434	2.6374897	467	2.6693169
402	2.6042261	435	2.6384893	468	2.6702459
403	2.6053050	436	2.6394865	469	2.6711728
404	2.6063814	437	2.6404814	470	2.6720979
405	2.6074550	438	2.6414741	471	2.6730209
406	2.6085260	439	2.6424645	472	2.6739420
407	2.6095944	440	2.6434527	473	2.6748611
408	2.6106602	441	2.6444386	474	2.6757783
409	2.6117233	442	2.6454223	475	2.6766936
410	2.6127839	443	2.6464037	476	2.6776069
411	2.6138418	444	2.6473830	477	2.6785184
412	2.6148972	445	2.6483600	478	2.6794279
413	2.6159500	446	2.6493349	479	2.6803355
414	2.6170003	447	2.6503075	480	2.6812412
415	2.6180481	448	2.6512780	481	2.6821451
416	2.6190933	449	2.6522463	482	2.6830470
417	2.6201361	450	2.6532125	483	2.6839471
418	2.6211763	451	2.6541765	484	2.6848454
419	2.6222140	452	2.6551384	485	2.6857417
420	2.6232493	453	2.6560982	486	2.6866363
421	2.6242821	454	2.6570558	487	2.6875290
422	2.6253124	455	2.6580114	488	2.6884198
423	2.6263404	456	2.6589648	489	2.6893089
424	2.6273659	457	2.6599162	490	2.6901961
425	2.6283889	458	2.6608655	491	2.6910815
426	2.6294096	459	2.6618127	492	2.6919651
427	2.6304379	460	2.6627578	493	2.6928469
428	2.6314438	461	2.6630709	494	2.6937269
429	2.6324573	462	2.6646420	495	2.6946052
430	2.6334685	463	2.6655810	496	2.6954817
431	2.6344773	464	2.6665180	497	2.6963564
432	2.6354837	465	2.6674529	498	2.6972293
433	2.6364879	467	2.6683859	499	2.6981005
434	2.6374897	467	2.6693169	500	2.6989700

NUMERORUM LOGARITHMI.

N.	Logarith.	N.	Logarith.	N.	Logarith.
501	2.6998377	534	2.7275413	567	2.7535831
502	2.7007037	535	2.7283538	568	2.7543483
503	2.7015680	536	2.7291648	569	2.7551123
504	2.7024305	537	2.7299743	570	2.7558749
505	2.7032914	538	2.7307823	571	2.7566361
506	2.7041505	539	2.7315888	572	2.7573960
507	2.7050080	540	2.7323938	573	2.7581546
508	2.7058637	541	2.7331973	574	2.7589119
509	2.7067178	542	2.7339993	575	2.7596678
510	2.7075702	543	2.7347998	576	2.7604225
511	2.7084209	544	2.7355989	577	2.7611758
512	2.7092700	545	2.7363965	578	2.7619278
513	2.7101174	546	2.7371926	579	2.7626786
514	2.7109631	547	2.7379873	580	2.7634280
515	2.7118072	548	2.7387806	581	2.7641761
516	2.7126497	549	2.7395723	582	2.7649230
517	2.7134905	550	2.7403627	583	2.7656686
518	2.7143298	551	2.7411516	584	2.7664128
519	2.7151674	552	2.7419391	585	2.7671559
520	2.7160033	553	2.7427251	586	2.7678976
521	2.7168377	554	2.7435098	587	2.7686381
522	2.7176705	555	2.7442930	588	2.7693773
523	2.7185017	556	2.7450748	589	2.7701153
524	2.7193313	557	2.7458552	590	2.7708520
525	2.7201593	558	2.7466342	591	2.7715875
526	2.7209857	559	2.7474118	592	2.7723217
527	2.7218106	560	2.7481880	593	2.7730547
528	2.7226339	561	2.7489629	594	2.7737864
529	2.7234557	562	2.7497363	595	2.7745170
530	2.7242759	563	2.7505084	596	2.7752463
531	2.7250945	564	2.7512791	597	2.7759743
532	2.7259116	565	2.7520484	598	2.7767012
533	2.7267272	566	2.7528164	599	2.7774268
534	2.7275413	567	2.7535831	600	2.7781512

NUMERORUM LOGARITHMI.

N.	Logarith.	N.	Logarith.	N.	Logarith.
601	2.7788745	634	2.8020893	667	2.8241258
602	2.7795965	635	2.8027737	668	2.8247765
603	2.7803173	636	2.8034571	669	2.8254261
604	2.7810369	637	2.8041394	670	2.8260748
605	2.7817554	638	2.8048207	671	2.8267225
606	2.7824726	639	2.8055009	672	2.8273693
607	2.7831887	640	2.8061800	673	2.8280151
608	2.7839036	641	2.8068580	674	2.8286599
609	2.7846173	642	2.8075350	675	2.8293038
610	2.7853298	643	2.8082110	676	2.8299467
611	2.7860412	644	2.8088859	677	2.8305887
612	2.7867514	645	2.8095597	678	2.8312297
613	2.7874605	646	2.8102325	679	2.8318698
614	2.7881684	647	2.8109043	680	2.8325089
615	2.7888751	648	2.8115750	681	2.8331471
616	2.7895807	649	2.8122447	682	2.8337844
617	2.7902852	650	2.8129134	683	2.8344207
618	2.7909885	651	2.8135810	684	2.8350561
619	2.7916906	652	2.8142476	685	2.8356906
620	2.7923917	653	2.8149132	686	2.8363241
621	2.7930916	654	2.8155777	687	2.8369567
622	2.7937904	655	2.8162413	688	2.8375884
623	2.7944880	656	2.8169038	689	2.8382192
624	2.7951846	657	2.8175654	690	2.8388491
625	2.7958800	658	2.8182259	691	2.8394780
626	2.7955743	659	2.8188854	692	2.8401061
627	2.7972675	660	2.8195439	693	2.8407332
628	2.7979596	661	2.8202025	694	2.8413595
629	2.7986506	662	2.8208580	695	2.8419848
630	2.7993405	663	2.8215135	696	2.8426092
631	2.8000294	664	2.8221681	697	2.8432328
632	2.8007171	665	2.8228216	698	2.8438554
633	2.8014037	666	2.8234742	699	2.8444772
634	2.8020893	667	2.8241258	700	2.8450980

NUMERORUM LOGARITHMI.

N.	Logarith.	N.	Logarith.	N.	Logarith.
701	2.8457180	734	2.8656961	767	2.8857954
702	2.8463371	735	2.8662873	768	2.8853612
703	2.8469553	736	2.8668778	769	2.8859263
704	2.8475727	737	2.8674675	770	2.8864907
705	2.8481891	738	2.8680564	771	2.8870544
706	2.8488047	739	2.8686444	772	2.8876173
707	2.8494194	740	2.8692317	773	2.8881795
708	2.8500333	741	2.8698182	774	2.8887410
709	2.8506462	742	2.8704039	775	2.8893017
710	2.8512583	743	2.8709888	776	2.8898617
711	2.8518996	744	2.8715729	777	2.8904210
712	2.8524800	745	2.8721563	778	2.8909796
713	2.8530895	746	2.8727388	779	2.8915375
714	2.8536982	747	2.8733206	780	2.8920946
715	2.8543060	748	2.8739016	781	2.8926510
716	2.8549130	749	2.8744818	782	2.8932068
717	2.8555192	750	2.8750613	783	2.8937618
718	2.8561244	751	2.8756399	784	2.8943161
719	2.8567289	752	2.8762178	785	2.8948697
720	2.8573325	753	2.8767950	786	2.8954225
721	2.8579353	754	2.8773712	787	2.8959747
722	2.8585372	755	2.8779469	788	2.8965262
723	2.8591383	756	2.8785218	789	2.8970770
724	2.8597386	757	2.8780959	790	2.8976271
725	2.8603380	758	2.8796692	791	2.8981765
726	2.8609366	759	2.8802418	792	2.8987252
727	2.8615344	760	2.8888136	793	2.8992732
728	2.8621314	761	2.8813847	794	2.8998205
729	2.8627275	762	2.8819550	795	2.9003571
730	2.8633229	763	2.8825245	796	2.9009131
731	2.8639174	764	2.8830934	797	2.9014583
732	2.8645111	765	2.8836614	798	2.9020029
733	2.8651040	766	2.8842288	799	2.9025468
734	2.8656961	767	2.8847954	800	2.9030900

NUMERORUM LOGARITHMI.

N.	Logarith.	N.	Logarith.	N.	Logarith.
801	2.9036325	834	2.9211660	867	2.9380191
802	2.9041744	835	2.9216865	868	2.9385197
803	2.9047155	836	2.9222063	869	2.9390198
804	2.9052560	837	2.9227255	870	2.9395192
805	2.9057959	838	2.9232440	871	2.9400181
806	2.9063350	839	2.9237620	872	2.9405165
807	2.9068735	840	2.9242793	873	2.9410142
808	2.9074114	841	2.9247960	874	2.9415114
809	2.9079485	842	2.9253121	875	2.9420080
810	2.9084850	843	2.9258276	876	2.9425041
811	2.9090209	844	2.9263424	877	2.9429996
812	2.9095560	845	2.9268567	878	2.9434945
813	2.9100905	846	2.9273704	879	2.9439889
814	2.9106244	847	2.927834	880	2.9444827
815	2.9111578	848	2.9283958	881	2.9449759
816	2.9116902	849	2.9289077	882	2.9454680
817	2.9122221	850	2.9294189	883	2.9459607
818	2.9127533	851	2.9299296	884	2.9464523
819	2.9132839	852	2.9304396	885	2.9469433
820	2.9138138	853	2.9309499	886	2.9474337
821	2.9143432	854	2.9314579	887	2.9479236
822	2.9148718	855	2.9319661	888	2.9484130
823	2.9153998	856	2.9324738	889	2.9489018
824	2.9159272	857	2.9329808	890	2.9493900
825	2.9164539	858	2.9334873	891	2.9498777
826	2.9169800	859	2.9339932	892	2.9503648
827	2.9175055	860	2.9344984	893	2.9508514
828	2.9180303	861	2.9350031	894	2.9513375
829	2.9185545	862	2.9355073	895	2.9518230
830	2.9190781	863	2.9360108	896	2.9523080
831	2.9196010	864	2.9365137	897	2.9527924
832	2.9201233	865	2.9270161	898	2.9532763
833	2.9206450	866	2.9375179	899	2.9537597
834	2.9211660	867	2.9380191	900	2.9542425

NUMERORUM LOGARITHMI.

N.	Logarith.	N.	Logarith.	N.	Logarith.
901	2.9547248	934	2.9703469	967	2.9854265
902	2.9552065	935	2.9708116	968	2.9858754
903	2.9556877	936	2.9712758	969	2.9863236
904	2.9561684	937	2.9717396	970	2.9867717
905	2.9566486	938	2.9722028	971	2.9872192
906	2.9571282	939	2.9726656	972	2.9876663
907	2.9576073	940	2.9731279	973	2.9881128
908	2.9580858	941	2.9735896	974	2.9885590
909	2.9585639	942	2.9740509	975	2.9890046
910	2.9590414	943	2.9745117	976	2.9894498
911	2.9595184	944	2.9749720	977	2.9898946
912	2.9599948	945	2.9754318	978	2.9903389
913	2.9604708	946	2.9758911	979	2.9907827
914	2.9609462	947	2.9763500	980	2.9912261
915	2.9614211	948	2.9768083	981	2.9916690
916	2.9618955	949	2.9772662	982	2.9921115
917	2.9623653	950	2.9777236	983	2.9925535
918	2.9628427	951	2.9781805	984	2.9929951
919	2.9633155	952	2.9786369	985	2.9934362
920	2.9637878	953	2.9790929	986	2.9938769
921	2.9642596	954	2.9795484	987	2.9943171
922	2.9647309	955	2.9800034	988	2.9947569
923	2.9652017	956	2.9804579	989	2.9951963
924	2.9656720	957	2.9809119	990	2.9956352
925	2.9661417	958	2.9813655	991	2.9960737
926	2.9666110	959	2.9818186	992	2.9965117
927	2.9670797	960	2.9822712	993	2.9969492
928	2.9675480	961	2.9827234	994	2.9973864
929	2.9680157	962	2.9831751	995	2.9978231
930	2.9684829	963	2.9836263	996	2.9982593
931	2.9689497	964	2.9840770	997	2.9986952
932	2.9694159	965	2.9845273	998	2.9991305
933	2.9698816	966	2.9849771	999	2.9995655
934	2.9703469	967	2.9854265	1000	3.0000000

APPENDIX.



DEMUS hic nonnulla, quæ ad Geometriæ planæ potissimum, & Arithmetica tractatus vel prorsus necessaria censuimus, vel maximè utilia. Tractatus eosdem jam olim conscripferamus in privatum auditorum usum, qui ab Editore latine redditi, & cæteris nunc a nobis conscriptis vel auctis premissi sunt. Porro in Geometria plana seriem quandam theorematum jam tum ordinavimus, ex quibus fere omnia, quæ apud Euudem, & cæteros Elementorum constructores occurunt, vel sponte fuerent, vel facile, Præceptore indicante, deduci possent, soliti viva voce Tyronibus indicare deductiones ipsas, eosque ea ratione exercere in demonstratione theorematum, & problematum solutione. In Arithmetica verò demonstrationes pariter viva voce exponere soliti, eas plerumque ibidem omisimus cum obrui soleat Tyronis animus, si dum in operationibus Arithmeticis exercetur, & præcepta ad usum dedit, demonstrationum, quæ scripto admodum difficulter satis dilucide exponi possunt, longiore ambitu interturbatur.

Hic igitur ea, quæ Præceptor Tyroni insinuare potest, & quæ nos nostris Auditoribus insinuabimus, indicata potius, quam explicata adjiciemus. Erunt in iis & annotationes quædam, & problemata exercendo Tyroni apta. Poterit autem hæc Tyroni ipsi Præceptor vel omnia, vel aliqua tantum selectiora pro ejus captu, & otio propone, vel dum primum elementa percurrit, vel dum, absolutis semel sine hac appendice elementis, ea iterum relegit. Si Tyro sine ullo Præceptore Geometriam addiscit; hæc ubi elementa illa absolverit, videre poterit, sed nonnunquam consulendus erit aliquis Geometriæ peritor, ubi in deductione theorematum, vel solutione problematum vires suas incassum exercuerit: quod tamen multo rarius continget, si schemata, quæ hic præcipimus,

dili-

ligenter delineare curet. Omittimus autem delineationem ipsam, ut eo acrius addiscens industria exeatetur, & ex veritatibus, tanquam suis quodammodo compertis, jucundorem capiat voluptatem. Censemus autem nihil utilius ad Geometriam penitus cognoscendam haberi posse, quam hujusmodi contentio Tyronis in deducendis theorematis, vel solvendis problematis; qua sit, ut Geometria ipsa ejus animo multo altius insideat, & investigationis fontes aperiantur.

§. I.

De iis, quæ pertinent ad Geometriam Planam:

Axioma 5. converti posse notet in lineis rectis, & angulis æqualibus, quæ si æqualia sunt, debent congruere, & inde pendet demonstratio prop. 2, & 3.

2. Lineæ rectæ, vel curvæ, ut & superficie planæ, vel curvæ definitionem omisimus, quod nota sint æquæ, ac quid sit unius, æquale, minus. At illud notandum, eam esse rectitudinis naturam, ut si bina puncta rectæ congruant cum binis alterius, debeant totæ ipsæ rectæ congruere, licet in infinitum productæ. Inde eruuntur hæc bina Euclidis axiomata. Rectæ lineæ spatium non claudunt: Rectæ lineæ segmentum commune non habent nimirum in communem caudam non desinunt.

3. In schol. post def. 4 pag. 2. lin. 35. notentur illa verba: *posita corporum continuitate*: nam si corpora constent punctis indivisibilibus, & a se invicem remotis, licet connexis ratione quadam exposita in dissertatione de lumine habita in Collegio Röm. an. 1748, puncta quidem realia sunt, & punctum quodvis potest solum etiam existere: corpora continuam extensionem, quam in iis Physici communiter admittunt nullam habent, ac in ea sententia alia est lineæ, superficie, solidi idea. Linea est spatium per cursum motu puncti, superficies concipitur generari motu lineæ, solidum motu superficie.

4. Post def. 6. addi potest segmentum circumferentie circuli dici *arcum*, *rectam*, quæ ipsum subtendit, *chordam*, figuram interceptam arcu & chorda, *segmentum*, interceptam binis radiis *sectorum*.

5. In schol. post def. 6. assumitur pag. 3 lin. 22. binas rectas ductas ex communī centro binorum circulorum, intercipere tot gradus in minori, quo in majori. Id ipsum accuratè demonstrari potest. Si majoris circuli circumferentia concipiatur divisa in quotcumque partes æquales, ut in gradus, & ad singulas divisiones ducantur rectæ: ex secabunt in partes pariter æquales etiam peripheriam circuli minoris: Nam si quis sector majoris circuli concipiatur revolvi circa alterum radium; arcus circuli majoris debet congruere arcui sibi proximo, cum omnia eorum puncta æque distent a centro, & ipsi æquales sint. Inde autem facile eruitur, debere simul & arcum minoris circuli arcui sibi proximo congruere, adeoque æqualem esse. Inde autem cætera sponte fluunt.

7. Eadem conversione demonstratur etiam circulum a diametro secari in binos æquales semicirculos, quod in defin. 5. assumitur.

8. Ope postulati 3 ad datum punctum ponì potest recta æqualis rectæ datæ, quod Eucli est prop. 2 l. i. Id ipse operosiore methodo solvit; cum non assumat inter postulata translationem intervalli ex uno in alium locum, quod nos, ut evidenter possibile, & factu facile assumpsimus cum multis.

9. Potest jam hinc insinuare Tyroni Praceptor discri-
men inter problemata determinata, quæ vel unicam so-
lutionem admittunt, ut ubi a recta majore absindenda
est recta datæ minori æqualis incipiendo a dato extre-
mo, vel earum numerum determinatum, cuiusmodi plura
infra occurrent, & indeterminata, quæ infinitas solu-
tiones admittunt, ut hic, ubi circa datum punctum de-
scripto circulo cum intervalllo rectæ datæ, quævis recta
ad ejus peripheriam terminata solvit problema.

10. Hinc Tyro loci geometrici ideam habebit, qui
nimis-

nimirum omnes indeterminati problematis solutiones continet. Circuli descripti peripheria respectu hujus problematis est locus geometricus.

11. In scholio post def. 7 assumuntur arcus circuli promensura angularorum. Notet Tyro, id rite praestari, ubi vertex anguli sit in centro. Facile enim demonstratur ope superpositionis, angulos ad centrum æquales subtendi arcubus æqualibus, & viceversa. Quare duplo, triplo, centuplo angulo respondet duplus, triplus, centuplus arcus.

12. In Coroll. sequenti assumitur arcum PQ abscissum centro P intervallo BE esse æqualem arcu BE. Id accuratè demonstrari potest ex prop. 4, quæ hinc non pendet. Ductis enim rectis BE, PQ, habebuntur bina triangula BCE, PMQ, in quibus latera unius erunt æqualia lateribus alterius, adeoque & angulus ad centrum C æqualis; unde patet, quo pacto in dato circulo applicari possit chorda æqualis datæ cuivis rectæ, quam tamen non posse diametro majorem esse patebit infra n. 50.

13. Porro hinc deducitur hoc theorema. In æqualibus circulis chordæ æquales subtendunt arcus æquales ita nimirum, ut cum quævis chorda subtendat hinc inde binos arcus; bini minores æquentur inter se, & bini majores inter se.

14. Ad defin. 8. exponi potest norma, cuius ope rectæ datæ rectæ perpendicularis duci potest per datum punctum, & ejus examen, quod fit producto altero anguli recti latere, videndo an ea congruat novo angulo recto, qui fit ejusmodi productione. A norma ipsa perpendicularis appellatur normalis.

15. Corollarium 2. & 4. defin. 10. converti possunt. Si fuerint (Fig. 2.) anguli HCF, HCL simul æquales duobus rectis, rectæ, CF, CL jacebunt in directum, quia FC producta debet efficere cum HC angulum, qui sit complementum ad duos rectos anguli HCF, adeoque æqualis ipsi HCL, & si binæ rectæ CH, CK efficient cum recta FL angulos FCK, LCH ad verticem oppositos æquales, jacebunt pariter in directum.

Utriusque hujus inversi theorematis usus est frēquentissimus, primum Euclides demonstravit, secundum omisit.

16. Potest Tyroni præceptor proponere, ut ope horum corollariorum ostendat, quo pacto extorsum metiri liceat angulum, quem binæ externæ facies arcis, vel cuiusvis alterius ædificii continent in plano horizontali. Præstabitur ope corol. 2. si producto altero anguli latere, mensuretur is, quem ea linea continet cum latere altero, & capiatur complementum ad gr. 180, ope corol. 3, si ducatur quævis recta ab ipso anguli; vertice, & a gradibus 360. demantur bini anguli, quos ea cum binis iis lateribus continet; ope cor. 4, si producto utroque latere mensuretur angulus ad verticem oppositus.

17. Quod si eo pacto omnes arcis anguli determinantur, & angulorum latera mensurentur passibus; substituendo passibus ipsis particulas æquales quascunque, poterit arcis ambitus delineari.

18. In parallelarum doctrina assumpsimus in schol. post defin. 17. æqualem inclinationem ad quamvis rectam, quæ nihilo minus evidens est, quam quidquid alii assumunt. At addi potest illud, rectas, quæ convergunt; si satis producantur, debere dénum concurrere, licet infinita sint genera curvarum, quæ in infinitum productæ ad rectam, vel ad se invicem accedunt ultra quoscunque limites; quin usquam concurrent, adeoque rectam, quæ parallelarum alteram fecerit, debere secare & alteram.

19. Hinc infertur theorema, quod Euclides pro axiome assumpsit. Si recta incidens in binas rectas fecerit angulos internos ad eandem partem minores duobus rectis, ex rectæ satis productæ concurrent. Parallelæ enim continent angulos æquales binis rectis. Quare si per concursum alterius ducatur recta alteri parallelæ; illa prior hanc novam parallelam secabit, adeoque & illam alteram rectam.

20. Post hic proponi demonstrandum theorema, quod summo usui esse solet, Binæ rectæ binis aliis parallelæ, si uspiam concurrunt, continent angulos ad easdem partes æquales angulis, qui ab iis continentur. Facile

cile demonstrabitur producendo earum alteram, si opus sit; donec occurrat harum alteri. Statim enim apparet in ipso concursu haberi angulum æqualem utrilibet e præcedentibus.

21. Post def. 18. addi potest, inter figuras quadrilinæas *Trapezium* esse id, quod habet latera & angulos ut cunque inæquales, *Rhombum*, qui omnia latera æqualia habet *Rhomboideum*, quæ bina quævis opposita æqualia. *Multilateras*, *multangulas*, vel *polygonas* dici figuras plurium laterum, & angulorum, *pentagonum* quinque, *exagonum* sex, *decagonum* decem habere latera, & ita porro. *Polygonum regulare* & latera omnia habere æqualia, & omnes angulos æquales.

22. Post prop. 1. proponi potest quartendum, quam summam conficiant omnes anguli interni cujusvis polygoni, quam omnes externi. Si a singulis angulis ad quodvis punctum assumptum intra ipsum ducantur rectæ, sient tot triangula, quot sunt latera, & omnes eorum anguli simul æquantur omnibus angulis internis polygoni, una cum angulis, qui sunt in eo punto, & æquantur 4. rectis. Hinc omnes anguli interni æquantur tot rectis, quot exprimit duplus numerus laterum demptis 4. Cumque quivis externus cum suo interno æquetur duobus rectis; omnes simul externi æquabuntur illis 4. rectis, qui a duplo laterum numero dempti sunt ad habendos omnes internos.

23. Inde eruetur quot graduum debeat esse angulus internus cujusvis polygoni regularis, dividendo summam per numerum laterum. In pentagono summa æquatur 6. rectis sive gradibus 540, quæ divisa per 5. exhibet angulum graduum 108.

24. Post coroll. 3. proponi potest hoc probl. A puncto dato extra rectam datam ducere aliam rectam, quæ cum ipsa contineat angulum æqualem dato. Solvetur, e quovis punto rectæ datæ ducendo rectam, quæ cum data contineat angulum æqualem dato, tum aliam huic parallelam e punto dato vel ducendo e punto dato rectam parallelam rectæ datæ cum aliam, quæ cum ea

318 APPENDIX.

contineat angulum æqualem dato. Facta constructione statim patebit hanc rectam postremam cum data continere angulum æqualem dato.

25. In prop. 2. notandum, quodvis latus pro basi assumi posse; sed in triangulis rectangularibus basis nomine, nisi quid aliud exprimatur, intelligi hypothenusam, siue latus recto angulo oppositum.

26. Indicari hic potest, quo pacto distantiam aliquam metiri liceat ope hujus propositionis, ducendo ab extremis ejus punctis ad punctum quodvis binas rectas, mensurando eas, & angulum ibidem contentum, construendo alibi angulum ejusmodi, cum lateribus æqualibus, & mensurando basim novi trianguli obventuram æqualem quæsitæ distantiaæ.

27. Ex eadem deducitur chordas æquallium arcuum in æqualibus circulis æquales esse; cum nimirum si utroque ducantur ab earum extremis radii ad centrum anguli in centris æquales siant, & latera circa ipsos æqualia.

28. E coroll. 2. eruitur, in triang. isoscelio productis lateribus, etiam angulos infra basim æquales esse inter se; nam cum iis, qui supra basim sunt singuli binos rectos compleant.

29. Post corol. 4. potest proponi construendum super data recta triangulum vel æquilaterum; vel isosceles datum laterum; cumque id solvatur, facto centro in utroque extremitate recte, intervallo ipsius in primo casu, dati lateris in secundo, ductis binis circulis, & ad eorum intersectiones binis rectis; notari potest solutionem ejusmodi haberi per intersectionem binorum locorum geometricorum, de quibus n. 9, & in primo casu semper haberi duas solutiones hinc inde a recta data, in secundo vel duas, vel nullam, lateribus nimis dum dimidiata basim non excedentibus; ubi problematis impossibilis casus primo occurret.

30. Ali quanto difficultius, sed varietate casuum multo utilius problema erit hujusmodi. Dato punto in altero latere dati anguli rectilinei, construere triangulum æquilaterum,

terum, cuius basis sit in eo latere, & incipiat a dato puncto, vertex vero sit in latere altero. Solvetur, assumendo in illo primo latere segmentum quodvis a punto dato, construendo supra ipsum hinc inde bina triangula æquilatera, producendo utriusque latus illud, quod ad datum punctum terminatur, donec alteri lateri occurrat, ac ex hoc occursu ducendo rectam parallelam alteri lateri ejusdem trianguli æquilateri. Admodum facile demonstrabitur haberi intentum ob angulorum æqualitatem in parallelis, ex quibus deducetur angulos triangulorum prodeuptum inter se omnes æquari. Patet vero solutiones fore semper binas, præter casum, in quo angulus datus sit graduum 60, vel 120, quo casu alterius trianguli vertex in infinitum recedet, nec uspiam jam erit.

31. In Coroll. 1. pr. 3. notetur, latera æqualia debere opponi angulis æqualibus. Possunt enim bini anguli cum uno latere æquari sine triangulorum æqualitate, si nimis in altero latus illud iis angulis interlaceat in altero opponatur, vel non opponatur angulis æqualibus.

32. Post Coroll. 4. addendum illud. Si per quodvis diametri punctum ducantur binæ rectæ lateribus parallelae; ex parallelogrammum divident in 4 parallelogramma, quorum bina, per quæ diameter transit, dicuntur circa diametrum, reliqua bina dicuntur complementa. Porro complementa ipsa semper æqualia erunt. Nam integrum parallelogrammum secatur a diametro in bina triangula æqualia, a quibus singulis demendo bina triangula, quæ pariter sunt dimidia parallelogrammorum circa diametrum, relinquuntur complementa quoque æqualia.

33. Tum proponi possunt demonstranda hæc theorematum, quorum usus særissime occurrit. In quovis parallelogrammo binæ diametri se mutuo bisariam secant: si rectangulum sit, æquales sunt, & in ipsarum intersectione facto centro, circulus ipsi circumscribi potest. Demonstrabitur primum, considerando bina triangula ad verticem

tem opposita, in quibus invenientur latera parallelogrammi opposita æqualia, & anguli hinc inde ab ipsis alterni in parallelis æquales. Demonstrabitur secundum, considerando triangula, quæ utravis diameter continet cum binis rectanguli lateribus continentibus rectum angulum quæ habebunt latera æqualia, adeoque & bases. Tertium a primo, & secundo conjunctis sponte fluit.

34. In demonstratione Prop. 4. superpositis basibus non est ostensum verticem unius trianguli non posse cadere in latus alterius, vel intra triangulum ipsum. At non posse cadere in latus, satis patet ob ipsam laterum æqualitatem: non posse cadere intra alterum triangulum, demonstrabitur, si conjunctis verticibus, ut in ipsa demonstratione, considerentur bina triangula isoscelia; nam ad absurdum devenietur eodem modo, si producatis alterius lateribus consideretur in eo æqualitas angularum ultra basim, in altero vero citra, ac illorum alter erit pars alterius ex his, alter vero totum respectu alterius.

35. Atque hic quidem exemplum habet Tyro demonstrationis indirectæ per reductionem ad absurdum. Directa, & expeditior demonstratio habebitur; si bases ita conjungantur, ut vertices cadant ad partes oppositas. Conjunctis enim verticibus, orientur bina triangula isoscelia, ex quorum angulis ad basim communem æqualibus, sponte fluat æqualitas angularum oppositorum basi in dictis triangulis, & inde eorum æqualitas per prop. 2.

36. Ex eadem Prop. demonstrari potest Rhombum, ac Rhomboidem esse parallelogramma. Ducta enim diametro habebuntur bina triangula per hanc propositionem æqualia, in quibus anguli ipsius diametri cum lateribus exhibebunt æqualitatem angularum alteriorum, pro demonstrando parallelismo laterum. Porro hinc, & ex corollariis Prop. 2., & 3, eruitur in quadrilino, si ex hisce tribus, 1. quod utrumque par oppositorum laterum servet parallelismum, 2. utrumque servet æqualitatem, 3. alterum & parallelismum, & æqualitatem servet, ha-

beatus

béatur unum, haberi semper reliqua duo. Bina ex his Euclides demonstravit: tertium, quod hic demonstravimus, licet æque necessarium, omisit.

37. Notandum hic in solis triangulis ab æqualitate laterum deduci æqualitatem angulorum, & arearum.

38. Opere prop. 5. facile solvitur hoc problema. Cuius polygono regulari circulum circumscribere. Solvetur, secando bifariam binos angulos proximos. Bissecantium concursus exhibebit centrum quæsiti circuli. Nam ob angulorum æqualitatem eæ rectæ cum latere poligoni constituent triangulum isoscele. Ex ipso concursu ducta recta ad angulum proximum, fiet novum triangulum æquale priori; habebit enim medium e tribus rectis bissecantibus angulos communem, latus ipsi proximum æquale latcri prioris, & angulum interceptum æqualem. Quare hæc tertia recta a suo angulo absindet quantum & prima, nimirum ejus dimidium. Erit igitur & hoc isoscele, ac ita porrò.

39. Ex Coroll. 3. ipsius pr. 5. facile deducitur, quo pacto super data recta quadratum construi possit, vel rectangulum datorum laterum, & concipiendo superposita latera binorum quadratorum, patebit lateris majoris quadratum majus esse, & viceversa.

40. Licebit hic eructe alium locum geometricum, qui contineat vertices omnes omnium triangulorum isoscelium habentium datam rectam pro basi, sive centra omnium circulorum transeuntium per data duo puncta. Is erit recta indefinita secans bifariam, & ad angulos rectos rectam datam, seu jungentem data puncta:

41. Eruetur etiam hoc theorema summio sæpe futurum usui. In triangulo isoscelio ducta ab angulo basi opposito recta quadam, si ex hisce tribus, 1. quod angulus secetur bifariam, 2. quod basis secetur bifariam, 3. quod cadem secetur ad angulos rectos, habeatur unum, habebuntur & reliqua duo, & si in quodam triangulo habeantur duo ex iis, id triangulum erit isoscelle. Demonstratio ex propositionis demonstratione sponte fluit.

222 APPENDIX.

42. Problema Tyroni exercendo aptum esse potest huiusmodi. In data recta invenire punctum a binis datis punctis aequè distans. Solvetur jungendo recta puncta data, & ex ipsa bifariam secta ducendo rectam perpendicularem indefinitam; cuius occursum cum data recta solvet problema; qui concursus abibit in infinitum; nec usquam jam erit; si bina puncta jacuerint in recta datæ rectæ perpendiculari.

43. Omitti autem non debet hoc aliud; datis tribus punctis invenire centrum circuli per ea transeuntis. Solvetur conjugendo unum cum reliquis; secando bifariam rectas jungetes; & ducendo per sectionum puncta rectas perpendicularares iis, quarum concursus determinabit quosdam centrum; quod tamen in infinitum recedet, nec usquam jam erit, si tria data puncta in directum jaceant, recta illa quodammodo aequivalente arcui circuli infiniti.

44. Id autem coincidit cum solutione hujus problematis: dato triangulo circumscribere circulum. Et quoniam datis tribus punctis, unicum invenitur centrum circuli per ea transeuntis, eruitur hoc theorema: Si binorum circulorum tria peripheriae puncta congruant, congruent reliqua omnia. Inde autem fluit solutio hujus problematis: dato circuli arcu invenire centrum, & ipsum completere. Satis erit assumptis in eis tribus punctis ad arbitrium invenire centrum circuli per ea transeuntis.

45. Potest exercitationis gratia proponi & hoc. In data recta invenire punctum; ad quod a binis datis punctis ductæ binæ rectæ contineant cum rectâ ipsa angulos aequales. Solvetur ducendo ex altero rectam perpendicularem rectæ datæ; & eam producerido tantundem; tum ex altero dato punto ad punctum extremitum rectæ productæ ducendo rectam; & erit idem casus, quem solvimus in scholio; pertinens ad reflexionis punctum.

46. Post Coroll. 4. hujus prop. 5. proponendum hoc problema. Datum circuli arcum bifariam secare. Solveatur ducendo e centro rectam perpendicularem chordæ dati

dati arcus. Deducenda autem sequentia theorematum summo usui futura. Diameter, quæ chordam non per centrum transversiter bifariam secat, vel quæ chordam quamvis secat ad angulos rectos, secat bifariam & arcum. Si arcum secat bifariam, secat bifariam, & ad angulos rectos chordam. Chordæ, quæ aliam chordam, & ejus arcum bifariam secat, vel arcum bifariam, & ejus chordam ad angulos rectos, est diameter. Hæc facile demonstrantur. Inde fluit hoc aliud: Binæ chordæ, quæ diametri non sint, non possunt se mutuo secare bifariam; recta enim e centro ad intersectionem ducta esset utriusque perpendicularis. Demum habetur solutio hujus problematis: Dat circuli centrum invenire: solvitur, si ducta chorda quavis, & secta bifariam, per sectionem ducatur recta ipsi perpendicularis utrinque terminata ad circumferentiam, quæ erit diameter, & secta bifariam exhibebit centrum quæsumum.

47. In prop. 6. si punctum E cadat inter puncta C, & B, vel in B, demonstratio habebitur addendo binis triangulis æqualibus trapezium commune in primo casu, triangulum in secundo.

48. Ipsa prop. ac ejus corollaria convertenda sunt. Maximos enim conversa usus habent. Nimirum parallelogramma, vel triangula æqualia super eadem basi, & ad easdem partes, vel parallelogrammum duplum trianguli, sunt inter easdem parallelas: Facile demonstrantur, cum ob bases æquales debeant (per schol. sequens) habere altitudines æquales. Quare recta per vertices ducta, & recta ducta per bases claudunt bina perpendicularia æqualia, & proinde parallelae sunt.

49. Ex rectangulorum mensura, quæ habetur in scholio facile deducitur rectangulum contentum sub binis rectis, quæ nimirum angulum rectum contineant, æquari simul triangulis omnibus contentis sub illa, & partibus omnibus hujus. Nam idem est unum numerum multiplicare per alium simul, ac multiplicare partes, si ve idem est aliquid accipere decies, ac accipere prius bis, tum ter, tum quinquies: Inde vero eruitur etiam

qua-

quadratum lineæ æquari rectangulis omnibus, quæ ipsæ continentiam omnibus suis partibus, ac rectangulum, quod una pars lineæ continet cum tota æquari illi, quod continet secum, & cum altera parte, sive quadrato sui, & rectangulo binarum partium, qui sunt casus particulares prioris theorematis. In fine autem scholii, ubi de circuli dimensione agitur, notandum, contemptum quantitatum infinitesimalium adhiberi posse sine ullo erroris periculo ut in solidis demonstratur. Sed de infinitesimalibus multo uberius agetur post sectiones conicas tomo 2.

50. Ex prop. 7, quæ facundissima est, plurima theorematum, ac solutiones problematum derivari possunt. Derivetur in primis hoc theorema. In triangulo rectangulo basis est major utrovis latere, & si in binis triangulis rectangulis bases æquales habentibus unum latus unius lateri æquale erit, erit & alterum alterius æquale, ac tota triangula æqualia; si autem unum latus primi sit majus uno latere secundi, erit alterum minus altero. Patet ex eo, quod summa quadratorum laterum est æqualis quadrato basis.

51. Inde sponte fluet hoc aliud. In circulo chordæ quæ a centro æque distant, æquales sunt: omnium chordarum maxima est diameter, reliquæ eo minores, quo magis a centro distant. Ducto enim a centro perpendiculari in chordam quamvis, quod ipsam secabit bifariam, fieri triangulum rectangulum, quod habebit pro basi radium, pro lateribus semichordam, & distantiam a centro, ex quo omnia facile deducuntur.

52. Proponenda hæc duo problemata: Datis quotunque rectis, aliam invenire, cujus quadratum sit æquale simul quadratis omnibus earum omnium: Datis binis rectis invenire aliam, cujus quadratum æquetur differentiæ quadratorum earundem. Primum solvetur, conjungendo ope anguli recti quadrata binarum in quadrato novæ rectæ, tum quadratum tertiarum cum quadrato hujus novæ in alia, & ita porrò. Secundum, abscindendo ex latere altero anguli recti segmentum æquale recte minori, tum ex extremo ejus punto applicando in ipso angulo recto

basim æqualem majori ; latus enim alterum problema solvet.

53. Tum hoc theorema inferatur, quod rursus fæcundissimum erit. Rectarum omnium, quæ a dato puncto duci possunt ad datam rectam indefinitam brevissima est perpendicularis, reliquæ eo majores, quo magis a perpendiculari distant ; & quæ hinc inde æque distant æquales, nec nisi binæ hinc inde æquales duci possunt. Ea omnia ex ipsa propositione sponte fluunt, si consideretur, quamvis rectam esse basim trianguli rectanguli, cuius alterum latus constans est perpendicularis illa, alterum distantia ab eadem assumpta in ipsa recta indefinita.

54. Inde hæc theorematum consequuntur. Quævis recta indefinite producta vel circulum fecat in duobus punctis, vel contingit in uno, vel illi nusquam occurrit : & in primo casu omnia puncta segmenti binis sectionibus intercepti, sive chordæ, jacent intra circulum, puncta reliqua omnia ejusdem rectæ jacent extra : in secundo casu præter unicum punctum contactus reliqua omnia jacent extra circulum. Si enim recta transit per centrum ; in ea pars prima est manifesta : si per id non transit ; demisso in eam perpendiculo e centro, si id perpendiculum fuerit minus radio circuli, cadet intra circulum, & recedendo ab ipso hinc inde, distantia a centro semper magis cresceret, donec deveniatur ad distantiam æqualem radio, quæ deinde semper major evadet. Si id perpendiculum erit æquale radio, extremum ejus punctum cadet in peripheriam, tum hinc inde distantiae omnes radio majores erunt. Si perpendiculum fuerit majus radio, multo majores erunt reliquæ omnes distantiae.

55. Quædam, quæ ad tangentem circuli pertinent, demonstravimus alia methodo in corollariis prop. 8. At vel hic, vel ibi potest deduci hoc theorema maximi usus. Si per quoddam peripheriarum punctum transeant binæ rectæ, & ex hisce tribus, 1. quod altera sit circuli tangens, 2. quod altera sit circuli diameter, 3. quod angulum rectum constituant, habeantur duo simul, habebitur & tertium.

56. Tum hoc illud: Si in circulo adsit chorda, & alia recta per quoddam peripheriae punctum transeat, ac ex hisce tribus, 1. quod arcus a chorda subtensus in eo puncto secetur bifariam. 2. quod ea recta circumlum ibi tangat, 3. quod ipsi chordae parallela sit, quotiescumque habebuntur duo, habebitur & tertium. Facile autem demonstrabitur, ducta ex illo puncto arcus diametro circuli, qui se ipsum arcum bifariam secat, & illa recta sit ipsi chordae parallela, secabit ad angulos rectos chordam, adeoque erit perpendicularis illi rectae, quae proinde erit tangens. Si ea fuerit tangens, illa diameter erit perpendicularis ipsi, ut chordae adeoque ipsa tangens parallela chordae. Si autem illa recta fuerit tangens, & parallela chordae, diameter erit perpendicularis illi, adeoque & chordae, quam proinde secabit bifariam.

57. Potest proponi hoc problema satis utile: circulum describere, qui rectam datam contingat in punto dato, & transeat per punctum datum extram ipsam. Solventur per intersectionem binorum locorum Geometricorum. Alter erit recta datae rectae perpendicularis in punto dato, in qua jacent omnia centra circulorum ibi tangentium ipsam rectam datam, alter recta secans bifariam, & ad angulos rectos rectam tangentem punctum contactus cum altero punto dato in qua nimis sunt omnia centra circulorum transversantium per ea puncta.

58. Detrum hic jam solvi potest hoc problema: Data polygono regulari circulum inscribere. Solvetur autem secando bifariam binos angulos proximos, ac ex concursu, quod erit centrum, ducendo ad latus interceptum rectam perpendicularem, quae erit radius. Nam rectae ex eo centro ad omnes angulos ductae eos bifariam secant juxta num. 38. Quare si ex ipso concursu in bina quavis latera proxima demittantur perpendicularia; ea constituent bina triangula rectangularia habentia pro basi communi rectam angulum interceptum bifariam secantem pro altero latere dimidiâ latera polygoni,

hi, quæ semper æqualia erunt; ac proinde perpendiculariū quodvis sibi proximo æquale erit, & uno assumpto pro radio, circulus per omnium extrema transibit, ac latera omnia continget.

59. Facile eruetur ex ipsa demonstratione; in ipsis contactibus latera singula polygoni bifariam secari.

60. Patet autem eadem demonstratione etiam in quovis triangulo concursum binarum rectarum binos angulos secantium bifariam, præbere centrum circuli inscribendi. Exhibit enim eæ binæ rectæ bissecantes tria perpendicularia æqualia:

61. In quovis triangulo bina latera simul tertio majora esse, videtur satis manifestum, ex ipsa rectitudinis natura. At id quidem acuratissime demonstrari potest ope corol. i. prop. 8. Si enim (Fig. 25.) binorum laterum BD, DC primum concipiatur productum in A ita, ut sit DA æqualis DC, ducta CA, erit ob isoscelisimum angulus DCA æqualis DAC. Quare totus BCA major BAC, & BA, sive BD, DC simul superabunt BC.

62. Inde consequetur hoc aliud theorema: Si bina triangula basim communem habeant, vertex autem alterius intra alterum cadat, hujus bina latera simul minora erunt binis lateribus illius; angulus vero ab iis contentus major illius angulo. Facile demonstrabitur producendo inclusi latere altero, donec occurrat lateri includentis. Fiet enim super eadem basi tertium triangulum, eujus latera simul facile demonstrabuntur majora lateribus inclusi, minora lateribus includentis; ut angulus contra illius angulo minor, hujus major.

63. Ad Corol. 2. notati potest; si binorum triangulorum superponantur potius latera majora, fieri posse, ut punctum C cadat extra triangulum ABD, in ipsam basim AD, vel intra triangulum. In primo casu de monstratio facta locum habet, in secundo res est manifesta, in tertio demonstratur ope numeri praecedentis. Nam eo casu cadente C intra triangulum, rectæ AC, CB simul erunt minores rectis AD, DB, & demptis BC, BD æ qualibus, recta AD erit major, quam AC.

64. Ex ipso Corol. 2. sponte fluunt sequentia theorematum. Rectarum omnium, quæ ex puncto dato extra centrum circuli terminantur ad omnia puncta peripheriæ, maxima erit ea, quæ ad centrum ducta, ac producta peripheriæ occurrit ultra ipsum centrum, reliquæ eo minores, quo per majores arcus distant ab eo occursu puncta, ad quæ terminantur, ac binæ tantummodo quæ hinc inde per æquales arcus distant ab occursu eodem, æquales inter se sunt: minima vero erit nulla, si punctum detur in ipsa peripheria, ac si detur extra, erit ea, quæ terminatur ad punctum priori e diametro oppositum. Satis erit ad hæc omnia demonstranda ducere radium e centro ad id punctum peripheriæ, ad quod terminatur recta ipsa, & considerare variationes omnes, quas subit angulus contentus in centro ab hoc radio, & a recta jungente centrum cum puncto dato, cuius bina latera semper eadem erunt, basis vero recta illa a puncto dato ad punctum peripheriæ terminata augebitur, vel minuetur cum angulo.

65. Inde verò facile admodum dèducitur: chordam arcus magis a semicirculo recedentis esse minorem: circulum ab alio circulo vel secari in binis punctis ita, ut alter ex ejus arcibus binis intersectionibus interceptus sit totus intra ipsum, alter totus exæta, & recta, quæ conjungit bina eorum circulorum centra, bifariam fecet tum arcus ipsos, tum chordam per intersectiones ductam, ac fecet chordam eandem ad angulos rectos: vel contingi in unico penculo, quod quidem semper jacebit in eadem recta cum binis centris ita, ut si inter ipsa centra jaceat, alter circulus extra alterum cadat, & convexitatem sibi obvertant; si verò utrumque centrum jaceat ad eandem ejus plagam, totus minor circulus in majori includatur: vel deinum sibi nusquam occurtere, sive alter ad alterum non pertingat sive eum complexus ultra ipsum transcurrat. Hæc autem patebunt omnia, si pro puncto dato superioris numeri assumatur ipsum alterius circuli centrum.

66. In Corol. 1. post prop. 9, cum dicitur arcum esse

esse mensuram anguli, non intelligitur mensura in eo sensu, in quo sumitur in schol. post prop. 7, ut sit id, quod aliquoties sumptum adaequat totum, sed pro quantitate aequali, qua mensurata habeatur magnitudo ejus quantitatis, cuius mensura dicitur, atque in hoc sensu fere semper etiam inferius accipietur.

67. In ipsa Prop. 9. notandum, si arcus circuli sit semicirculo major, non posse in communi angularium consideratione angulum ipsi insistere ad centrum, licet possit ad circumferentiam. Nam ex binis ejus extremitate rectae ad centrum ductae angulum constituent versus ipsum. Ac si ipse arcus semicirculo aequalis sit, bini ejusmodi radii in directum jacebunt, nec angulum constituent. Hinc ut in hoc communi modo concipiendi angulos demonstretur Corol. 1. recurrentum est iterum ad demonstrationem propositionis, & in hoc casu semper centrum necessariò cader intra angulum, ut in fig. 40, eritque semper dimidius arcus AE mensura anguli ADE, dimidius BE mensura anguli BDE, adeoque dimidium totius AEB erit mensura totius anguli ADB.

68. Ceterum anguli, sive rectarum inclinationes considerari possunt etiam ex parte opposita cuspidis, nimirum externa, vel convexa, qui ab aliquibus dicuntur anguli gibbi. Quoniam id summo usui esse potest, & ad Geometriæ vim, & analogiam quandam intelligentiam plurimum conducit, capiatur circinus, ac sensim aperiatur cuspipe utraque, & hiatu spectante Cœlum, donec bina ejus crura in directum jaceant, tum motu in contrariam partem inflectantur. Initio quidem angulus communi modo consideratus Cœlum spectabit; tum is perpetuo crescens abibit in rectum, deinde in obtusum. Jacentibus in directum cruribus, angulus non evadet nullus, sed aequalis binis rectis, sive graduum 180. Deinde vero angulus communi modo consideratus jam spectabit deorsum; at ille, qui

Cœlum spectabat, adhuc magis auctus evadet major binis rectis, & fiet is, quem diximus angulum gibbum. Et si eo quidem pacto anguli considerentur, propositio erit generaliter vera, & cuicunque arcui insistat ad circumferentiam angulus; habebit alium insistentem ad centrum sui duplum.

69. Quin immo concipi potest angulus rectæ lineæ cum alia recta, ut major etiam 4. rectis, & graduum quotcumque, concipiendo alteram circa alteram absolvare integras conversiones quotcumque.

70. E Corol. i. sponte fluit hoc theorema. Anguli omnes, qui in eodem, vel in æqualibus circulis insistent arcubus æqualibus, ac ad peripheriam terminantur, sunt inter se æquales. Inde vero hoc aliud ejus inversum. Locus, qui continet ad easdem partes vertices omnes angulorum æqualium, quorum crura discedunt è datis binis punctis, est arcus circulis transeuntis per illa binâ punctâ, & verticem unius cuiuslibet ex ipsis. Nam omnes ad eum arcum terminati æquales sunt; facile autem demonstratur omnes terminatos intra majores esse, extra minores, efficiendo angulum terminatum ad eum arcum, cuius anguli latus transeat per verticem terminati intra, vel extra; Erit enim is angulus respectu terminati intra internus & oppositus, respectu terminati extra externus.

71. Ex eodem Corol. i. datur hoc aliud theorema: Circulus triangulo rectangulo circumscriptus, habet pro diametro basim; inde vero fluit hoc aliud; Vertex anguli recti distat à media basi per dimidiam basim. Primum patet ex eo, quod angulus rectus debet esse in semicirculo, secundum ex eo, quod centrum debeat esse in media basi.

72. Tum inde haud difficiliter derivatur hoc aliud. Si divisa circuli peripheria in partes æquales quotcumque, singulæ sectiones conjungantur cum sibi proximis, orietur polygonum regulare inscriptum, si per singulas sectiones ducantur tangentes, orietur circumscriptum.

Primum patet; quia latera erunt chordæ arcuum æquallium, adeoque æqualia; anguli autem insistent arcubus æqualibus, nimirum excessui totius circuli supra binos arcus subtensos a binis eorum lateribus. Secundum demonstrabitur ductis a centro ad omnes contactus, & proxinarum tangentium concursus rectis, que cum segmentis tangentium interceptis inter binas quasque proximas constituent triangula rectangula, & omnia prorsus æqualia; unde & angulorum, & laterum æqualitas sponte fluet.

73. Ad exercendum Tyronem possunt proponi hujusmodi problemata. Per datum punctum rectam ducere ita, ut ejus segmentum dato circulo interceptum æquetur rectæ datæ. Datı circuli tangentem ducere ita, ut ejus segmentum interceptum inter contactum, & rectam datam indefinitam, æquetur rectæ datæ. Rectam ducre, quæ binos circulos datos simul tangat.

74. Primum solvetur ducta e quovis punto chorda æquali datæ rectæ, tum e centro ducto perpendiculo in ipsam, & hoc radio, ac eodem centro, descripto circulo novo, ad quem si è dato centro ducantur tangentes; problema solvent; exhibebunt enim chordas æque a centro distantes, ac distat chorda primo applicata. Erunt autem binæ solutiones, vel unica, vel nulla; prout data recta fuerit minor, æqualis, vel major diametro.

75. Secundum solvetur, ducta ex quovis punto peripherię tangentे circuli æquali rectę datę, tum eodem centro per ejus extreum punctum ducto circulo, qui si bis fecerit rectam datam, solutiones erunt quatuor, ductis binis tangentibus e singulis intersectionibus, si in uno puncro contingat, binę tantum tangentes inde duci poterunt; si ad eam non pertingat, problema erit impossibile. Demonstratio patet, si producantur tangentes ipse, quę fiunt chordę circuli majoris æquè distantes a centro, & in ipsis contactibus bifariam seca- buntur.

76. Tertium solvetur, ducendo radium quemvis ma-
P 4 joris

ioris circuli, ac in eo tam versus centrum, quam pro ducto ad partes centro oppositas abscindendo segmentum æquale radio minoris circuli : Si enim centro majoris circuli, & hoc novo intervallo summæ, vel differentiæ radiorum describatur circulus : ad eum ducantur tangentes ex centro minoris circuli, per contum quenvis e centro majoris circuli ducatur radius, & per ejus extremum punctum tangens circuli majoris, eadem & minorem continget. Id autem demonstrabitur, ducendo ex centro circuli minoris perpendicularum in ipsam, quod invenietur æquale distantia binarum tangentium circuli majoris, & novi, adeoque radio circuli minoris. Porro si circulus alter extra alterum jaceat totus, invenientur quatuor tangentes ita ut binæ, quæ determinabuntur per summam radiorum, se inter ipsos circulos interferant, reliquarum utrilibet ad eandem utriusque partem jaceat ; si se contingant exterius, binæ illæ priores in unicam coalescent ; si se secant, binæ priores impossiles fient ; si se contingant interius, etiam posteriores binæ in unicam coalescent ; si alter intra alterum jaceat ; omnes erunt impossiles ; ut adeò haberi possint solutiones 4, 3, 2, 1, nulla.

77. Poterit autem moneri Tyro, hoc postremum problema exhibere umbram, & penumbra Eclipsum, consideratis quatuor communibus tangentibus globorum Solis, & Lunæ, vel Solis, & Terræ, quatum priores duæ penumbram, posteriores umbram determinant.

78. Corol. 3. hujus prop. 9. converti poterit : descri bendo nimirum circulum per tres vertices angulorum quadrilinei habentis angulos oppositos simul duobus rectis æquales, qui transibit etiam per quartum. Nam si quartus vertex intra circulum caderet, contineret angulum majorem complemento oppositi ad duos rectos, si extra minorem, ut num. 70.

79. Corol. 5. converti potest ita: Si binæ chordæ se intra circulum non secantes intercipiant arcus æquales,

para-

parallelæ sunt. Si enim concurserent extra; continerent angulum cuius mensura esset semidifferentia arcuum interceptorum.

80. E Corol. 6. infertur hoc theor. Anguli, quos chorda ex contactu ducta continet cum tangentे, æquantur iis, qui insistunt ipsi chordæ in alternis segmentis: nimirum angulus ABE æquatur cuivis angulo descripto in segmento ADB, & angulus ABF cuivis descripto in segmento, quem chorda AB continet cum suo arcu versus E. Nam habent mensuram eandem, illi dimidium arcum AB, hi dimidium ADB.

81. Hinc facile solvuntur hæc problemata: A dato circulo abscindere segmentum, quod contineat angulum æqualem dato, & incipiat in puncto peripheriæ dato: Supra datam rectam construere segmentum circuli continens angulum æqualem dato. Primum solvitur, ducta circuli tangentे per datum peripheriæ punctum, & ex eodem chorda, quæ cum tangentе contineat angulum æqualem dato: secundum solvitur, ducento per alterum extremum rectæ datae aliam rectam, quæ cum ea contineat angulum æqualem dato, tum per nu. 57. describendo circulum, qui hanc rectam tangat in eo chordæ extremo, & transeat per alterum extremum.

82. Pariter hoc aliud: Dato circulo inscribere trianguli, quod habeat angulos æquales angulis dati trianguli, & cujusvis anguli verticem in puncto dato. Solvetur ducento per id punctum tangentem, tum ducendo binas chordas, quæ contineant cum tangentе hinc inde binos angulos æquales reliquis angulis trianguli dati. Coniunctis enim extremis chordarum, facile patebit haberi intentum (per n. 80.)

83. In scholio ante prop. 10. delibantur tantummodo quædam, quæ pertinent ad algebraica signa, & Arithmeticæ notiones, quæ & captu facilis sunt, & ad reliqua, quæ hic pertractamus, sufficiunt. Arithmeticam plenius hic post Geometriam planam tractavimus, Algebraam finitam hujus tomī pars secunda complectitur. Interea si quam notionem numeri integri, fracti, multipli-

applicationis, divisionis &c. ignoret Tyro nondum Arithmeticam aggressus, eam facile a Præceptore addiscet.

84. Ubi pag. 45. lin. 9. dicitur: *Quoties tertius terminus continet quartum, aut similem ejus partem;* notet in primis nomine *partis* non hic intelligi partem, quæ aliquoties sumpta adæquat totum, & dicitur aliquota, sed quæ cum alia parte totum adæquat, & dicitur aliquanta. Deinde nomine *similis* intelligi eodem expressam numero, ut nimirum si primus terminus contineat secundi partem quartam, quintam, decimam, etiam tertius contineat partem quartam, quintam, decimam quarti, & ita porro; nimirum numerus ille, qui exprimit, quo pacto primus terminus secundum contineat, debet esse idem, ac is, qui exprimat idem in tertio respectu quarti. Sine hac explicatione nomen *similis*, quod potest sonare idem ac proportionalis, illud assumeret, quod deberet explicare.

85. Porro ille numerus m potest esse integer, vel fractus, vel continere series fractionum decrescentium in infinitum. Si primus rationis terminus est commensurabilis cum secundo, semper numerus m erit finitus. utcumque fractiones involvat. Si primus terminus sit linea palmorum 12, secundus 4, erit $m = 3$, si ille 4 hic 12 erit $m = \frac{1}{3}$, si ille contineat palmos 17, hic ξ erit $m = \frac{17}{\xi} = 3 \frac{2}{\xi}$. At si incommensurabiles sint, non poterit haberi m sine serie infinita. Sic si primus terminus sit diameter quadrati, & secundus ejusdem latus, erit $m = 1.4142$ &c. (per schol. prop. 7.)

86. Posita hac defini. patet ex axiomate tertio, quantitates æquales ad alias æquales habere rationem eandem, & viceversa; ac patet etiam illud, quod Arithm. cap. 2. assumpsimus pro fundamento totius doctrinæ de proportionibus si uerque rationis terminus per eandem quantitatem multiplicetur, vel dividatur, manent rationem.

87. In proportionibus monendus Tyro terminos homom-

prologos dici antecedentes inter se, & consequentes inter se, sive primum ac tertium, secundum ac quartum. Rationem autem reciprocam, seu inversam eam, quam habet terminus consequens ad antecedentem. Ratio directa 6 ad 3 est dupla, ratio reciproca ejusdem non est dupla, sed subdupla.

88. In demonstracione prop. 10, notandum, quantitates etiam heterogeneas posse inter se multiplicari, si assumpta in quavis quantitatibus specie una aliqua ad arbitrium, quae dicatur unitas, reliquæ exprimantur numeris finitis, vel serie fractionum infinita, prout fuerint commensurabiles cum ea, vel incommensurabiles.

89. Ut vim habeat demonstratio prop. 10, necessarium est hoc theorema. Quotiescumque tres numeri multiplicantur ita, ut binorum productum multiplicetur per tertium, semper omnium productum evadit idem. Si multiplicandi sint 2, 5, 7 erit $2 \times 5 = 10$, & $7 \times 10 = 70$, tum $2 \times 7 = 14$, & $5 \times 14 = 70$, ac $5 \times 7 = 35$, & $2 \times 35 = 70$.

90. Id in quotcumque numeris verum est, & in Arithmetica demonstrandum. Eo posito vis argumenti sita est in eo, quod si sum sit $a = mb$, & $c = md$, erit $ad = mb d$, & $bc = b m d$; nimurum in utroque casu idem productum numerorum m, b, d , licet ordine diverso multiplicatorum. Hinc $ad = bc$ productum extremonrum æquale producto mediorum.

91. In Coroll. 1. notetur regulam trium non habere locum, si tres termini dati cum quarto quæsito proportionales non sint. Si navi inæquali vento impellatur, & scias horis tribus confecisse millaria 7, non potes invenire, quot millaria confiscare debeat horis 9.

92. In Coroll. 2. notetur, alternationem propriè haberi non posse, nisi in quantitatibus homogeneis, & solum ope numerorum quantitates experimentum transferri ad heterogeneas. In motu æquabilis spatium factum uno tempore ad factum alio, est ut primum tempus ad secundum. Alternando est primum spatium ad primum tempus, ut secundum spatium ad secundum tempus.

Propriè

Propriè spatium ad tempus nullam rationem geomètriæ cam habet, cum se continere non possint, sed ratio habebitur in numeris ea experimentibus.

93. In prop. 11. idein dicendum de multiplicatione antecedentium, & consequentium. Et quidem Euclides, ut evitaret multiplicationem in quantitatibus heterogeneis, & series infinitas in incommensurabilibus, alio modo rationem compositam definivit, ut videbimus suo loco. Sed hæc nostra methodus est multo contractior.

94. Euclides alios duos arguendi modos demonstravit *ex æqualitate ordinata, & perturbata*. Cum nobis hic usui futuri non essent, eos omisimus. Habentur Arithm. cap. 2. n. 21, & hic etiam admodum facile demonstrari possent. Pariter alium demonstrat arguendi modum *per conversionem rationis*, cum sumitur primus terminus ad excessum primi supra secundum, ut tertius ad excessum tertii supra quartum, qui includitur in iis, quæ diximus in fine Coroll. 2. prop. 10, & quem demonstravimus Arithm. cap. 2. num. 12.

95. In demonstratione prop. 12, ubi pag. 50. lin. 18. dicitur: *Sed triangula &c.*, ex hoc theoremate, quod triangula æquè alta si habent bases æquales æqualia sunt infertur statim triangula CEB, DEB æque alta se eodem modo continere, quod bases suas. Id deducitur hoc pæsto. Si utraque basis dividatur in particulæ æquales quæcumque, & ad communem verticem e singulis sectionibus ducantur rectæ; dividentur triangulorum areae in particulæ æquales vi ejus theoremati, quæ erunt totidem numero, quot basim particulae. Quare areae se eodem modo continent, quo bases.

96. Verum & hæc prop., & aliæ multæ, quæ pertinent ad comparationes superficiem inferuntur e scholio prop. 6. & doctrina proportionum: Hæc omnino non ignoranda: Quadratum mediæ proportionalis inter binas rectas æquantur earundem rectangulo. Omnia parallelogramma comparata inter se, & omnia triangula inter se sunt in ratione composita basim, & altitudi-

num (per prop. 10. cum æquentur productis ex basibus, & altitudinibus. Si bases fuerint æquales, illa sunt ut altitudines, & si altitudines fuerint æquales, erunt, ut bases, per nu. 86. Si bases fuerint in ratione reciproca altitudinum, nimirum basis unius ad basim alterius, ut hujus altitudo ad illius altitudinem, areæ æquales erunt, & viceversa, (per prop. 9.)

97. Ope tertii ex his theoremati statim patet in ea demonstratione prop. 12. triangulum CEB ad DEB esse ut basim CB ad DB, & ADB ad idem EDB ut AB ad EB, unde consequitur CB. DB:: AB: EB.

98. Ex prop. 12. plurima theorematia profluunt, plurimæ problematum solutiones, & multa quidem ex iis usu sçpissime occurrunt, alia sunt Tyroni exercendo aptissima. Potiora delibabimus. In triangulis habentibus aliquem angulum æqualem areæ sunt in ratione composita laterum eum angulum continentium. Si enim in alterum ex iis assumptum pro basi e vertice opposito demittatur perpendicularum sive altitudo; facile ope trianguli rectanguli, qui oritur ad partem anguli æqualis eruetur, illa perpendiculara esse ut latera non assumpcta pro basi. Quare cum sint areæ in ratione composita ex ratione basium, & altitudinum; erunt in ratione composita eorum laterum. Hinc in ejusmodi triangulis si ea latera sint in ratione reciproca; areæ æquales erunt, & viceversa.

99. Atque hinc etiam statim consequitur theorema demonstratum in Corol. 1. Triangulorum similiūm areas esse in ratione duplicata laterum homologorum: cum latera circa æquales angulos sint proportionalia.

100. In quovis triangulo recta basi parallela secat latera in eadem ratione, & si ita secat est parallela. Deducitur facile ex ipsius propositionis demonstratione. Cum enim sit CB. BD :: AB. BE; erit dividendo CD. DB :: AE. EB, & huic quidem theoremati innituntur corollaria 4., & 5. Si autem ita sit, erit ED parallela AE; nam si ea non esset, esset alia ducta ex E, que in alio puncto secaret latus BC, & tamen secaret in eadem ratione.

ratione. Quare ipsius rectæ BC, pars minor altera est partibus BD, DC haberet ad majorēm altera eāidem rationē, quam ipsae habent; quod est absurdum; cum quo prīmus terminus rationis est minor, & secundus major debeat decrescere nūmerus, qui exprimat, quomodo se contineant.

101. Notetur etiam in triangulis æquiangulis esse tanti AB. BC:: FG. GH, quam AB: FG:: BC. GH. & hic tam CD. DB:: AE. EB, quam CD : AE :: DB . EB, cum nimirum ex altera proportione eruatur altera, ut aliae plures cōponendo, dividendo, invertendo, alternando.

102. Eruitur etiam hoc theorema futūrum sēpe summo usui. Si per quoddam punctū transeant plures rectæ utrinque indefinite productæ, & incident in rectas parallelas quācumque, segmenta parallelarū intēcepta binis ex illis rectis ad segmenta intēcepta aliis binis quibuscumque erunt in omnibus parallelis in eadem ratione. Nam segmentum unius parallelæ ad segmentum alterius inclusum binis quibusvis iisdem rectis, facile invenietur esse, ut distantia primæ parallelæ a vertice ad distantiam secundæ assūptam in quavis ex iis rectis, quę rationes omnes facile detegetur æquales.

103. Problemata exercendo Tyroni apta possunt esse hujusmodi: Datis in data recta binis punctis invenire tertium ita, ut ejus distantiae a binis punctis datis sint in ratione data. Solverit facile, effigendo ex primo puncto dato in quovis angulo rectam indefinitam; abscondendo in ea ab eodem punto primam rectis exprimitibus rationem dātam; tum ab hujus extremitate secundam, vel ad partes oppositas recte dātes; vel versus ipsam; duicendo ab extremitate puncto hujus secundæ rectam ad secundum punctum dātum; tum ab extremitate primæ rectam huic parallelam. Hæc determinabit in recta data quesitum punctum, quod facile in utroque casu demonstrabitur ope triangulorum similiū, dividendo præterea vel cōponendo. Ac prima quidem solutio exhibebit semper unum punctum inter data diū pūta-

cta, & coincidit cum secunda parte Corol. 6. secunda extra eadem unum ad partes secundi puncti dati, vel nullum, vel unum ad partes primi, prout secunda recta data fuerit minor, aequalis, vel major respectu primæ. Ac plurimum proderit considerare excusum puncti inventi utriuslibet per rectam datam, & transitum ab una parte ad oppositam, pro varia mutatione magnitudinis vel directionis in secunda recta data:

104. Vel hoc aliud. A dato puncto rectam ducere, quæ ita fecerit latera dati anguli, ut binæ distantiae puncti dati a binis laterum sectionibus sint in ratione data, vel ut binæ latera dati anguli ab ejus vertice ad ejusmodi rectam sint in ratione data. Solverur problema utrumque ducendo a puncto dato rectam parallelam primo lateri dato, donec occurrat secundo: tum pro solutione problematis primi capiendo ab anguli vertice in secundo late re segmentum, quod sit ad segmentum ipsius interceptum inter parallelam ductam, & verticem anguli in ratione secundæ quantitatis experimentis rationem datam ad primam: pro secundo capiendo ab intersectione lateris secundi cum parallela ducta segmentum, quod ad ipsam parallelam sit in eadem ratione; ac ad ejus extremum ducendo rectam, quæ problema solvet, ut statim ac delineata fuerit figura, prodet similitudo triangulorum, & in utroque casu binæ solutiones habebuntur, segmento illo assumpto hinc inde ab anguli vertice, vel ab illo concursu, & lateribus anguli dati, si opus fuerit, productis etiam ultra verticem.

105. Potest etiam proponi hoc aliud. Datis binis punctis in binis rectis parallelis, & tertio extra utrunque, ducere ab hoc rectam, quæ illas ita fecerit, ut segmenta intercepta inter ipsam, & illa puncta data sint in ratione data. Solverur facile conjungendo bina illa puncta data, in recta jungente inveniendo punctum, cuius binæ distantiae ab ipsis sint in ratione data (per num. 99.) & a puncto dato per hoc punctum ducendo rectam, quæ exhibebit, quod queritur, ac si punctum

245 APPENDIX.


ctum tertium non jaceat in directum cum reliquis binis semper habebuntur binæ solutiones præter casum, in quo ratio data sit ratio æqualitatis, qui casus unicam solutionem admettit. Si autem tria puncta data in directum jaceant; casus erit impossibilis nisi ratio data fuerit eadem, ac ratio binarum distantiarum puncti tertii a prioribus binis, & tunc erunt infinitæ solutiones; quævis enim recta ducta a punto dato satisfaciet problemati.

106. Et hæc quidem exercendo Tyroni, & alia magis necessaria ad Geometriæ complementum proponi possunt, ut hoc. Super data recta construere parallelogrammum, cuius area æquetur areæ dati parallelogrammi. Solvetur facile ducendo in dato parallelogrammo perpendiculum; quod erit ejus altitudo, tum inveniendo quartam proportionalem post rectam datam, basim parallelogrammi dati, & ejus altitudinem. Inventa enim quantitas erit altitudo parallelogrammi questi; ac proinde si in distantia æquali huic novæ altitudini ab illa recta data ducatur recta ipsi parallela, & in quovis angulo ab extremis punctis rectæ datae ducantur usque ad eam binæ rectæ parallelæ; solvetur problema, quod inde constat esse indeterminatum, & habere infinitas solutiones. Quod si præterea requiratur, ut novum parallelogrammum habeat angulum æqualem dato; satis erit in eo angulo ducere illas duas rectas parallelas, & jam problema determinatum evadet.

107. Eodem pacto triangulum construi poterit, quod habeat basim æqualem datae rectæ, aream æqualem areæ dati trianguli, & angulum æqualem dato angulo, inveniendo nimicum novi trianguli altitudinem eodem prorsus modo, & ducendo rectam datae parallelam in distantia æquali inventæ altitudini.

108. Quin immo facile fiet parallelogrammum æquale triangulo, vel triangulum æquale dato parallelogrammo cum iisdem conditionibus. Satis erit in primo casu dimidiare, in secundo duplicate inventam altitudi-

Geom. Tab. I



Antonio Barahona